

พาราเซตามอล
240 มิลลิกรัม ต่อ 5 มิลลิลิตร
ชนิดน้ำเชื่อมเข้มข้น/
ชนิดน้ำแขวนตะกอนเข้มข้น

1. ยานี้คืออะไร

- ยานี้มีชื่อสามัญว่าพาราเซตามอล (paracetamol) เป็นยาในกลุ่มลดไข้ บรรเทาปวด
- ยานี้ใช้เพื่อลดไข้ บรรเทาอาการปวดเล็กน้อยถึงปานกลาง เช่น ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยจากไข้หวัด ปวดฟัน ปวดกล้ามเนื้อ ปวดหลัง

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไหร่

- ห้ามใช้ในผู้ที่เคยแพ้ยาพาราเซตามอลหรือแพ้ส่วนประกอบอื่นในตำรับนี้
- ห้ามใช้พาราเซตามอลเกินขนาดที่แนะนำในฉลากและเอกสารกำกับยาเพราะอาจเกิดพิษร้ายแรงจนตับวายเสียชีวิตได้
- หลีกเลี่ยงการใช้ยานี้ร่วมกับยาอื่นที่มีพาราเซตามอลเป็นส่วนประกอบ เพราะอาจทำให้ได้รับยาเกินขนาด

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยานี้หากมีภาวะพร่องสีซิกซ์พีดี G6PD หรือกำลังกินยาด้านการแข็งตัวของเลือดวอร์ฟาริน หรือเป็นโรคตับหรือโรคไต เพราะอาจเกิดอันตรายจากยานี้ได้ง่ายขึ้น
- ถ้ามีไข้สูง (อุณหภูมิสูงกว่า 39.5 องศาเซลเซียส) ให้รีบไปพบแพทย์
- การใช้ยาในเด็กอายุต่ำกว่า 2 เดือน ให้ปรึกษาแพทย์

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

ขนาดยา

- กินยาเฉพาะเวลาปวดหรือมีไข้ วันละไม่เกิน 5 ครั้ง แต่ครั้งห่างกันอย่างน้อย 4 ชั่วโมง ตามขนาดยาในตาราง

น้ำหนักตัว	ข้อขนาดตวงยา	กระบอกฉีดยา*
ตั้งแต่ 8 ถึง 12 กิโลกรัม	ครึ่งช้อน	2.5 มิลลิลิตร
มากกว่า 12 ถึง 16 กิโลกรัม	สามส่วนสี่ช้อน	3.75 มิลลิลิตร
มากกว่า 16 ถึง 24 กิโลกรัม	หนึ่งช้อน	5 มิลลิลิตร
มากกว่า 24 ถึง 32 กิโลกรัม	หนึ่งช้อนครึ่ง	7.5 มิลลิลิตร
มากกว่า 32 ถึง 48 กิโลกรัม	สองช้อน	10 มิลลิลิตร

*หรือถ้วยตวงยา

วิธีใช้ยา

- เขย่าขวดก่อนใช้ยา
- ตวงยาและป้อนยาด้วยกระบอกฉีดยา (ไซริงค์)

3.2 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร
รีบไปพบแพทย์ทันที เพราะหากได้รับยาเกินขนาดไปมาก และได้รับการรักษาไม่ทันท่วงทีจะทำให้ตับถูกทำลายนำไปสู่การเสียชีวิตจากตับวายได้

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างการใช้ยา

- ไม่กินยาดัดต่อกันเป็นเวลานาน โดยไม่ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
- ถ้ากินยาแล้วไข้ไม่ลดภายใน 3 วัน หรืออาการปวดของเด็กไม่บรรเทาภายใน 5 วัน หรืออาการปวดของผู้ใหญ่ไม่บรรเทาใน 10 วัน ให้ไปพบแพทย์เนื่องจากอาจเป็นอาการของโรคที่ร้ายแรงได้

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 หากกินยาแล้วเกิดอาการ เช่น

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก
- มีจ้ำตามผิวหนัง เลือดออกผิดปกติ เหนื่อยง่าย เป็นหวัดได้ง่าย

ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

5.2 หากจำเป็นต้องกินยานี้ต่อเนื่องแล้วเกิดอาการ เช่น

- อาการปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน ท้องอืด ตัวเหลือง ตาเหลือง บัสสาวะสีเข้มขึ้น

ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บยาไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง ปล่อยให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

ระบุลักษณะและสีของยา และระบุส่วนประกอบในตำรับ
....<ปรับตามทะเบียนยา>...

ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า/ผู้แทนจำหน่าย.....
เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 15 ธันวาคม 2559

ข้อมูลยานี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร