

แอสไพริน 75, 81, 300, 325 มิลลิกรัม

ชนิดเม็ด

หรือ

แอสไพริน 81, 300, 325 มิลลิกรัม

ชนิดเม็ดเคลือบแตกตัวในลำไส้

1. ยานี้คืออะไร

- ยานี้เป็นยาในกลุ่มยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ มีชื่อสามัญว่า แอสไพริน (Aspirin)
- ยานี้ใช้เพื่อป้องกันการรวมกลุ่มของเกล็ดเลือดในโรคที่เกี่ยวข้องกับหลอดเลือดหัวใจหรือสมอง และ บรรเทาอาการปวด บวมและการอักเสบในโรค ข้ออักเสบ ได้แก่โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ โรคข้อเสื่อม ไขวุน้ำตึก กลุ่มอาการควาซาซากิ
- การใช้ยานี้ อาจเกิดอันตรายรุนแรงได้ จึงต้องสั่งจ่ายโดยแพทย์เท่านั้น

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- ห้ามใช้ยานี้ในผู้ที่เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบในยานี้ หรือยาอื่นในกลุ่มยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์

- ห้ามใช้แก้ปวด ลดไข้ในเด็กและวัยรุ่นอายุต่ำกว่า 18 ปี หากไม่ได้รับคำแนะนำจากแพทย์
- ห้ามใช้แก้ปวด ลดไข้ในผู้ป่วยที่เป็นไข้หวัดใหญ่ ไข้เลือดออก และอีสุกอีใส
- ห้ามใช้รักษาอาการปวดเมื่อยเนื่องจากการทำงานหนัก

- ห้ามใช้ยานี้ เมื่ออยู่ในระยะให้นมบุตร เพราะทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อทารก
- ห้ามใช้ยานี้ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่เกี่ยวข้องกับโรคไต
- ห้ามใช้ยานี้ในผู้ป่วยฮีโมฟีเลีย ผู้ที่มีภาวะเกล็ดเลือดน้อย หรือมีอาการเลือดออกผิดปกติอื่นๆ
- ห้ามใช้ยานี้ในผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวรุนแรง
- ห้ามใช้ยานี้ในสตรีมีครรภ์ที่มีอายุครรภ์มากกว่า 6 เดือน

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- หลีกเลี่ยงการใช้ยานี้ในหญิงมีครรภ์ที่มีอายุครรภ์ 1-6 เดือน เพราะอาจมีอันตรายต่อทารกในครรภ์ได้ แต่แพทย์อาจพิจารณาสั่งใช้ยานี้ หากมีเหตุผลทางการแพทย์
- ระมัดระวังการใช้ในผู้ป่วยที่เคยมีประวัติมีแผลหรือเลือดออกที่ทางเดินอาหาร
- หลีกเลี่ยงการใช้ยานี้ติดต่อกันเป็นเวลานาน เพราะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดเลือดออกในกระเพาะอาหาร อาการ หอบหืด ความผิดปกติของตับและไต ยกเว้นแพทย์สั่ง
- ไม่ควรใช้ยานี้ร่วมกับยา อาหาร หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบางชนิด เพราะอาจมีผลต่อการรักษาหรือเกิดอันตรายได้ เช่น ยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ตัวอื่น วัคซีนไวรัสไข้หวัดใหญ่ สารกันเลือดเป็นลิ่ม แป้งกาวกรดไขมันโอเมก้า 3

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- กินยาพร้อมอาหาร หรือดื่มน้ำตามอย่างน้อย 1 แก้วเพื่อลดการระคายเคืองของกระเพาะอาหาร

3.2 หากลืมกินยา ควรทำอย่างไร

- ให้รอกินยาของมื้อต่อไป และห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง เช่น อาเจียนเป็นเลือด มีอาการสับสน ชัก กระสับกระส่าย มีเสียงในหู ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างการใช้ยา

- หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
- แจ้งแพทย์หรือทันตแพทย์ว่ากำลังใช้ยานี้หากต้องผ่าตัดหรือทำฟัน
- หากได้รับวัคซีนอีสุกอีใส หลีกเลี่ยงการใช้ยานี้ 6 สัปดาห์หลังจากได้รับวัคซีน

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผื่นหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ
- ถ่ายดำคล้ายน้ำมันดิน อาเจียนเป็นเลือดหรือสีกาแฟถ่ายเป็นเลือด
- ตัวเหลือง ตาเหลือง รู้สึกไม่สบาย มีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่
- มีเสียงในหู

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่如果有อาการรุนแรง ให้ไปพบแพทย์ทันที

- คลื่นไส้ อาเจียน แสบร้อนกลางอก

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บยาไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- แกะยาออกจากแผงเมื่อจะกินในแต่ละครั้งเท่านั้น
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า/ผู้แทนจำหน่าย.

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2559

ข้อมูลยานี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร