

# แอสไพริน 300 มิลลิกรัม ชนิดแคปซูล หรือ 300, 325, 500 มิลลิกรัม ชนิดเม็ด

## 1. ยานี้คืออะไร

### 1.1 ยานี้มีชื่อสามัญว่าอะไร

- แอสไพริน (Aspirin) อยู่ในกลุ่มยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์

### 1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- เพื่อบรรเทาอาการปวดหัว ปวดฟัน ปวดประจำเดือน ปวดกล้ามเนื้อ (สำหรับอาการปวดระดับน้อยถึงปานกลาง)

## 2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

### 2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบในยานี้ หรือยาอื่นในกลุ่มยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์
- ห้ามใช้แก้ปวด ลดไข้ในเด็กและวัยรุ่นอายุต่ำกว่า 18 ปี หากไม่ได้รับคำแนะนำจากแพทย์
- ห้ามใช้แก้ปวด ลดไข้ในผู้ป่วยที่เป็นไข้หวัดใหญ่ ไข้เลือดออก และอีสุกอีใส
- ห้ามใช้รักษาอาการปวดเมื่อยเนื่องจากการทำงานหนัก
- เมื่ออยู่ในระยะให้นมบุตร เพราะทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อทารก
- ผู้ป่วยโรคเลือดจางที่เกี่ยวกับโรคหัวใจ
- ผู้ป่วยซีโมฟีเลีย ผู้ที่มีภาวะเกล็ดเลือดน้อยหรือมีอาการเลือดออกผิดปกติอื่นๆ
- ผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวรุนแรง
- หญิงมีครรภ์ที่มีอายุครรภ์มากกว่า 6 เดือน

## 2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยา

- หลีกเลี่ยงการใช้ยานี้ในหญิงมีครรภ์ที่มีอายุครรภ์ 1-6 เดือน เพราะอาจมีอันตรายต่อทารกในครรภ์ได้ แต่แพทย์อาจพิจารณาสั่งใช้ยานี้ หากมีเหตุผลทางการแพทย์
- ระมัดระวังการใช้ในผู้ป่วยที่เคยมีประวัติมีแผลหรือเลือดออกที่ทางเดินอาหาร
- หลีกเลี่ยงการใช้ยานี้ติดต่อกันเป็นเวลานาน เพราะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดเลือดออกในกระเพาะอาหาร อารมณ์หอบหืด ความผิดปกติของตับและไต ยกเว้นแพทย์สั่ง
- ไม่ควรใช้ยานี้ร่วมกับยา อาหาร หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบางชนิด เพราะอาจมีผลต่อการรักษาหรือเกิดอันตรายได้ เช่น ยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ ตัวอื่น สารกันเลือดเป็นลิ่ม วัคซีนไวรัสไข้หวัดใหญ่ แปะก๊วย กรดไขมันโอเมก้า 3

## 3. วิธีใช้ยา

### 3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- กินยาพร้อมอาหาร หรือดื่มน้ำตามอย่างน้อย 1 แก้ว เพื่อลดการระคายเคืองของกระเพาะอาหาร

#### ขนาดยาทั่วไป

สำหรับลดไข้และบรรเทาอาการปวดในผู้ใหญ่

- กินแอสไพริน 300 มิลลิกรัม หรือ 325 มิลลิกรัม ครั้งละ 1-2 เม็ด ทุก 3-4 ชั่วโมง หรือ
- กินแอสไพริน 500 มิลลิกรัม ครั้งละ 1 เม็ด ทุก 3-4 ชั่วโมง

#### ขนาดยาสูงสุด

- แอสไพริน 300 มิลลิกรัม กินไม่เกินวันละ 13 เม็ด
- แอสไพริน 325 มิลลิกรัม กินไม่เกินวันละ 12 เม็ด
- แอสไพริน 500 มิลลิกรัม กินไม่เกินวันละ 8 เม็ด

#### ระยะเวลาการให้ยา

- สำหรับบรรเทาอาการปวด ไม่ควรใช้นานเกิน 10 วัน
- สำหรับลดไข้ ไม่ควรใช้นานเกิน 3 วัน

## 3.2 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง เช่น อาเจียนเป็นเลือด มีอาการสับสน ชัก กระสับกระส่าย มีเสียงในหู ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

## 4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างการใช้ยา

- หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
- แจ้งแพทย์หรือทันตแพทย์ว่ากำลังใช้ยานี้หากต้องผ่าตัดหรือทำฟัน
- หากได้รับวัคซีนอีสุกอีใส หลีกเลี่ยงการใช้ยานี้ 6 สัปดาห์หลังจากได้รับวัคซีน

## 5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

### 5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจุดตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ
- ถ่ายดำคล้ายน้ำมันดิน อาเจียนเป็นเลือดหรือสีกาแฟ ถ่ายเป็นเลือด
- ตัวเหลือง ตาเหลือง รู้สึกไม่สบาย มีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่
- มีเสียงในหู

### 5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- คลื่นไส้ อาเจียน แสบร้อนกลางอก

## 6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บยาไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- แกะยาออกจากแผงเมื่อจะกินในแต่ละครั้งเท่านั้น
- เก็บยาในที่แห้ง อบอุ่นโดยตรง โดยทั่วไป ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า/ผู้แทนจำหน่าย...

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2559