

แอสซิโทรไมซิน 250 มิลลิกรัม
500 มิลลิกรัม และ 600 มิลลิกรัม
ชนิดเม็ดชนิดแคปซูล
[ข้อการคำ]

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อสามัญว่าอะไร

- แอสซิโทรไมซิน ไดไฮเดรต (azithromycin dihydrate) เป็นยาปฏิชีวนะ อยู่ในกลุ่มแมคโครไลด์

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- เพื่อรักษาโรคติดเชื้อที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่ไวต่อยา เช่น การติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง ได้แก่ หลอดลมอักเสบ ปอดอักเสบ การติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจส่วนบน ได้แก่ ทอนซิลอักเสบ คอหอยอักเสบ โพรงอากาศอักเสบ การติดเชื้อแบคทีเรียในหูชั้นนอก หรือโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ที่เกิดจากเชื้อคลาไมเดีย

1.3 ยานี้ไม่มีประโยชน์ในการรักษาโรคติดเชื้อไวรัส

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไหร่

- เคยแพ้ยานี้หรือยาปฏิชีวนะกลุ่มแมคโครไลด์ หรือแพ้ส่วนประกอบในยานี้
- หากท่านกินยารักษาโรคปวดศีรษะไมเกรน ได้แก่ เออร์โกทามิน
- หากท่านเป็นโรคตับขั้นรุนแรง

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- หากท่านมีภาวะต่อไปนี้
- ปัญหาโรคไต โรคตับ โรคหัวใจ โรคเบาหวาน
- ให้นมบุตร

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้ยา

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์และเภสัชกรเท่านั้น ขนาดยานี้ในผู้ป่วยแต่ละรายมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับอายุ น้ำหนัก ตำแหน่งที่เกิดโรคและการตอบสนองต่อการรักษา

3.2 หากลืมกินยา ควรทำอย่างไร

- กินยาทันทีที่นึกได้ กินยาครั้งต่อไปตามเวลาปกติ และห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้รีบนำส่งโรงพยาบาล บาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างการใช้ยา

4.1 ระหว่างใช้ยานี้ควรปฏิบัติอย่างไร

- ให้กินยานี้ติดต่อกันทุกวันจนครบตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร แม้อาการจะดีขึ้นแล้วก็ตาม มิฉะนั้นเชื้อจะดื้อยา
- กินยาเม็ดในขณะท้องว่าง คือกินยา 1 ชั่วโมงก่อนอาหาร หรือ 2 ชั่วโมงหลังอาหาร

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตาริมฝีปาก ลมพิษ
- แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- เป็นตุ่มพอง ผื่นคันบวมแดง หลุดลอก
- ลิ้นสีซีด
- มีไข้สูง หนาวสั่น ไอ และเจ็บคอ
- หัวใจเต้นเร็ว ความดันต่ำ
- ชัก
- ตัวเหลือง ตาเหลือง
- สูญเสียการได้ยิน

- คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้องรุนแรง อาเจียนใน 1 ชั่วโมงหลังกินยา
- ถ่ายเหลวรุนแรง หรือปนเลือด อุจจาระสีดําหรือสีซีด บั๊สสาวะผิดปกติ (ปริมาณและความถี่) บั๊สสาวะเหลืองเข้มผิดปกติ

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยาแต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ บ้านหมุน
- ปวดข้อ
- ชาตามร่างกาย
- เป็นผื่นคัน
- มีเสียงในหู
- ผิวหนังไวต่อแสง
- อ่อนเพลียผิดปกติ
- การรับรสไม่ดี เบื่ออาหาร ปวดท้อง คลื่นไส้ ท้องผูก ท้องเดิน
- มีฝ้าขาวในปาก คอ คันช่องคลอด

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- แกะยาออกจากแผงเมื่อจะกินในแต่ละครั้งเท่านั้น
- เก็บยาในที่แห้ง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บให้พ้นสายตาและมือเด็ก

ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า/ผู้แทนจำหน่าย.....
เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ
2 พฤษภาคม 2559

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ หากมีข้อสงสัยให้
ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร