

ไดโคลฟีแนค โปแทสเซียม ชนิดเม็ด 25 มิลลิกรัม

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อสามัญทางยาว่าอะไร

ยานี้มีชื่อสามัญว่า ไดโคลฟีแนค โปแทสเซียม (diclofenac potassium) อยู่ในกลุ่มยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตอรอยด์

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- บรรเทาอาการโรคข้อเข่าเสื่อม โรคข้อสันหลังอักเสบชนิดติดยึด โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ในเด็ก
- รักษาอาการปวดเฉียบพลัน อาการปวดประจำเดือน ชนิดปฐมภูมิ
- รักษาอาการอักเสบปวด บวม ภายหลังจากบาดเจ็บ หรือหลังการผ่าตัด
- รักษาโรคเก๊าต์แบบเฉียบพลัน

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไหร่

- ห้ามใช้ในผู้ที่เคยแพ้ยานี้ หรือเคยแพ้ส่วนประกอบอื่นในตำรับยานี้ (บางตำรับอาจมีส่วนประกอบของถั่วลิสงหรือถั่วเหลือง)
- ห้ามใช้ในผู้ที่มีอาการหอบหืด ลมพิษ หรือปฏิกิริยาแพ้หลังได้รับยาแอสไพริน หรือยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตอรอยด์
- ห้ามใช้ในผู้ที่มีอาการปวดในกรณีที่มีการผ่าตัดเปลี่ยนหลอดเลือดหัวใจโคโรนารี
- ห้ามใช้ในผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 14 ปี

- มีห้ามใช้ในผู้ที่มีเลือดออกในทางเดินอาหาร หรือมีประวัติภาวะเพาะทะลุจากยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตอรอยด์
 - ห้ามใช้ในผู้ที่เป็โรดดับหรือไตบกพร่องรุนแรง
 - ห้ามใช้ในผู้ที่เป็นโรคหัวใจล้มเหลว โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดแดงส่วนปลาย โรคหลอดเลือดสมอง
 - ห้ามใช้ในผู้ที่เป็นไข้เลือดออก
- #### 2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้
- ระมัดระวังการใช้ยานี้ในผู้สูงอายุ ผู้ที่มีการทำงานของหัวใจ ดับ และไต บกพร่อง
 - หญิงมีครรภ์เดือนที่ 7-9 หลีกเลี่ยงการใช้ยานี้ นอกจากแพทย์สั่ง
 - ยานี้มีผลต่อการเกาะกลุ่มกันของเกล็ดเลือด จึงควรหลีกเลี่ยงในผู้ที่สงสัยว่าจะเป็นไข้เลือดออก หรือเกล็ดเลือดผิดปกติจากสาเหตุอื่นๆ เช่น ยาต้านปัจจัยการแข็งตัว เป็นต้น
 - ยานี้อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดเลือดออกหรือแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ การตีบตันของหลอดเลือดสมองหรือหลอดเลือดหัวใจ

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เนื่องจากขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- ผู้ใหญ่ ขนาดยาเริ่มต้นรับประทานวันละ 100-150 มิลลิกรัม ถ้าอาการไม่รุนแรงรับประทานวันละ 75-100 มิลลิกรัม
- เด็ก (อายุมากกว่า 14 ปี) รับประทานวันละ 75-100 มิลลิกรัม
- อาการปวดระดู อาการปวดไมเกรน หรือรูมาตอยด์ สามารถเพิ่มได้ถึงวันละ 200 มิลลิกรัม

วิธีใช้ยา

- รับประทานยานี้พร้อมอาหารหรือหลังอาหารทันที และดื่มน้ำตาม
- การใช้ยาควรเป็นระยะเวลาสั้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และขนาดยาต่อวันต่ำที่สุดที่ให้ผลในการรักษา

ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติรุนแรง เช่น ง่วงงุน เชื่องซึม คลื่นไส้ อาเจียน ปวดแสบยอดอก ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลหรือให้การรักษาแบบประคับประคอง

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างการใช้ยา

ระหว่างใช้ยานี้ควรปฏิบัติอย่างไร

- หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
- ถ้าท่านไม่แน่ใจว่ายา และ/หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือสมุนไพร ที่กำลังกินอยู่ มีผลกับการใช้ไดโคลฟีแนคหรือไม่ ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
- ให้แจ้งแพทย์กรณีที่เกิดอาการแสดงที่เป็นไปได้ว่าเกิดจากการทำงานของตับผิดปกติ เช่น ตัวเหลืองตาเหลือง ปวดท้องบริเวณด้านบนขวา เป็นต้น

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจุดตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ อาการปวดแค้นหัวใจ
- เลือดออกในกระเพาะอาหารและลำไส้

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- ท้องร่วง อาการปวดท้อง คลื่นไส้ อาการท้องอืด
- เวียนหรือปวดศีรษะ ความดันโลหิตสูง นอนไม่หลับ ผื่น อาการบวมหน้าอกไม่บวมที่ส่วนปลายมือหรือเท้า

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บยาไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- แกะยาออกจากแผงเมื่อจะกินในแต่ละครั้งเท่านั้น
- เก็บยาในที่แห้ง อากาศถ่ายเท โดยตรง โดยทั่วไป ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30°C
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า/ผู้แทนจำหน่าย.....

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2559

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ

หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร