

# ไดโคลฟีแนค โขเดียม 50 มิลลิกรัม ชนิดเม็ด

## 1. ยานี้คืออะไร

### 1.1 ยานี้มีชื่อสามัญว่าอะไร

- ไดโคลฟีแนค (diclofenac) อยู่ในกลุ่มยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตอรอยด์

### 1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- เพื่อบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อ (ปวดเล็กน้อยถึงปานกลาง)
- เพื่อบรรเทาอาการปวดจากโรคข้อกระดูกสันหลังอักเสบชนิดติดยึด โรคข้อกระดูกอักเสบ โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ โรคเกาต์แบบเฉียบพลัน
- รักษาอาการอักเสบปวด บวม ภายหลังจากบาดเจ็บ หรือหลังการผ่าตัด

## 2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

### 2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้หรือเคยแพ้ส่วนประกอบของยานี้
- มีอาการหอบหืดลมพิษ หรือโพรงจมูกอักเสบแบบเฉียบพลันจากการแพ้ยากลุ่มแอสไพรินหรือกลุ่มยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตอรอยด์
- มีเลือดออกในกระเพาะอาหาร หรือลำไส้หรือมีแผลทะลุ หรือมีประวัติกระเพาะทะลุจากยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตอรอยด์
- เป็นโรคตับ โรคไตอย่างรุนแรง
- เป็นโรคหัวใจล้มเหลว โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดแดงส่วนปลาย โรคหลอดเลือดสมอง
- มีอาการปวดจากกรณีที่ได้รับการผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ
- เป็นผู้ป่วยเด็ก

ข้อมูลยานี้เป็นข้อมูลโดยย่อ

หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

Control Version 00 : 20170105

## 2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ยานี้อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดเลือดออกหรือแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้
- หญิงมีครรภ์เดือนที่ 7-9 หลีกเลี่ยงการใช้ยานี้เนื่องจากแพทย์สั่ง
- ยานี้อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดการตีตันของหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจโดยเฉพาะเมื่อใช้ยาในขนาดสูงเป็นเวลานาน
- ยานี้อาจทำให้เกิดภาวะบวม น้ำ ควบระวังในผู้ที่เป็โรคหัวใจ เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดไตทำงานผิดปกติ
- ยานี้อาจมีผลเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดเชื้อหุ้มสมองอักเสบที่ไม่พบเชื้อในผู้เป็นโรคลูปัส อิริที่มาโตซิสทั่วร่างและโรคเนื้อเยื่อเกี่ยวพันผสม
- ยานี้มีผลต่อการเกาะกลุ่มกันของเกล็ดเลือด จึงควรหลีกเลี่ยงในผู้ที่สงสัยว่าจะเป็ไขเลือดย่อย หรือเกล็ดเลือดผิดปกติจากสาเหตุอื่นๆ เช่น ยาต้านการแข็งตัวของเลือด เป็นต้น
- ระมัดระวังการใช้ยานี้ในผู้สูงอายุ ผู้ที่มีการทำงานของหัวใจ ตับ และไตบกพร่อง ผู้ที่มีความดันโลหิตสูง ผู้ที่เป็นโรคหืด

## 3. วิธีใช้ยา

### 3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค

#### ขนาดยาทั่วไป

- สำหรับบรรเทาอาการปวด (ปวดเล็กน้อยถึงปานกลาง) กินครั้งละ 1 เม็ด วันละ 3 ครั้ง อาจให้ 2 เม็ดในครั้งแรก แล้วตามด้วย 1 เม็ด ทุก 8 ชั่วโมง
- สำหรับบรรเทาอาการปวดจากโรคข้อกระดูกสันหลังอักเสบชนิดติดยึด ทั้งชนิดเฉียบพลันและเรื้อรัง กินครั้งละ 1 เม็ด วันละ 2-3 ครั้ง
- สำหรับบรรเทาอาการปวดจากโรคข้อกระดูกอักเสบหรือ โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ ทั้งชนิดเฉียบพลันและเรื้อรัง กินครั้งละ 1 เม็ด วันละ 2-3 ครั้ง
- ห้ามหักและเคี้ยวเม็ดยา ควรกลืนยาทั้งเม็ด อาจกินยาพร้อมอาหารหรือนมได้ เพื่อลดการระคายเคืองของกระเพาะอาหาร

## 3.2 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรงเช่น คลื่นไส้ อาเจียน ปวดไตลึ้นปี เลือดออกในทางเดินอาหาร ท้องเสีย มึนงง ง่วงนอน มีเสียงอ้อในหู ชัก หมดสติ ความดันโลหิตต่ำ ไตวายเฉียบพลัน ตับถูกทำลาย การหายใจถูกกดให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

## 4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างการใช้ยา

- หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
- ไม่ควรใช้ยานี้ติดต่อกันเป็นเวลานาน

## 5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

### 5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ
- ถ่ายเป็นเลือดหรือสีดํา อาเจียนเป็นเลือด
- ตัวเหลือง ตาเหลือง
- เจ็บหน้าอกเฉียบพลัน
- ชัก อ่อนแรงหรือเหนียวผิดปกติ คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้องมาก
- บวมที่แขน ขา มือ ข้อเท้า เท้า

### 5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- ปวดหัว ท้องผูก ง่วงซึม นอนไม่หลับ ผื่นร้าย

## 6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บยาที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส และเก็บยาให้พ้นจากความชื้น
- ไม่ใช้ยานี้หลังวันหมดอายุ ที่ระบุบนกล่อง หรือ 2 ปี หลังวันผลิต
- เก็บยาในภาชนะที่ปิดสนิท
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า/ผู้แทนจำหน่าย.....

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2559