

ไดโคโลฟีแนค โซเดียม ชนิดเม็ดออกฤทธิ์เนิน 100 มิลลิกรัม

1. ยานี้คือยาอะไร

1.1 ยานี้มีชื่อสามัญทางยาว่าอะไร

ยานี้มีชื่อสามัญว่าไดโคโลฟีแนค โซเดียม (diclofenac sodium) ออยู่ในกลุ่มยาด้านการอักเสบที่ไม่ใช้สเตอโรอยด์

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- เพื่อบรเทาอาการและอาการแสดงของโรคข้อเข่าเสื่อม โรคข้อสันหลังอักเสบชนิดติดยืด โรคข้ออักเสบเรื้อร��ตอยด์ และโรคข้ออักเสบเรื้อร黑马ตอยด์ในเด็ก
- เพื่อรักษาอาการปวดเฉียบพลัน
- รักษาอาการอักเสบปวด บวม ภายในหลังการบาดเจ็บ หรือหลังการผ่าตัด
- รักษาโรคเก้าต์แบบเฉียบพลัน

2. ข้อควรรู้ก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยาเมื่อไหร่

- เคยแพ้ยาที่นี้ หรือเคยแพ้ส่วนประgonอื่นในตัวยาที่นี้
- มีอาการหอบหืด ลมพิษ หรือปั๊กิริยาแพ้หลังได้รับยาแอลสไพริน หรือยาด้านการอักเสบที่ไม่ใช้สเตอโรอยด์
- มีอาการปวดจากกรณีที่มีการผ่าตัดเปลี่ยนหลอดเลือดหัวใจโคโรนาเรีย
- เป็นผู้ป่วยเด็ก
- มีเลือดออกในทางเดินอาหาร หรือมีประวัติกระเพาะทะลุจากยาด้านการอักเสบที่ไม่ใช้สเตอโรอยด์
- เป็นโรคตับหรือไต功能รุนแรง
- เป็นโรคหัวใจล้มเหลว โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดแดงส่วนปลาย โรคหลอดเลือดสมอง
- เป็นไข้เลือดออก

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยา

- ยานี้อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดเลือดออกหัวใจแล้วในกระเพาะอาหารและลำไส้ การดับดันของหลอดเลือดสมองหรือหลอดเลือดหัวใจ
- ยานี้อาจทำให้เกิดอาการแพ้และปั๊กิริยาทางผิวนังอย่างรุนแรง การล่อนออกเป็นแผ่นหรือเกล็ด กลุ่มอาการสีเทาเงาอ่อนลัน หนังกำพร้าหลุดลอก
- หลังมีครรภ์เดือนที่ 7-9 หลีกเลี่ยงการใช้ยาที่นี้นอกจากแพทย์สั่ง
- ระมัดระวังการใช้ยาที่นี้ในผู้สูงอายุ ผู้ที่มีการทำงานของหัวใจ ตับ และไต บกพร่อง
- ยานี้มีผลต่อการเกาะกลุ่มกันของเกล็ดเลือด จึงควรหลีกเลี่ยงในผู้ที่สูงสัยว่าจะเป็นไข้เลือดออก หรือเกล็ดเลือดผิดปกติจากสาเหตุอื่นๆ เช่น ยาด้านปัจจัยการแข็งตัว เป็นต้น
- ถ้าท่านไม่แน่ใจว่ายา และ/หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือสมุนไพร ที่กำลังกินอยู่ มีผลกับการใช้ไดโคโลฟีแนคหรือไม่ ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เนื่องจากขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- แนะนำกินครั้งละ 100 มิลลิกรัม (1 เม็ด) วันละ 1 ครั้ง

วิธีใช้ยา

- รับประทานยาที่น้ำร้อนอาหารหรือหลังอาหารทันที และดื่มน้ำตาม
- การใช้ยาควรเป็นระยะเวลาสั้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และขนาดยาต่อวันต่ำที่สุดที่ให้ผลในการรักษา

3.3 ถ้ากินยาที่เกินขนาดที่แนะนำ ควร怎么办

ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติรุนแรง เช่น ง่วงนอน เชื่องซึม คลื่นไส้ อาเจียน ปวดแบบยอดอก หรือบันดาล ไข้สูง ไข้เลือดออก ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลหรือให้การรักษาแบบประคับประคอง

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างการใช้ยา

ระหว่างใช้ยาที่ควรปฏิบัติอย่างไร

- หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
- ให้แจ้งแพทย์กรณีที่เกิดอาการแสดงที่เป็นไปได้ว่าเกิดจากการทำงานของตับผิดปกติ เช่น ตัวเหลือง ตาเหลือง ป้ำดห้องบริเวณด้านบนขวา เป็นต้น

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปปีลูกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอัก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่นพอง ผิวนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวนัง หรือเลือดออกผิดปกติ
- อาการปวดศีรษะ
- เลือดออกในกระเพาะอาหารและลำไส้

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการ

รุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- ห้องร่วง อาการปวดห้อง คลื่นไส้ อาการท้องอืด
- เวียนหัวหรือปวดศีรษะ ความดันโลหิตสูง นอนไม่หลับ ผื่น อาการบวมน้ำกดไม่บุบที่ส่วนปลายมือหรือเท้า

6. ควรเก็บยาที่อย่างไร

- แกะยาออกจากแพลงเมื่อจะกินในแต่ละครั้งเท่านั้น
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดยแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า/ผู้แทนจำหน่าย.....
เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2559

ข้อมูลยานี้เป็นข้อมูลโดยย่อ

หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร