

มีลือกซีแคม
7.5 มิลลิกรัม และ 15 มิลลิกรัม
ชนิดเม็ด

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อสามัญทางยาว่าอะไร

ยานี้มีชื่อสามัญว่ามีลือกซีแคม (meloxicam) อยู่ใน
กลุ่มยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- เพื่อบรรเทาอาการและอาการแสดงของโรคข้อเข่า
เสื่อม โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ และโรคข้ออักเสบรูมา
ตอยด์ในเด็ก (อายุมากกว่า 2 ปี)

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไหร่

- เคยแพ้ยานี้ หรือเคยแพ้ส่วนประกอบอื่นในตำรับยานี้
- มีอาการหอบหืด ลมพิษ หรือปฏิกิริยาแพ้หลังได้รับยา
แอสไพริน หรือยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์
รวมถึงยาอื่นๆ ที่อยู่ในกลุ่มยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่
สเตียรอยด์
- มีอาการปวดจากกรณีการผ่าตัดเปลี่ยนหลอดเลือด
หัวใจโคโรนารี
- เป็นโรคไตที่มีภาวะอาการรุนแรง หรือการทำงานของ
ไตบกพร่องรุนแรง
- เป็นไข้เลือดออก

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ระวังระวังในผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือด แบบมีภาวะลิ้ม
เลือดในหลอดเลือด และกล้ามเนื้อหัวใจตาย โรคหลอดเลือด
เลือดสมอง ผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลว มีอาการบวมหน้า

Control Version 00 : 20170105

- ระวังระวังในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ควรตรวจ
ติดตามความดันโลหิตอย่างใกล้ชิดระหว่างเริ่มและตลอด
การรักษา
- ระวังระวังในผู้ป่วยโรคหืด หรือผู้ที่มีประวัติเป็นโรค
เกี่ยวกับทางเดินทางอาหาร เช่น เลือดออกในกระเพาะ
อาหาร หรือ มีแผลในกระเพาะอาหาร
- ระวังระวังในผู้ที่มีอาการและ/หรืออาการแสดงบ่งพร่อง
หรือการทดสอบการทำงานการของตับผิดปกติ

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น
เนื่องจากขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับ
ชนิดและความรุนแรงของโรค
- โดยทั่วไป กินครั้งละ 7.5 มิลลิกรัม วันละครั้ง อาจ
ปรับเพิ่มขนาดยาเป็น 15 มิลลิกรัม วันละครั้งได้ตาม
ความจำเป็นหรือผลการรักษา

วิธีใช้ยา

- กินยานี้โดยกลืนทั้งเม็ดพร้อมอาหารหรือขณะท้องว่าง
ได้ และดื่มน้ำตามมากๆ
- การใช้ยาควรกินยาในขนาดยาดำสุดที่ให้ผลในการ
รักษา และระยะเวลาสั้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

3.2 หากลืมกินยา ควรทำอย่างไร

ให้กินยาทันทีที่นึกได้แต่ถ้าใกล้เวลาของมื้อต่อไป ให้รอ
กินยาของมื้อต่อไปและห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติรุนแรง
เช่น ง่วงงุน เชื่องซึม คลื่นไส้ อาเจียน ปวดแสบยอดอก ให้
รีบนำส่งโรงพยาบาลหรือให้การรักษาแบบประคับประคอง

ข้อมูลยานี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างการใช้ยา

ระหว่างใช้ยานี้ควรปฏิบัติอย่างไร

- หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
ในระหว่างกินยานี้ เพราะอาจส่งผลให้เกิดการระคาย
เคืองกระเพาะอาหารเพิ่มมากขึ้น
- ให้แจ้งแพทย์กรณีที่เกิดอาการแสดงที่เป็นไปได้ว่า
เกิดจากการทำงานของตับผิดปกติ เช่น ตัวเหลือง
ตาเหลือง ปวดท้องบริเวณด้านบนขวา เป็นต้น

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีฝ้าตามผิวหนัง
หรือเลือดออกผิดปกติ
- อาการปวดแสบหัวใจ
- เลือดออกในกระเพาะอาหารและลำไส้

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการ รุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- ท้องร่วง อาการปวดท้อง คลื่นไส้ อาการท้องอืด
- เวียนศีรษะ ปวดศีรษะ ความดันโลหิตสูง นอนไม่
หลับ ผื่น
- อาการบวมหน้าอกไม่บวมที่ส่วนปลายมือหรือเท้า

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บยาไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- แกะยาออกจากแผงเมื่อจะกินในแต่ละครั้งเท่านั้น
- เก็บยาในที่แห้ง อบอุ่นโดยแสงโดยตรง โดยทั่วไป
ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า/ผู้แทนจำหน่าย.....

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2559