

ทินอกซิแคม 20 มิลลิกรัม ชนิดเม็ด

1. yaniiดีอย่าอะไร

1.1 yaniiมีชื่อสามัญทางยาว่าอะไร

yaniiมีชื่อสามัญว่าทินอกซิแคม (tenoxicam) ออยในกลุ่มยาต้านการอักเสบที่ไม่ใชสเตอโรรอยด์

1.2 yaniiใชเพื่ออะไร

- บรรเทาอาการและอาการแสดงของโรคข้อเข้าเสื่อม โรคข้ออักเสบรูห์มาตอยด์

2. ข้อควรรู้ก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช yanii เมื่อไหร

- เคยแพ yanii หรือเคยแพส่วนประกอบอื่นในตัวรับ yanii
- มีอาการหอบหืด ลมพิษ หรือปั๊กิริยาแพหลังไดรับยา แอสไพริน หรือยาต้านการอักเสบที่ไม่ใชสเตอโรรอยด์
- มีเลือดออกในทางเดินอาหาร หรือมีประวัติเลือดออก ในทางเดินอาหารหรือกระเพาะทະลจาก การใช้ยาต้านอักเสบที่ไม่ใชสเตอโรรอยด์
- เป็นสตรีมีครรภ์ไดรมาสที่สาม
- มีการทำงานของหัวใจล้มเหลว การทำงานของตับ หรือไตบกพร่องอย่างรุนแรง
- เป็นไข้เลือดออก

ข้อมูล yanii เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช yanii

- yaniiอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดเลือดออกหัวใจแล้วในกระเพาะอาหารและลำไส การตีบตันของหลอดเลือดสมองหรือหลอดเลือดหัวใจ
- yaniiอาจทำให้เกิดอาการแพและปั๊กิริยาทางผิวหนังอย่างรุนแรง การล่อนออกเป็นแพนหรือเกล็ด กลุ่มอาการสตีเวนจอย์สัน หนังกำพร้าหลุดลอก
- yaniiมีผลต่อการเกาะกลุ่มกันของเกล็ดเลือด จึงควรหลีกเลี่ยงในผู้ที่สังสัยว่าจะเป็นไข้เลือดออก หรือเกล็ดเลือดผิดปกติจากสาเหตุอื่นๆ เช่น ยาต้านปั๊จจัยการแข็งตัว เป็นต้น
- ไม่แนะนำให้ใช yaniiในเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เนื่องจากไม่มีข้อมูลขนาดยา และความปลอดภัยในการใช้
- ถ้าท่านไม่แน่ใจว่ายา และ/หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร หรือสมุนไพร ที่กำลังกินอยู่ มีผลกับการใช้ yanii ทินอกซิแคม หรือไม่ ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช yaniiตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เนื่องจากขนาดยาและระยะเวลาในการใช yaniiขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- ขนาดยาที่แนะนำ กินยาวันละครั้ง ครั้งละ 20 มิลลิกรัม วิธีใช yanii
 - รับประทาน yaniiพร้อมอาหารหรือหลังอาหารทันที
 - การใช yaniiควรเป็นระยะเวลาสั้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และขนาดยาต่อวันต่ำที่สุดที่ให้ผลในการรักษา

3.3 ถ้ากิน yaniiเกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติรุนแรง เช่น ง่วงนอน เชื่องชื้น คลื่นไส อาเจียน ปวดแบบดอกร ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลหรือให้การรักษาแบบประคับประคอง

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างการใช yanii

ระหว่างใช yaniiควรปฏิบัติอย่างไร

- หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
- หากกิน yaniiแล้วมีอาการเวียนศีรษะ ง่วงชื้น ไม่ควรขับขี่ยานพาหนะ และหลีกเลี่ยงการทำงานที่เสี่ยงอันตรายที่ต้องใช้ความตื่นตัวสูง
- ให้แจ้งแพทย์กรณีที่เกิดอาการแสดงที่เป็นไปได้ว่าเกิดจากการทำงานของตับผิดปกติ เช่น ตัวเหลือง ตาเหลือง ปวดท้องบริเวณด้านบนขวา เป็นต้น

5. อันตรายที่อาจเกิดจาก yanii

5.1 อาการที่ต้อง **หยุดยา** และรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามีด เป็นลม แน่นหน้าอัก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำダメื่องหนัง หรือเลือดออกผิดปกติ
- อาการปวดเดันหัวใจ
- เลือดออกในกระเพาะอาหารและลำไส

5.2 อาการที่ **ไม่จำเป็นต้องหยุดยา** แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- ห้องร่วง อาการปวดท้อง คลื่นไส อาการท้องอืด
- เวียนหัวหรือปวดศีรษะ ความดันโลหิตสูง นอนไม่หลับ ผื่น อาการบวมน้ำกดไม่ลงที่ส่วนปลายมือหรือเท้า

6. ควรเก็บ yaniiอย่างไร

- เก็บ yaniiไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- แกะยาออกจากแพนเมื่อจะกินในแต่ละครั้งเท่านั้น
- เก็บ yaniiในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงแดดตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส
- เก็บ yaniiให้พ้นมือเด็ก

ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า/ผู้แทนจำหน่าย.....

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2559