

อะทอร์วาสแตติน 10, 20, 40, 80 มิลลิกรัม ชนิดยาเม็ด

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อสามัญว่าอะไร

• ยานี้เป็นยาลดไขมันในเลือด มีชื่อสามัญว่า อะทอร์วาสแตติน (atorvastatin)

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

ยานี้ใช้ร่วมกับการควบคุมอาหาร เพื่อ

- ไขมันในเลือด
- ใช้ป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ยานี้ หรือแพ้ส่วนประกอบอื่นในตำรับยานี้
- ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ วางแผนจะตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร
- ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่มีอาการโรคตับกำเริบ
- ห้ามใช้ยานี้ร่วมกับยารักษาโรคเชื้อราโพโคนาโซล เพราะอาจเกิดพิษร้ายแรงต่อกล้ามเนื้อ และไตวายเฉียบพลัน

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

ควรแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบว่า

- ท่านใช้ยาอะไรอยู่บ้าง เนื่องจากการใช้ยาอะทอร์วาสแตตินร่วมกับยาบางชนิด ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดพิษต่อกล้ามเนื้อ
- ท่านรับประทานสมุนไพร อาหาร หรือเครื่องดื่ม อะไรบ้าง เนื่องจากผลิตภัณฑ์บางชนิดมีผลต่อการออกฤทธิ์ของยาอะทอร์วาสแตติน

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เนื่องจากขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค

- วิธีใช้ยา กินยานี้วันละครั้ง เวลาใดก็ได้ โดยให้เป็นเวลาใกล้เคียงกันอย่างสม่ำเสมอ กินก่อนหรือหลังอาหารก็ได้

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- กินยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าลืมกินเกิน 12 ชั่วโมง ให้รอกินยาของมื้อต่อไป (ห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า)

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติ ที่รุนแรงให้รีบนำส่งโรงพยาบาล

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- กินยานี้อย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร
- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตาม ผลการรักษาและอันตรายจากยา

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- เกิดอาการพิษต่อกล้ามเนื้อ คือ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออ่อน หลังหรือตามตัว กล้ามเนื้ออ่อนแรง กัดเจ็บ ตะคริวกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้อหดเกร็งหรือแข็งเกร็ง ปัสสาวะสีเข้ม หรือสีน้ำตาล ถ่ายปัสสาวะลำบากหรือ ปัสสาวะออกน้อยลง

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก
- เบื่ออาหาร คลื่นไส้อาเจียนรุนแรง ปวดท้องรุนแรง อ่อนเพลียรุนแรง ตัวเหลือง ตาเหลือง อุจจาระสีซีด ปัสสาวะสีเข้มหรือสีน้ำตาล
- อาการอ่อนแรง เปลี้ย อัมพาตช็อกไตช็อกหนึ่งของร่างกาย
- หายใจลำบาก ไอไม่มีเสมหะ น้ำหนักลด อ่อนล้าและมีไข้

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- หลงลืม ความจำบกพร่อง นอนไม่หลับ ผื่นร้าย สับสน

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บยาไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- แกะยาออกจากแผงเมื่อจะกินในแต่ละครั้งเท่านั้น
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาทุกชนิดให้พ้นมือเด็ก

ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า/ผู้แทนจำหน่าย...
เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อ
25 พฤศจิกายน 2559

ข้อมูลยานี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร