

เบทาเมทาโซนไดโพรพิโอเนด
ความแรงร้อยละ 0.05
ชนิดยาทาครีม
[ข้อการคำ]

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีข้อสำคัญอะไรบ้าง

เบทาเมทาโซนไดโพรพิโอเนด เป็นยาทาชนิดครีม จัดอยู่ในกลุ่มสเตียรอยด์

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

ยาทาเบทาเมทาโซนไดโพรพิโอเนด เป็นยาครีมทาผิวหนัง ใช้รักษาอาการอักเสบ บวม แดง คัน และระคายเคืองที่ผิวหนัง เช่น ผื่นผิวหนังอักเสบ ผื่นแพ้ชนิดต่าง ๆ โรคสะเก็ดงา รวมทั้งโรคผิวหนังอื่นๆ

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- มีประวัติแพ้ยาเบทาเมทาโซนไดโพรพิโอเนด ยาสเตียรอยด์ชนิดอื่น หรือส่วนประกอบอื่นในยาครีม
- กำลังเป็นสิ่วบางชนิดเพราะยาอาจกระตุ้นให้สิ่วบางชนิดกำเริบได้
- กำลังติดเชื้อไวรัสที่ผิวหนัง เช่น อีสุกอีใส งูสวัด เริม
- กำลังติดเชื้อแบคทีเรียที่ผิวหนัง
- กำลังติดเชื้อวัณโรคที่ผิวหนัง
- กำลังติดเชื้อราที่ผิวหนัง และปากอักเสบจากเชื้อรา
- กำลังมีผิวหนังอักเสบบริเวณรอบปาก
- กำลังเป็นผื่นผ้าอ้อม
- มีอาการคันบริเวณอวัยวะเพศ
- มีแผลบริเวณผิวหนัง หรือมีแผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวกเป็นบริเวณกว้าง

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ควรหลีกเลี่ยงหรือปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยานี้ ในกรณีต่อไปนี้ เพราะอาจทำให้โรครุนแรงขึ้น หรือเกิดอันตรายจากยานี้มากขึ้น
 - เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี เนื่องจากหากใช้ยาปริมาณมากเป็นเวลานานอาจทำให้เด็กเติบโตช้ากว่าปกติ
 - ผู้มีระบบภูมิคุ้มกันบกพร่อง
 - ผู้มีประวัติหรือเป็นโรคเกี่ยวกับการไหลเวียนเลือดผิดปกติ
 - ผู้เป็นโรคเบาหวาน
 - ผู้เป็นโรคต่อหินหรือต่อกระจุก
 - ไม่ควรใช้ผ้าพันแผลหรือพลาสติกปิดทับบริเวณที่ทายา
- แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรหากท่านอยู่ในกลุ่มต่อไปนี้
 - กำลังตั้งครรภ์หรือวางแผนที่จะตั้งครรภ์
 - กำลังให้นมบุตร
 - มีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน
 - มีการติดเชื้อที่ผิวหนัง

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- ก่อนใช้ยาควรล้างมือและผิวหนังที่จะทายาให้สะอาด และล้างมือหลังจากทายา ยกเว้นกรณีทายาเพื่อรักษาที่มือ ทายาบาง ๆ บริเวณผิวหนังที่มีรอยโรค วันละ 1 – 2 ครั้ง หรือตามที่แพทย์หรือเภสัชกรแนะนำ

- ไม่ใช้วัสดุใดๆ ปิดทับบริเวณที่ทายา นอกจากเป็นคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร โดยเฉพาะในเด็ก
- ไม่ควรใช้ยาต่อไปในกรณีรอยโรคหายหายดีแล้ว หรือใช้ยานานเกิน 4 สัปดาห์โดยไม่ได้รับการแนะนำโดยแพทย์หรือเภสัชกร
- หลีกเลี่ยงการทายานี้บริเวณใบหน้า ใกล้ดวงตา ขอพับ รักแร้ และบริเวณผื่นผ้าอ้อม หากไม่ได้รับคำแนะนำจากแพทย์หรือเภสัชกร
- ในกรณีจำเป็นต้องทายานี้บริเวณใบหน้า ไม่ควรทายานานเกิน 5 วัน

3.2 หากลืมใช้ยาควรทำอย่างไร

- ถ้าลืมทายานี้ ควรทาทันทีที่นึกได้
- ถ้าลืมทายานี้แล้วนึกได้เมื่อใกล้ครั้งถัดไป ให้รอทาครั้งถัดไปตามปกติ ด้วยปริมาณยาเท่าเดิม ไม่ควรเพิ่มปริมาณในการทายา

3.3 ถ้าทายานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติรุนแรง ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที
- ยานี้ อาจเป็นอันตรายหากกลืนยาเข้าไป อาจปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร หรือสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติรุนแรง ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที ถ้ากลืนยานี้ในปริมาณมาก ควรบ้วนปากด้วยน้ำมาก ๆ และไปพบแพทย์ทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา หากใช้ยานี้แล้วมีอาการระคายเคืองผิวหนัง หรือผิวหนังบางลง ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
- แจ้งแพทย์ หรือเภสัชกร หากใช้ยานี้ประมาณ 1 สัปดาห์แล้วอาการไม่ดีขึ้นหรือมีอาการแย่ลง

- แฉงแพทยหรือเกสัชกร หากสัมผัสกับผู้ป่วยเป็นโรคอีสุกอีใส หรือโรคหัดระหว่างที่ไ้ยยานี้
- ห้ามหยุดไ้ยาเอง หรือไ้ยาปริมาณมากเป็นระยะเวลาานเอง โดยไม่ปรึกษาแพทยหรือเกสัชกร
- ห้ามไ้ยาแก่ผู้อื่นที่มีอาการคล้ายกัน
- ยานี้ไม่สามารถไ้ทดแทนยาฆ่าเชื้อได้ และอาจทำให้การติดเชื่อนั้นแยลงได้ ควรปรึกษาแพทยหรือเกสัชกรหากสงสัยว่ามี การติดเชือ

5.อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทยทันที

- อาการแพ้ยา เช่น หายใจลำบาก ตาบวม หน้าบวม ปากบวม ลิ้นบวม คอบวม มือบวม แบนหน้าอก เวียนศีรษะรุนแรง
- ผิวหนังบาง เกิดจ้าเลือดงาย หรือเป็นจุดแดงคล้้า
- ผิวหนังเปลี่ยนสี
- ปวดศีรษะ และมีปัญหาการมองเห็น
- อาการแสดงของการติดเชือที่ผิวหนัง เช่น บวม แดง ร้อน และอาการระคายเคืองผิวหนัง มีหนองหรือน้าเหลืองซึม ปุ่มรากขนอักเสบ
- แผลบริเวณผิวหนังหายช้า
- หากทายาในปริมาณมากหรือไ้ยาเป็นระยะเวลาาน อาจทำให้เกิดอาการข้างเคียงทั่วร่างกาย เช่น เหนืองาย น้าน้กลด ปวดศีรษะ ข้อเท้าหรือเท้าบวม กระจายน้ามากขึ้น อยากอาหารมากขึ้น ปัสสาวะมากขึ้น ขนหรือผดกขึ้น

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยาแต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทยทันที

- ระคายเคืองผิวหนัง ผิวหนังแดง ปวดแสบร้อน คัน ผิวหนังแห้ง มีผื่น มีผด ผิวหนังอักเสบ เป็นสิ่ว ผิวหนังตั้ง ผิวหนังแตก ผิวหนังแตกลาย ผิวหนังลอก
- รู้สึกเหมือนถูกแมลงกัดต่อย มีอาการเป็นเหน็บหรือรู้สึกคล้ายถูกเข็มตำที่ผิวหนัง
- มีผื่นแดงหรือคันรอบริมฝีปาก

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย้าให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถห้องน้า
- เก็บให้พ้นสายตาและมือเด็ก

ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า/ผู้แทนจำหน่าย.....

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ

23 พฤษภาคม 2559

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทยหรือเกสัชกร