

เบตาเมทาโซนไดโพรพิโอเนด ความแรงร้อยละ 0.05 ชนิดยาทาขี้ผึ้ง [ข้อการคำ]

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีข้อสมัญญาอะไร

เบตาเมทาโซนไดโพรพิโอเนด เป็นยาทาชนิดขี้ผึ้ง จัดอยู่ในกลุ่มสเตอรอยด์

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

ยาทาเบตาเมทาโซนไดโพรพิโอเนด เป็นยาขี้ผึ้งทาผิวหนัง ใช้รักษาอาการอักเสบ บวมแดงคัน และระคายเคือง เช่น ผื่นผิวหนังอักเสบผื่นแพ้ชนิดต่าง ๆ โรคสะเก็ดเงิน รวมทั้งโรคผิวหนังอื่น ๆ

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- มีประวัติแพ้ยาเบตาเมทาโซนไดโพรพิโอเนด ยาสเตอรอยด์ชนิดอื่น หรือส่วนประกอบอื่นในยาขี้ผึ้ง
- กำลังเป็นสิ่วบางชนิดเพราะยาอาจกระตุ้นให้สิ่วบางชนิดกำเริบได้
- กำลังติดเชื้อไวรัสที่ผิวหนัง เช่น อีสุกอีใส งูสวัด เริม
- กำลังติดเชื้อแบคทีเรียที่ผิวหนัง
- กำลังติดเชื้อราที่ผิวหนังและปากอักเสบจากเชื้อรา
- กำลังติดเชื้อวัณโรคที่ผิวหนัง
- กำลังมีผิวหนังอักเสบบริเวณรอบปาก
- กำลังเป็นผื่นผ้าอ้อม
- มีอาการคันบริเวณอวัยวะเพศ
- มีแผลบริเวณผิวหนังหรือมีแผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวกเป็นบริเวณกว้าง

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ควรหลีกเลี่ยงหรือปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยานี้ ในกรณีต่อไปนี้ เพราะอาจทำให้โรครุนแรงขึ้น หรือเกิดอันตรายจากยานี้มากขึ้น
 - เด็กอายุน้อยกว่า 12 ปี เนื่องจากหากใช้ยาปริมาณมากเป็นเวลานานอาจทำให้เด็กเติบโตช้ากว่าปกติ
 - ผู้มีระบบภูมิคุ้มกันบกพร่อง
 - ผู้มีประวัติหรือเป็นโรคเกี่ยวกับการไหลเวียนเลือดผิดปกติ
 - ผู้เป็นโรคเบาหวาน
 - ผู้เป็นโรคต่อหินหรือต่อกระจุก
 - ไม่ควรทายาบริเวณใบหน้า โดยเฉพาะใกล้ดวงตา ท้องแขน รวมทั้งขาหนีบยกเว้นการใช้ตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร
 - ไม่ควรใช้ผ้าพันแผลหรือพลาสติกปิดทับบริเวณที่ทายา
 - ไม่ควรใช้ยาอื่นที่มีส่วนประกอบของสเตอรอยด์ร่วมด้วยเมื่อใช้ยานี้อยู่ หากรอยโรคไม่ดีขึ้นภายใน 2 สัปดาห์ ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
- แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรหากท่านอยู่ในกลุ่มต่อไปนี้
 - กำลังตั้งครรภ์หรือวางแผนที่จะตั้งครรภ์
 - กำลังให้นมบุตร
 - มีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน
 - มีการติดเชื้อที่ผิวหนัง

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค

- ก่อนใช้ยาควรล้างมือและผิวหนังที่จะทายาให้สะอาดและล้างมือหลังจากทายา ยกเว้นกรณีทายาเพื่อรักษาที่มือ ทายาบาง ๆ บริเวณผิวหนังที่มีรอยโรค วันละ 1 – 2 ครั้ง หรือตามที่แพทย์หรือเภสัชกรแนะนำ
- ไม่ใช่วัสดุใด ๆ ปิดทับบริเวณที่ทายา นอกจากเป็นคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรโดยเฉพาะในเด็ก
- ไม่ควรทายาในปริมาณมาก ทายาในบริเวณกว้างเป็นเวลานาน เช่น ทายาทุกวันติดต่อกันหลายสัปดาห์หรือหลายเดือน หรือทายาบ่อยกว่าที่แพทย์หรือเภสัชกรแนะนำ
- ไม่ควรใช้ยาต่อไปในกรณีรอยโรคหายดีแล้วหรือใช้ยานานเกิน 2-4 สัปดาห์โดยไม่ได้รับการแนะนำโดยแพทย์หรือเภสัชกร
- หลีกเลี่ยงการทายนี้นบริเวณใบหน้า ข้อพับ รักแร้ และบริเวณผื่นผ้าอ้อม ยกเว้นได้รับคำแนะนำจากแพทย์หรือเภสัชกร
- ในกรณีจำเป็นต้องทายนี้นบริเวณใบหน้า ไม่ควรทายนานเกิน 5 วัน
- ในกรณีจำเป็นต้องใช้ยาในเด็ก ไม่ควรใช้ยานานเกิน 5 วันสำหรับทุกส่วนของร่างกาย และไม่ควรทายาบริเวณที่ถูกปิดด้วยผ้าอ้อม เนื่องจากทำให้ยาดูดซึมเข้าสู่ร่างกายมากขึ้น

3.2 หากลืมใช้ยาควรทำอย่างไร

- ถ้าลืมทายนี้น ควรทาทันทีที่นึกได้
- ถ้าลืมทายนี้นแล้วนึกได้เมื่อใกล้ครั้งถัดไป ให้รอทาครั้งถัดไปตามปกติด้วยปริมาณยาเท่าเดิม ไม่ควรเพิ่มปริมาณในการทายา

3.3 ถ้าทายนี้นเกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติรุนแรง ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที
- ยานี้อาจเป็นอันตรายหากกลืนยาเข้าไป อาจปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติรุนแรง ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที ถ้ากลืน

ยานี้ในปริมาณมาก ควรบ้วนปากด้วยน้ำมาก ๆ และไปพบแพทย์หรือเภสัชกรทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา หากใช้ยานี้แล้วมีอาการระคายเคืองผิวหนัง หรือผิวหนังบางลง ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
- แจ้งแพทย์หรือเภสัชกร หากใช้ยานี้ประมาณ 1 สัปดาห์แล้วอาการไม่ดีขึ้นหรือมีอาการแย่ลง
- แจ้งแพทย์หรือเภสัชกร หากสัมผัสกับผู้ป่วยเป็นโรคอีสุกอีใส หรือ โรคหัด ระหว่างที่ใช้ยานี้
- ห้ามหยุดใช้ยาเอง หรือใช้ยาปริมาณมากเป็นระยะเวลานานเองโดยไม่ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
- ห้ามให้ยาแก่ผู้อื่นที่มีอาการคล้ายกัน
- ยานี้ไม่สามารถใช้ทดแทนยาฆ่าเชื้อได้ และอาจทำให้การติดเชื้อนั้นแย่ลงได้ ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรหากสงสัยว่ามีการติดเชื้อ

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- อาการแพ้ยา เช่น หายใจลำบาก ตาบวม หน้บวมปากบวม ลิ้นบวม คอบวม มือบวม แขนหน้าอก เวียนศีรษะรุนแรง
- ผิวหนังบาง เกิดจ้ำเลือดดำย หรือเป็นจุดแดงคล้ำ
- ผิวหนังเปลี่ยนสี
- ปวดศีรษะ และมีปัญหาการมองเห็น
- อาการแสดงของการติดเชื้อที่ผิวหนัง เช่น บวม แดง ร้อน และอาการระคายเคือง ผิวหนัง มีหนองหรือน้ำเหลืองซึม ปุ่มรากขน อักเสบ
- แผลบริเวณผิวหนังหายช้า
- หากทายาในปริมาณมากหรือใช้ยาเป็นระยะเวลานาน อาจทำให้เกิดอาการข้างเคียงทั่วร่างกาย เช่น เหนื่อยง่าย น้ำหนักลด ปวด

ศีรษะ ข้อเท้าหรือเท้าบวมกระหายน้ำมากขึ้น เพิ่มความอยากอาหาร ปัสสาวะเพิ่มขึ้น ขนหรือผมดกขึ้น

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

ระคายเคืองผิวหนัง ผิวหนังแดง ปวด แสบร้อน คัน ผิวหนังแห้ง มีผื่น มีผด ผิวหนังอักเสบเป็นสิ่วผิวหนัง ตึง หรือผิวหนังเป็นรอยแตก ผิวแตกลาย ผิวลอก รู้สึกเหมือนถูกแมลงกัดต่อยมีอาการเป็นเหน็บหรือรู้สึกคล้ายถูกเข็มตำที่ผิวหนัง

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถห้องน้ำ
- เก็บให้พ้นสายตาและมือเด็ก

ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า/ผู้แทนจำหน่าย.....
เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ
26 พฤษภาคม 2559

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ หากมีข้อสงสัยให้
ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร