

## คลอร์เฟนิรามีนมาลีเอต 2 มิลลิกรัม/ 5 มิลลิลิตร ชนิดน้ำเชื่อม

### 1. ยานี้คือยาอะไร

- ยานี้เป็นยาแก้แพ้ มีชื่อสามัญว่าคลอร์เฟนิรามีนมาลีเอต (chlorpheniramine maleate)
- ยานี้ใช้เพื่อป้องกันหรือบรรเทาอาการต่าง ๆ จากการแพ้ เช่น
  - น้ำมูกไหล น้ำตาไหล ตาแดง คันตา คันจมูก คันคอ จาม ลมพิษ ผื่นคัน
  - ไข้ลดน้ำมูกในโรคหวัด

### 2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

#### 2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือ ส่วนประกอบอื่นๆในยานี้
- ในเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี เพราะยากระตุ้นระบบประสาททำให้ชักได้
- ในผู้ที่กำลังมีอาการหอบหืด เพราะยาทำให้เสมหะเหนียวข้น และอาจอุดตันทางเดินหายใจได้
- ในผู้ที่กำลังใช้ยาหรือมีประวัติใช้ยารักษาภาวะซึมเศร้าบางชนิด ภายใน 14 วันที่ผ่านมา เพราะจะทำให้อาการข้างเคียงของยาเพิ่มขึ้นได้

#### 2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ควรหลีกเลี่ยงหรือปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยานี้ในกรณีต่อไปนี้ เพราะอาจทำให้โรครุนแรงขึ้นหรือเกิดอันตรายจากยานี้มากขึ้น
  - เด็กเล็ก และผู้สูงอายุ เนื่องจากจะไวต่อยานี้มากขึ้น
  - โรคหืด โรคหลอดลมอักเสบ หลอดลมพอง โรคถุงลมโป่งพอง โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
  - ความดันในลูกตาสูง โรคต้อหิน
  - ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด
  - โรคลมชัก
  - ต่อมไทรอยด์ทำงานมากกว่าปกติ
  - โรคตับ
  - ต่อมลูกหมากโต บีสสาวะขัด หรือ บีสสาวะคั่ง
  - ผู้ป่วยเบาหวาน เนื่องจากสูตรตำรับยามีน้ำตาลเป็นส่วนประกอบ
- แจ้งแพทย์หากท่านอยู่ในกลุ่มต่อไปนี้
  - กำลังตั้งครรภ์ โดยเฉพาะในช่วง 2 สัปดาห์ก่อนคลอด เพราะอาจมีอันตรายต่อทารกในครรภ์ แต่แพทย์อาจพิจารณาสั่งใช้ยานี้ หากมีเหตุผลทางการแพทย์
  - กำลังให้นมบุตร เพราะยาถูกขับออกทางน้ำนมได้ และอาจลดการสร้างน้ำนม
- **ไม่ควรใช้ยานี้ร่วมกับยาหรือเครื่องดื่มต่อไปนี้** เพราะอาจมีผลต่อการรักษาหรือเกิดอันตรายได้ เช่น
  - เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ
  - ยาทางจิตเวช เช่น ยารักษาภาวะซึมเศร้าบางชนิด ยานอนหลับ ยาคลายกังวล
  - ยาแก้ปวดบางชนิด
  - ยาแก้แพ้ชนิดอื่น ๆ

### 3. วิธีใช้ยา

#### 3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค

#### ขนาดยาโดยทั่วไป

- เด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี: ไม่แนะนำให้ใช้ยานี้
- เด็ก 1-2 ปี: กินครั้งละ 1 มิลลิกรัม (ครึ่งช้อนชา หรือ 2.5 มิลลิลิตร) วันละ 2 ครั้ง ขนาดยาสูงสุดไม่ควรเกิน 2 มิลลิกรัม (1 ช้อนชา หรือ 5 มิลลิลิตร) ต่อวัน
- เด็ก 2-6 ปี: กินครั้งละ 1 มิลลิกรัม (ครึ่งช้อนชา หรือ 2.5 มิลลิลิตร) ทุก 4-6 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 6 มิลลิกรัม (3 ช้อนชา หรือ 15 มิลลิลิตร) ต่อวัน
- เด็ก 6-12 ปี: กินครั้งละ 2 มิลลิกรัม (1 ช้อนชา หรือ 5 มิลลิลิตร) ทุก 4-6 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 12 มิลลิกรัม (6 ช้อนชา หรือ 30 มิลลิลิตร) ต่อวัน
- ผู้ใหญ่และเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป: กินครั้งละ 4 มิลลิกรัม (2 ช้อนชา หรือ 10 มิลลิลิตร) ทุก 4-6 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 24 มิลลิกรัม (12 ช้อนชา หรือ 60 มิลลิลิตร เม็ด) ต่อวัน
- ยานี้จะกินก่อนหรือหลังอาหารก็ได้ แต่ถ้ากินยาแล้วปวดมวนท้องอาจกินยาพร้อมอาหารหรือนม

#### 3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- ให้กินยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าใกล้เวลาของมื้อต่อไป ให้รอกินยาของมื้อต่อไป และห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

**3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร**  
ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

#### 4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ก่อนใช้ยานี้ ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้ใช้ยาอื่น ๆ ที่มีส่วนผสมของคลอโรเฟนิรามีนมาลีเอต หรือยาแก้แพ้ชนิดอื่นอยู่ เพราะอาจทำให้ได้รับยาเกินขนาดได้
- ระมัดระวังในการขับขี่ยานยนต์หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล หรือทำงานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง เพราะยานี้ทำให้ง่วงซึม
- หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ เพราะอาจทำให้ง่วงซึมมากขึ้น
- ควรดื่มน้ำมากๆ เพราะยานี้ทำให้ปากแห้ง เสมหะเหนียวข้น
- ถ้าต้องทำการทดสอบภูมิแพ้ ควรแจ้งให้แพทย์ทราบว่าคุณกำลังใช้ยานี้อยู่
- สูตรตำรับยามีน้ำตาลเป็นส่วนประกอบอาจเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดฟันผุได้ ควรดูแลสุขอนามัยในช่องปาก

#### 5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

##### 5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

เช่น

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำเลือดตามผิวหนัง รอยฟกช้ำ หรือเลือดออกผิดปกติ
- อ่อนเพลียรุนแรง
- เวียนหัวรุนแรง
- สับสน กระสับกระส่าย ชัก
- ตาพร่าหรือการมองเห็นผิดปกติ
- ใจสั่นผิดปกติ
- บั๊สสาวะลำบาก บั๊สสาวะน้อยลงผิดปกติ

##### 5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ เช่น

- ง่วงซึม นอนไม่หลับ
- ปวดหัว เวียนหัว
- ปากแห้ง จมูกแห้ง คอแห้ง
- คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร ท้องผูก หรือท้องเสีย

#### 6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรงโดยทั่วไป ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาทุกชนิดให้พ้นมือเด็ก

ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า/ผู้แทนจำหน่าย

.....  
เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2559

ข้อมูลยานี้เป็นข้อมูลโดยย่อ  
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

