

**เบทามาโนชนวารเลอเรต
ความแรงร้อยละ 0.1
ชนิดยา naïve สารละลายทางภายนอก
[ข้อการค้า]**

1. ยานี้คือยาอะไร

1.1 ยานี้มีชื่อสามัญว่าอะไร

เบตามาโนชนวารเลอเรต เป็นยาทางชั้นนำสารละลายทางภายนอก จัดอยู่ในกลุ่มสเตอร์อรอยด์

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

ยาทางเบตามาโนชนวารเลอเรต เป็นยาทางชั้นนำสารละลายทางผิวนัง ใช้รักษาอาการอักเสบบวม แดง และคัน เช่น ผื่นผิวนังข้อเสบ ผื่นแพ้ชนิดต่าง ๆ หรือผื่นแมลงกัดต่อย

2. ข้อควรรู้ก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เมื่อเคยแพ้ยาที่ หรือยากระดูกสเตอร์อรอยด์ชนิดอื่น

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยา

- ควรหลีกเลี่ยงหรือปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ก่อนใช้ยานี้ ในกรณีต้องไปน้ำ เพราะอาจทำให้โรคrun แรงขึ้น หรือเกิดอันตรายจากยานี้มากขึ้น

- เด็ก เนื่องจากหากใช้ยาปริมาณมากเป็นเวลานานอาจทำให้เด็กเดินโดยช้ากว่าปกติ
- เป็นโรคติดเชื้อที่ยังไม่ได้รับการรักษา หรือมีปัญหาเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย เนื่องจากยานี้มีฤทธิ์กดภูมิคุ้มกัน
- มีประวัติหรือเป็นโรคเกี่ยวกับการไหลเวียนเลือดปกติ เพราะอาจทำให้เกิดแผลได้ง่าย
- เป็นโรคเบาหวาน เพราะอาจทำให้แพลทีผิวนังหายชา
- เป็นโรคสะเก็ดเงิน เพราะอาจกระตุนให้โรคกำเริบมากขึ้น
- แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรหากห่านอยู่ในกลุ่มต้องไปน้ำ

- กำลังตั้งครรภ์หรือมีแนวโน้มที่จะตั้งครรภ์
- กำลังให้นมบุตร

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยาที่เข้มข้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- ก่อนใช้ยาควรล้างมือและผิวนังที่จะหายใจสะอาด
- หายใจบาง ๆ บริเวณผิวนังที่มีรอยโรค วันละ 1 – 2 ครั้ง หรือตามที่แพทย์หรือเภสัชกรแนะนำ
- ไม่ใช้วัสดุใดๆ ปิดทับบริเวณที่หายใจ นอกจากเป็นค่าแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร
- หลีกเลี่ยงการหายใจนับบริเวณใบหน้า ข้อพับ และรักแร้

3.2 หากลืมใช้ยาควรทำอย่างไร

- ถ้าลืมหายยาที่ควรทานที่ที่นึกได้
- ถ้าลืมหายยาที่แล้วนึกได้เมื่อใกล้ครั้งถัดไป ให้รอครั้งถัดไปตามปกติ ด้วยปริมาณยาเท่าเดิม ไม่ควรเพิ่มปริมาณในการทาน

3.3 ถ้าหายานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติรุนแรง ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที
- ยานี้อาจเป็นอันตรายหากกลืนยาเข้าไป ถ้าผู้ป่วยกลืนยาที่ในปริมาณมาก ควรบ้วนปากด้วยน้ำมาก ๆ และไปพบแพทย์ทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- พับแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา
- แจ้งแพทย์หรือเภสัชกร หากใช้ยาที่ประมาณ 1 – 2 สปีด้าหรืออาการไม่ดีขึ้นหรือมีอาการแย่ลง
- หากยาสัมผัสบริเวณจมูกหรือปากควรล้างด้วยน้ำปริมาณมาก

- ไม่ควรใช้ยาเป็นระยะเวลานานเกินกว่าที่แพทย์หรือเภสัชกรแนะนำ

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยา**แล้วรีบไปพบแพทย์ทันที**

- อาการแพ้ยา เช่น หายใจลำบาก หายใจเสียงริด ตาบวม หน้าบวม ปากบวม เจ็บแน่นหน้าอก มีฝัน
- ผิวนังบวมเกิดจ้ำเลือดง่าย
- ผิวนังเปลี่ยนสี ปวดศีรษะ และมีปัญหาการมองเห็น
- อาการแสดงของการติดเชื้อที่ผิวนัง เช่น บวม แดง ร้อน มีหนอง หรือ ปูมรากขนอักเสบ
- หากหายใจในปริมาณมาก หรือใช้ยาเป็นระยะเวลานาน และใช้วัสดุปิดทับผิวนังที่หายใจ อาจทำให้เกิดอาการข้างเคียงทั่วร่างกาย เช่น หน้าบวม ตัวบวม ขันหรือผดดกขึ้น

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา** แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที**

- ระคายเคืองผิวนัง แสบ คัน

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้งอย่าให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไป ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ห้องน้ำ
- เก็บให้พ้นสายตาและมือเด็ก

ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า/ผู้แทนจำหน่าย.....
เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ

26 พฤษภาคม 2559

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร