

## ซีเทอริซีนไฮโดรคลอไรด์ 10 มิลลิกรัม ชนิดเม็ด

### 1. ยานี้คืออะไร

- ยานี้เป็นยาแก้แพ้ มีชื่อสามัญว่า ซีเทอริซีนไฮโดรคลอไรด์ (cetirizine hydrochloride)
- ยานี้ใช้เพื่อบรรเทาอาการต่าง ๆ จากการแพ้ เช่น
  - น้ำมูกไหล ตาแดง คันดา คันจมูก คันคอ จาม ในโรคเยื่อจมูกอักเสบหรือไข้ละอองฟาง
  - ใช้เพื่อบรรเทาทางผิวหนัง เช่น คัน ผื่นลมพิษ

### 2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

#### 2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้หรือยาไฮดรอกซีซีน (hydroxyzine) หรือ ส่วนประกอบอื่นๆในยานี้
- มีการทำงานของไตบกพร่องอย่างรุนแรง

#### 2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- **ควรหลีกเลี่ยงหรือปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยานี้ ในกรณีต่อไปนี้ เพราะอาจทำให้โรครุนแรงขึ้น หรือเกิดอันตรายจากยานี้มากขึ้น**
  - เด็กอายุน้อยกว่า 6 เดือน
  - โรคลมชัก
  - ต่อมลูกหมากโต ปัสสาวะขัด หรือ ปัสสาวะคั่ง
  - โรคไต

#### • แจ้งแพทย์หากท่านอยู่ในกลุ่มต่อไปนี้

- กำลังตั้งครรภ์
- กำลังให้นมบุตร เพราะยาถูกขับออกทางน้ำนมได้ แต่แพทย์อาจพิจารณาสั่งใช้ยานี้ หากมีเหตุผลทางการแพทย์

#### • **ไม่ควรใช้ยานี้ร่วมกับยาหรือเครื่องดื่มต่อไปนี้ เพราะอาจมีผลต่อการรักษาหรือเกิดอันตรายได้ เช่น**

- เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ
- ยานอนหลับหรือยาคลายกังวล
- ยาต้านไวรัสเอดส์บางชนิด (เช่น ริโทนาเวียร์)

### 3. วิธีใช้ยา

#### 3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือ เภสัชกรอย่างเคร่งครัด

#### 3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- ให้กินยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าใกล้เวลาของมื้อต่อไป ให้รอกินยาของมื้อต่อไป และห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

#### 3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

ข้อมูลยานี้เป็นข้อมูลโดยย่อ  
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

### 4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- หากใช้ยานี้แล้วมีอาการวงเวียนศีรษะ ตาพร่า ควรหลีกเลี่ยงการขับขี่ยานยนต์หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล หรือทำงานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง

### 5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

#### 5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที เช่น

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตาริมฝีปาก ลมพิษ
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก แขนหน้าอก หายใจลำบาก
- มีจ้ำเลือดตามผิวหนัง รอยฟกช้ำ หรือเลือดออกผิดปกติ
- หน้ามืด เป็นลม
- ตัวเหลือง ตาเหลือง อุจจาระมีสีซีดลง
- เหนื่อย หรืออ่อนเพลียรุนแรง
- ใจสั่น หัวใจเต้นผิดปกติ
- สับสน อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย ชัก
- การมองเห็น หรือการได้ยินผิดปกติ
- ความดันเลือดสูง
- ปัสสาวะลำบาก ปัสสาวะน้อยลง

#### 5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที เช่น

- ง่วงซึม นอนไม่หลับ
- ปากแห้ง
- เวียนหัว ปวดหัว
- อ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย
- คลื่นไส้ ปวดท้อง ท้องเสีย
- ผิวหนังไวต่อแสง

## 6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- แกะยาออกจากแผงเมื่อจะกินในแต่ละครั้งเท่านั้น
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไป ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บให้พ้นสายตาและมือเด็ก

ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า/ผู้แทนจำหน่าย

.....  
เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2559

ข้อมูลยานี้เป็นข้อมูลโดยย่อ  
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร