

โลเพอราไมด์ 2 มิลลิกรัม

ชนิดแคปซูล

1. ยานี้คืออะไร

- ยานี้เป็นยาบรรเทาอาการท้องร่วง มีชื่อสามัญว่า โลเพอราไมด์ ไฮโดรคลอไรด์ (loperamide hydrochloride)
- ยานี้ใช้เพื่อบรรเทาอาการท้องร่วงเฉียบพลันหรืออาการท้องร่วงเรื้อรัง

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เมื่อเคยแพ้ยานี้ หรือเคยแพ้ส่วนประกอบอื่นๆ ในยานี้
- ในเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี
- ในผู้ที่ เป็นโรคท้องร่วงแบบที่มีการติดเชื้อแบคทีเรียโดยสังเกตจากการถ่ายอุจจาระเป็นมูกหรือมีเลือดปน หรือ ท้องร่วงร่วมกับมีไข้สูง
- ในผู้ที่ เป็นโรคท้องร่วงจากการกินยาด้านเชื้อแบคทีเรีย
- ในผู้ที่มีอาการท้องร่วงร่วมกับปวดท้องมาก
- ในผู้ที่มีอาการปวดมวนท้องแต่ไม่มีอาการท้องร่วง

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ควรหลีกเลี่ยงหรือปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยานี้ ในกรณีต่อไปนี้

- โรคเอดส์ เนื่องจากอาจเกิดอาการข้างเคียงที่รุนแรงจากยาได้
- โรคตับ เนื่องจากอาจเกิดพิษจากยาได้ง่าย

- **แจ้งแพทย์หากท่านอยู่ในกลุ่มต่อไปนี้**
 - **กำลังตั้งครรภ์** เนื่องจากต้องระมัดระวังการใช้ยาเป็นพิเศษ
 - **กำลังให้นมบุตร** เพราะยาถูกขับออกทางน้ำนมได้เล็กน้อย
- **ไม่ควรใช้ยานี้ร่วมกับยาต่อไปนี้** เพราะอาจมีผลต่อการรักษาหรือเกิดอันตรายได้ เช่น
 - ยารักษาเชื้อราบางชนิด
 - ยาลดไขมันในเลือดบางชนิด
 - ยารักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ
 - ยาต้านไวรัสเอดส์บางชนิด

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- **ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร** เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- **ยานี้กินยาเวลาใดก็ได้** กินก่อนอาหารหรือหลังอาหารก็ได้
- **อย่ากินยาเกินกว่าขนาดที่แนะนำโดยแพทย์หรือเภสัชกร**

3.2 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง เช่น ปัสสาวะลำบาก ง่วงซึม หงุดหงิด หายใจอ่อนแรง กล้ามเนื้อแขนขาแข็งหรือการเคลื่อนไหวของร่างกายไม่ประสานกัน ให้รีบพบแพทย์หรือไปโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- หากใช้ยาแล้ว อาการท้องร่วงยังไม่ดีขึ้นภายใน 2 วัน ควรไปพบแพทย์ เพราะยานี้เพียงแต่ทำให้จำนวนครั้งของการถ่ายลดลง แต่ไม่ได้รักษาสาเหตุของอาการท้องร่วง
- ระมัดระวังการขับขี้นานยนต์หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล หรือทำงานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง เพราะท่านอาจอ่อนแรงจากอาการท้องร่วงและยาอาจทำให้มีอาการง่วงซึม หรือเวียนศีรษะ
- **ควรดื่มสารละลายจากผงน้ำตาลเกลือแร่** ในขณะท้องร่วงเพื่อชดเชยน้ำและเกลือแร่ที่เสียไป โดยเฉพาะในเด็ก คนชรา และผู้ที่มีร่างกายอ่อนแอ

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที เช่น

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผื่นหนังหลุดลอก มีจ้ำเลือดตามผิวหนัง รอยฟกช้ำ หรือเลือดออกผิดปกติ
- อ่อนเพลียรุนแรง
- เวียนหัวรุนแรง
- สับสน กระสับกระส่าย ชัก
- ตาพร่าหรือการมองเห็นผิดปกติ
- ใจสั่นผิดปกติ
- ปัสสาวะลำบาก ปัสสาวะน้อยลงผิดปกติ

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ เช่น

- ง่วงซึม นอนไม่หลับ
- ปวดหัว เวียนหัว
- ปากแห้ง จมูกแห้ง คอแห้ง
- คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร ท้องผูก หรือท้องเสีย

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง ปล่อยให้โดนแสงโดยตรงโดยทั่วไป ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส
- ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

**ข้อมูลยานี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัย ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**

ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า/ผู้แทนจำหน่าย.....
เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 31 สิงหาคม 2559