

**อะซีทิลซิสทีน**  
**600 มิลลิกรัม ชนิดเม็ดฟู และ**  
**100, 200, 300 และ 600 มิลลิกรัม**  
**ชนิดแกรนูล**

### 1. ยานี้คือยาอะไร

- ยานี้มีชื่อสามัญว่า อะซีทิลซิสทีน (Acetylcysteine) เป็นยาละลายเสมหะ
- เป็นยาช่วยละลายเมือกและเสมหะ ในโรคที่เกี่ยวข้องกับการหายใจทั้งชนิดเฉียบพลันและเรื้อรัง ได้แก่ โรคหลอดลมอักเสบทั้งเฉียบพลันและเรื้อรัง ถุงลมโป่งพอง

### 2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

#### 2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้หรือส่วนประกอบของยานี้
- ห้ามใช้สูตรตำรับที่มีแอสปาแตมเป็นส่วนประกอบในผู้ป่วยที่มีอาการฟีนิลคีโตนูเรีย
- ห้ามใช้ยาเม็ดฟู 600 มิลลิกรัม ในเด็กอายุน้อยกว่า 14 ปี

#### 2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ผู้ป่วยโรคหอบหืดหรือมีประวัติเป็นโรคหอบหืด ควรใช้ด้วยความระมัดระวัง เมื่อมีอาการหลอดลมบีบเกร็งให้หยุดการใช้ยานี้
- ควรใช้อย่างระมัดระวังในผู้ป่วยที่เป็นโรคแผลในกระเพาะหรือหลอดอาหาร เนื่องจากยามีกลิ่นฉุนและระคายเคืองทางเดินอาหาร ทำให้กระตุ้นการอาเจียนและมีผลต่อแผลได้

- ไม่ควรใช้ยานี้ร่วมกับยาบางชนิด เนื่องจากอาจมีผลต่อการรักษาหรือเกิดอันตรายได้ เช่น ยาขยายหลอดเลือดกลุ่มไนเตรต และยากันชักคาร์บามาซิปีน เป็นต้น

### 3. วิธีใช้ยา

#### 3.1 ขนาดและวิธีใช้

##### • ขนาดยาที่แนะนำ

##### - ผู้ใหญ่

##### แกรนูล

รับประทานครั้งละ 200 มิลลิกรัม (100 มิลลิกรัม 2 ซอง หรือ 200 มิลลิกรัม 1 ซอง) วันละ 3 ครั้ง

##### ยาเม็ดฟู

รับประทานครั้งละ 600 มิลลิกรัม วันละ 1 ครั้ง

##### - เด็ก

##### แกรนูล

รับประทานครั้งละ 100 มิลลิกรัม วันละ 2-4 ครั้ง ในรายที่มีอาการเฉียบพลันให้รับประทานต่อเนื่อง 5-10 วัน ส่วนรายที่มีอาการเรื้อรังให้รับประทานตามแพทย์สั่ง

- **ขนาดยาที่แนะนำ** ละลายผงยาด้วยน้ำปริมาณครึ่งแก้วก่อนรับประทาน โดยให้รับประทานพร้อมอาหาร

#### 3.2 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

**ข้อมูลยานี้เป็นข้อมูลโดยย่อ**  
**หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**

### 4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ก่อนใช้ยาควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
- ยานี้ควรเจือจางในน้ำปริมาณประมาณครึ่งแก้ว ก่อนรับประทาน เพื่อลดกลิ่นฉุนและลดการระคายเคืองต่อทางเดินอาหาร
- การละลายยาด้วยเครื่องตีต่างๆ จะช่วยกลมกลืนและรสชาติไม่พึงประสงค์ลงได้
- การรับประทานยานี้อาจทำให้เกิดผื่น

### 5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

#### 5.1 อาการที่ต้องไปพบแพทย์ทันที

ปฏิกิริยาการแพ้ขั้นรุนแรง ซึ่งมีอาการทั้งหมด ได้แก่ ผื่น ลมพิษ คัน หน้าแดง ผิวน้ำแดง ความดันโลหิตต่ำ หลอดลมหดเกร็ง หายใจลำบาก เป็นต้น

#### 5.2 อาการที่ยังไม่ต้องรีบไปพบแพทย์ทันที แต่ **ถ้ามีอาการรุนแรงควรไปพบแพทย์ทันที**

- คลื่นไส้
- อาเจียน
- ท้องเสีย
- ผื่นผิวหนัง

### 6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บให้พ้นสายตาและมือเด็ก

ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า/ผู้แทนจำหน่าย.....

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2259