

ยาลดกรด

ชนิดเม็ด และชนิดน้ำแขวนตะกอน

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อสามัญทางยาว่าอะไร

- ยานี้เป็นยาลดกรด เป็นยาสูตรผสมระหว่างยาที่มีชื่อสามัญว่า อลูมิเนียม ไฮดรอกไซด์ (aluminium hydroxide) และ แมกนีเซียม ไฮดรอกไซด์ (Magnesium hydroxide) และ ไซเมทิกอน (Simethicone)

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- รักษาอาการที่เกิดจากกรดในกระเพาะอาหารมากเกินไป อาการแสบยอดอก ท้องอืด

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไหร่

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบอื่นในตำรับยา

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ระวังการใช้ในผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ มีการสูญเสียน้ำออกจากร่างมาก ท้องผูก มีการทำงานของไตบกพร่อง หรือมีนิ่วในไต

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ยาเม็ด กินครั้งละ 1-2 เม็ด วันละ 4 ครั้ง หลังอาหารสามมื้อ และก่อนนอน โดยเคี้ยวเม็ดยาให้ละเอียดก่อนกลืน
- ยาน้ำแขวนตะกอน กินครั้งละ 1-2 ช้อนชา วันละ 4 ครั้ง หลังอาหารสามมื้อและก่อนนอน โดยให้เขย่าขวดก่อนใช้ทุกครั้ง

3.2 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติรุนแรง เช่น บวม เหงื่อเย็น หายใจลำบาก ให้รีบนำส่งโรงพยาบาล

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างการใช

ระหว่างใช้ยานี้ควรปฏิบัติอย่างไร

- ยานี้ใช้ออกฤทธิ์ได้ดีเมื่อมีภาวะกรดเกินในกระเพาะอาหารแล้ว ไม่ได้ใช้ในการป้องกันการหลังกรดในกระเพาะอาหาร ถ้าอาการของโรคไม่บรรเทาหรือรุนแรงขึ้นควรไปพบแพทย์เพื่อปรับแผนการรักษา
- ยานี้มีส่วนผสมของอะลูมิเนียมซึ่งอาจทำให้ยาหลายชนิดมีการดูดซึมลดลง จึงควรแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้งว่าท่านกำลังกินยา สมุนไพร หรืออาหารเสริมอะไรเป็นประจำ
- แนะนำให้มีการปรับพฤติกรรมร่วมกับการใช้ยานี้ เช่น ลดความเครียด หยุดสูบบุหรี่ จำกัดการดื่มแอลกอฮอล์ และหลีกเลี่ยงกินอาหารรสเผ็ดจัด การกินอาหารไขมันสูง การดื่มกาแฟ

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ
- อาการปวดแสบหัวใจ

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- ท้องผูก และอาจทำให้เกิดริดสีดวงทวารทางเดินอาหารอุดตัน แต่สามารถบรรเทาอาการนี้โดยการดื่มน้ำมากๆ หรือใช้ยาลดกรดที่มีส่วนผสมของแมกนีเซียม หรือกินร่วมกับยาระบายที่ทำให้อุจจาระนิ่มลง

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บยาไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า/ผู้แทนจำหน่าย.....
เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2559

ข้อมูลยานี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร