

## บิสแซโคดิล 5 มิลลิกรัม ชนิดเม็ดเคลือบแตกตัวในลำไส้

### 1. ยานี้คืออะไร

- ยานี้เป็นยาระบาย มีชื่อสามัญว่า บิสแซโคดิล (Bisacodyl)
- ออกฤทธิ์โดยกระตุ้นหรือเพิ่มการบีบตัวของลำไส้ใหญ่ ช่วยให้ถ่ายอุจจาระเพื่อ
  - บรรเทาอาการท้องผูก
  - ขับอุจจาระก่อนตรวจหรือผ่าตัดลำไส้
  - ขับอุจจาระก่อนตรวจหรือผ่าตัดลำไส้ใหญ่หรือทวารหนัก

### 2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

#### 2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยาบิสแซโคดิลหรือส่วนประกอบอื่นๆ ในยานี้
- มีภาวะลำไส้อุดตัน ลำไส้อักเสบเฉียบพลัน มีแผลในลำไส้ใหญ่
- มีภาวะขาดน้ำรุนแรง ปวดท้องรุนแรง คลื่นไส้ อาเจียนรุนแรง
- เพิ่งผ่าตัดลำไส้ หรือใส่ด่างอักเสบเฉียบพลัน

ข้อมูลยานี้เป็นข้อมูลโดยย่อ

หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร  
Control Version 00 : 20170105

- ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยานี้หากท่านมีประวัติของโรคลำไส้อักเสบ ริดสีดวงทวารหนัก หรือมีเลือดออกทางทวารหนัก ควรใช้ยาเมื่อจำเป็นเท่านั้น

- ระวังการใช้ยานี้ในผู้ที่มีอาการปวดท้องหรือคลื่นไส้อาเจียนร่วมด้วยหรือยังไม่สามารถถ่ายอุจจาระหลังจากกินยานี้
- การใช้ยานี้ในเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
- การใช้ยานี้เป็นประจำ อาจทำให้ติดยาเนื่องจากลำไส้ขาดแรงบีบตัว ทำให้ไม่สามารถถ่ายอุจจาระได้เองหากไม่กินยา

### 3. วิธีใช้ยา

#### 3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ขนาดยาในผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับโรค อายุ และน้ำหนักตัว จึงควรใช้ตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น

#### ขนาดยาโดยทั่วไป

- ผู้ใหญ่: กินครั้งละ 1-2 เม็ด วันละ 1 ครั้ง ก่อนนอน
- เด็กอายุมากกว่า 6 ปี: กินครั้งละ 1 เม็ด วันละ 1 ครั้ง ก่อนนอน
- เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี: ควรใช้ตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร

#### 3.2 ลืมกินยา ทำอย่างไร

- ถ้าลืมกินยา ให้ข้ามไปกินมื้อต่อไป เพราะยานี้กินเมื่อมีอาการท้องผูกเท่านั้น เมื่อไม่มีอาการก็ไม่ต้องกินยา ห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

#### 3.3 ถ้าใช้ยาเกินขนาดที่แนะนำควรทำอย่างไร

- อาการที่มักพบ เช่น ปวดเกร็งท้อง ท้องร่วงรุนแรง อ่อนเพลียรุนแรงจากการสูญเสียน้ำ และเกลือแร่ในร่างกาย กระจายน้ำมากหรือปากแห้ง กล้ามเนื้อเกร็ง
- หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้หยุดใช้ยาทันทีและรีบนำส่งโรงพยาบาล

### 4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างการใช้อย่างไร

#### ข้อควรปฏิบัติ ขณะใช้ยานี้

- หลีกเลี่ยงการใช้ยานี้ติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน เนื่องจากอาจทำให้ระบบการขับถ่ายผิดปกติ เช่น ท้องผูกเรื้อรังเนื่องจากลำไส้ไม่บีบตัว
- ดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ 6-8 แก้ว รับประทานอาหารที่มีกากใย เช่น ผัก ผลไม้ และออกกำลังกายสม่ำเสมอ
- ควรถ่ายอุจจาระทุกวันให้เป็นนิสัย ไม่กั้นอุจจาระ
- ถ้ายังคงมีอาการท้องผูกหลังใช้ยานี้ ควรปรึกษาแพทย์เพื่อหาสาเหตุของอาการท้องผูก

## 5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

### 5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที อันตรายของยามีอะไรบ้าง

- แพ้ยาขั้นรุนแรงซึ่งต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที อาการที่พบ เช่น บวมที่ใบหน้า เปลือกตาริมฝีปาก ลมพิษ หน้ามืดเป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวนิ่งหลุดลอก มีจ้ำตามผิวนิ่งหรือเลือดออกผิดปกติ
- เกิดอาการข้างเคียงชนิดรุนแรงซึ่งต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที เช่น อาเจียนรุนแรง ท้องร่วงรุนแรง อ่อนเพลียรุนแรง มึนงง หน้ามืดเป็นลม มีภาวะขาดน้ำรุนแรง

### 5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้าทนไม่ได้ ให้ไปพบแพทย์

- เกิดอาการข้างเคียงชนิดไม่รุนแรงไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงหรือเกิดต่อเนื่องให้ไปพบแพทย์ทันที เช่น ถ่ายเหลว ท้องอืด ท้องผูก คลื่นไส้ อาเจียน ปวดเกร็งท้อง อ่อนเพลีย น้ำหนักลด

## 6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บยาไว้ในภาชนะบรรจุเดิม แยกยาออกจากแผงเมื่อจะกินในแต่ละครั้งเท่านั้น
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิห้องไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส
- ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาทุกชนิดให้พ้นมือเด็ก

ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า/ผู้แทนจำหน่าย.....  
เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2559

ข้อมูลยานี้เป็นข้อมูลโดยย่อ

หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร