

ฟลูนาไรซีน 5 มิลลิกรัม

ชนิดเม็ด

1. ยานี้คืออะไร

- ยานี้มีชื่อสามัญว่า ฟลูนาไรซีนไฮโดรคลอไรด์ (flunarizine hydrochloride) อยู่ในกลุ่มยาขยายหลอดเลือดส่วนปลาย
- ใช้ป้องกันอาการปวดศีรษะข้างเดียว (ไมเกรน)
- ควรเลือกใช้ยานี้ เป็นยาอันดับรอง และภายใต้คำแนะนำของแพทย์ และเภสัชกร

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อใด

- แพ้ยานี้ หรือแพ้ยาที่มีโครงสร้างคล้ายกัน เช่น ซินนาริซีน (cinnarizine)
- เคยเป็นหรือกำลังเป็นโรคซึมเศร้า
- เป็นผู้ที่มีอาการของโรคพาร์กินสัน

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ยานี้อาจทำให้โรคอื่นรุนแรงขึ้นหากท่านมีโรคประจำตัวดังต่อไปนี้
 - เป็นโรคตับ
- ผู้ป่วยบางกลุ่มอาจได้รับอันตรายจากยานี้มากขึ้นได้แก่
 - อายุมากกว่า 60 ปี
 - เพศหญิงที่มีประวัติเป็นโรคซึมเศร้า
- ยังไม่มีข้อมูลความปลอดภัยของการใช้ยานี้ในผู้ป่วยบางกลุ่ม ได้แก่
 - เด็ก
 - หญิงมีครรภ์
 - สตรีให้นมบุตร
- ไม่ควรใช้ยานี้ร่วมกับ ยานอนหลับหรือยากล่อมประสาท และไม่ควรดื่มแอลกอฮอล์ เพราะอาจทำให้เกิดอาการง่วงซึม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเริ่มต้นของการรักษา
- ควรระมัดระวังเมื่อควบคุมเครื่องจักรหรือขับขี่ยานยนต์ เพราะยานี้อาจทำให้ง่วงได้

Control Version 00 : 20170105

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น ขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับอายุของผู้ป่วยและการตอบสนองต่อการรักษา
- ไม่ใช้ยานี้เกินกว่าขนาดยาที่แพทย์สั่ง
- ในแต่ละสัปดาห์ควรกินยาต่อเนื่องกันเพียง 5 วันและหยุดยา 2 วัน (เช่นหยุดกินยาในวันเสาร์และอาทิตย์) เพื่อลดอันตรายจากการใช้ยานี้อย่างต่อเนื่อง
- ไม่ควรกินยานี้อย่างต่อเนื่องด้วยตนเอง โดยไม่ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร เพราะอาจเกิดอันตรายจากยาได้

3.2 หากลืมกินยา ควรทำอย่างไร

- กินยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้านึกได้ใกล้กับมื้อถัดไป ให้เว้นยาในมื้อนั้น แล้วรอกินยาของมื้อต่อไป โดยห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง เช่น ง่วงซึมมาก สันผิปกติ หัวใจเต้นเร็ว ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างการใช้ยา

- กินยานี้อย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร
- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา
- หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
- รับประทานยานอนหลับหรือยากล่อมประสาทร่วมด้วยเมื่อแพทย์สั่งเท่านั้น

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ

หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก
- มีอาการของภาวะซึมเศร้า เริ่มนอนหลับยาก วิดกกังวล
- เคลื่อนไหวช้าลงมาก กล้ามเนื้อเคลื่อนไหวอย่างควบคุมไม่ได้หรือกล้ามเนื้อแข็งเกร็ง

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- ง่วงนอน เฉื่อยชาผิดปกติ
- คัดจมูกหรือมีน้ำมูก
- ท้องผูก หรือรู้สึกไม่สบายท้อง
- ปวดกล้ามเนื้อ
- เจ็บปวดเต้านม เต้านมโต มีของเหลวไหลจากหัวนม ประจำเดือนไม่สม่ำเสมอ หรือประจำเดือนขาด

6. ควรเก็บยาอย่างไร

- เก็บไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- แกะยาออกจากแผงเมื่อจะกินในแต่ละครั้งเท่านั้น
- เก็บยาในที่แห้ง อบอุ่นโดยแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส
- ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาทุกชนิดให้พ้นมือเด็ก

ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า/ผู้แทนจำหน่าย.....
เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2559