

คอลชิซิน 0.6 มิลลิกรัม

ชนิดแคปซูล

[ข้อควรคำ]

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อสามัญว่าอะไร

- คอลชิซิน (colchicine) เป็นยากลุ่มรักษาโรคเก๊าต์

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- เพื่อรักษาอาการปวดเฉียบพลันจากโรคเก๊าต์
- เพื่อป้องกันอาการปวดจากโรคเก๊าต์

1.3 การปรับขนาดยาและหยุดยานี้ ไม่ควรปรับขนาดยาหรือหยุดยานี้เองควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- ห้ามใช้เมื่อเคยแพ้ยานี้
- ห้ามใช้ร่วมกับยาบางชนิด หากท่านมีโรคตับหรือโรคไตร่วมด้วยเช่น ยาดีโดโคนาโซล ยาอิทราโคนาโซลยาไรโทนาเวียร์ ยาคลาริโทโรไมซิน ยาไซโคลสปอริน ยาวีราพามิลเป็นต้น หากท่านไม่แน่ใจว่าใช้ยาเหล่านี้อยู่ โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- หากท่านมีอาการต่อไปนี้ ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยานี้เพราะอาจทำให้เกิดอันตรายจากยานี้มากขึ้น
 - โรคทางเดินอาหาร
 - โรคไต
 - โรคตับ
 - โรคทางโลหิต
 - โรคหัวใจ

- ไม่ควรใช้ยานี้ร่วมกับยาต่อไปนี้เพราะอาจมีผลต่อการรักษาหรือเกิดอันตรายได้•ยาอีริโทโรไมซิน•ยาคลาริโทโรไมซิน •ยาเทลิโทโรไมซิน •ยาด้านเชื้อรา (เช่น คีโทโคนาโซล อิทราโคนาโซล)•ยาด้านเชื้อไวรัสเฮอร์ปีส์(เช่น ริโทนาเวียร์)•ยาแก้ชักเสบิโทไมไซเตอรอยด์ •ยาด้านโรคจิต (เช่น ฮาโลเพริดอล โคลซาปีน) •ยาไซโคลสปอริน •ยาวีราพามิล•
- หญิงมีครรภ์ควรระมัดระวังการใช้ยานี้

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรอย่างเคร่งครัดเพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- ไม่ต้องกินยามื้อนั้นให้รอกินยาของมื้อต่อไปและห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิดหากมีอาการผิดปกติที่รุนแรงให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ใช้ยานี้ตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด หากอาการแย่ลงหรือมีผลข้างเคียงจากยาที่ทนไม่ได้ให้แจ้งแพทย์
- ห้ามลดหรือหยุดกินยาเอง เพราะอาจทำให้อาการของโรคกำเริบ
- หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ
- แสบร้อนกระเพาะอาหารหรือคอหอย
- อุจจาระสีดำหรือมีเลือด
- มีอาการบัสสาวะขัด
- ชัก
- มีไข้
- กล้ามเนื้ออ่อนแรง

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยาแต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสียปวดท้อง

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- แกะยาออกจากแผงเมื่อจะกินในแต่ละครั้งเท่านั้น
- เก็บยาในที่แห้งอย่าให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียสไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้นเช่นในรถห้องนำห้องครัว
- เก็บให้พ้นสายตาและมือเด็ก

ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า/ผู้แทนจำหน่าย.....

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ

16 พฤษภาคม 2559

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ

หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร