

ไกลเบนคลาไมด์ ขนาด 2.5 และ 5 มิลลิกรัม ชนิดเม็ด

1. ยานี้คือยาอะไร

1.1 ยานี้มีชื่อสามัญว่าอะไร

- ไกลเบนคลาไมด์ (glibenclamide) เป็นยาด้านเบาหวานในกลุ่มซัลโฟนิลยูเรีย

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้ร่วมกับการควบคุมอาหารและการออกกำลังกาย เพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดสำหรับผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่สอง หรือเบาหวานชนิดที่ไม่พึ่งอินซูลิน
- อาจใช้ยานี้เพียงตัวเดียวหรือใช้ยานี้ร่วมกับอินซูลินหรือยาด้านเบาหวานกลุ่มอื่น

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- ห้ามใช้ยานี้ถ้าท่านเคยแพ้ยานี้ หรือแพ้ยาในกลุ่มซัลโฟนิลยูเรีย หรือแพ้ยาในกลุ่มซัลโฟนาไมด์
- ห้ามใช้ยานี้ถ้าท่านเป็นโรคเบาหวานชนิดที่หนึ่งหรือเบาหวานชนิดที่ต้องฉีดอินซูลิน โรคเบาหวานที่ควบคุมไม่ได้ หรือ มีน้ำตาลในเลือดสูงมาก หรือมีอาการรุนแรง เช่น คลื่นไส้ อาเจียนมาก ปวดท้อง ปัสสาวะมาก อาเจียนมาก คอแห้งกระหายน้ำมาก หายใจหอบ ลมหายใจมีกลิ่นหวาน
- ห้ามใช้ยานี้ถ้าท่านป่วยเป็นโรคไต หรือโรคต่อมหมวกไต หรือโรคตับ ชันรุนแรง
- ห้ามใช้ยานี้ถ้าท่านติดเชื้อมีเชื้อรุนแรง เจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บรุนแรงมีไข้สูง หรือจะเข้ารับการผ่าตัดใหญ่

- ห้ามใช้ยานี้ถ้าท่านป่วยเป็นโรคพอร์ไฟเรีย
- ห้ามใช้ยานี้ถ้าท่านตั้งครรภ์ วางแผนจะตั้งครรภ์ หรืออยู่ในระยะให้นมบุตร
- ห้ามใช้ยานี้ถ้าท่านอายุต่ำกว่า 18 ปี
- ห้ามใช้ยานี้ถ้าท่านอายุมากกว่า 70 ปีขึ้นไป
- ห้ามใช้ยานี้ ขณะกำลังใช้ยาโบเซนแทน (Bosentan) อยู่ในปัจจุบัน

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ต้องใช้ยานี้ตามแพทย์สั่งเท่านั้น หากมีอาการวิงเวียนจะเป็นลมให้รีบปรึกษาแพทย์
- การใช้ยานี้ อาจทำให้เกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำได้จากการกินยาเกินขนาด หรือผู้ป่วยกินอาหารได้น้อย อดอาหาร ออกกำลังกายอย่างหนัก ต้มเหล้า หรือใช้ยานี้ร่วมกับยาบางชนิดหรือยาด้านเบาหวานกลุ่มอื่น
- ยานี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของกระบวนการควบคุมโรคเบาหวาน ท่านควรควบคุมอาหาร กินอาหารในปริมาณที่เหมาะสม และออกกำลังกายพอประมาณเป็นประจำร่วมกับการกินยานี้
- ระวังการใช้ยานี้ในผู้ป่วยที่มีอาการท้องร่วงหรือคลื่นไส้ อาเจียนรุนแรงหรือเรื้อรัง
- หลีกเลี่ยงในผู้ป่วยที่มีภาวะพร่องเอนไซม์จีซิกส์พีดี

ข้อมูลยานี้เป็นข้อมูลโดยย่อ

หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

- ท่านต้องแจ้งแพทย์และเภสัชกรเสมอว่ากำลังใช้ยา หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือสมุนไพรชนิดใดอยู่บ้าง ในขณะที่กำลังใช้ยานี้ เนื่องจากอาจเกิดปฏิกิริยาต่อกัน ซึ่งมีผลต่อการรักษาหรือเกิดอันตรายได้ ยกตัวอย่างดังนี้

ผลิตภัณฑ์ยา เช่น

- ยาด้านเบาหวานตัวอื่นนอกเหนือจากยานี้
- ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย และยาฆ่าเชื้อรา เช่น ซิโพรฟลอกซาซิน คลาริโทรมิซิน ไมโครนาโซล ยากลุ่มซัลโฟนาไมด์
- ยารักษาแผลในกระเพาะ เช่น ไซเมทาดีน รานิทิดีน
- ยาด้านการแข็งตัวของเลือด เช่น วอร์ฟาริน
- ยาลดความดันเลือดสูง เช่น อีแนลาพริล โพรพราโนลอล อะทีโนลอล เมโทโพรลอล
- ยาลดไขมันในเลือด เช่น โคลไฟเบรท เจมไฟโบรซิล
- ยาด้านการอักเสบชนิดที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ เช่น ไอบิวโพรเฟน
- ยารักษาโรคไทรอยด์ เช่น เลโวไทรอกซิน
- ยาขับปัสสาวะ เช่น ฟุโรซีไมด์ ไฮโดรคลอโรไทอาไซด์
- ยากุมกำเนด

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เช่น โสม ซายิมินมา (หรือฝักเชียงดา) มะระ ลูกชืด แบ่งนุก

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ขนาดยาที่ผู้ป่วยควรได้รับในแต่ละครั้ง แพทย์จะวินิจฉัยจากระดับน้ำตาลในเลือด และสภาวะของผู้ป่วยในครั้งล่าสุด **จึงควรใช้ยาตามที่แพทย์หรือเภสัชกรระบุไว้อย่างเคร่งครัด**
- กินยานี้วันละ 1 ครั้ง พร้อมอาหารหรือหลังอาหารทันที ในมือแรกของวัน

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- ให้กินยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าใกล้เวลาของมื้อถัดไปให้รอกินยาของมื้อต่อไป และห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำควรทำอย่างไร

- ถ้ามีอาการของน้ำตาลในเลือดต่ำ เช่น ง่วงซึมหรือ มึนงง ใจสั่น เหงื่อออก หัวใจให้รีบกินลูกอม หรือน้ำหวาน หรือเครื่องดื่มที่มีน้ำตาล ถ้าอาการยังไม่ดีขึ้นให้รีบไปโรงพยาบาล
- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้หยุดใช้ยาและรีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

ข้อมูลยานี้เป็นข้อมูลโดยย่อ

หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างการใช้ยา

- กินยานี้อย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร **ไม่ควรปรับขนาดยาเอง**
- ท่านควรไปพบแพทย์ตามนัดทุกครั้ง เพื่อ
 - ประเมินผลการรักษาด้วยการตรวจวัดน้ำตาลในเลือด
 - ประเมินภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน โดยตรวจการทำงานของไต หรือตา
 - ตรวจสอบอาการข้างเคียงที่อาจเกิดจากการใช้ยา
- ควบคุมอาหาร และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
- งดสูบบุหรี่และหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์
- กรณีที่ผู้ป่วยมีเครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดแบบพกพา ควรหมั่นวัดระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตนเองเป็นประจำ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่างๆ ที่อาจมีผลต่อระดับน้ำตาลในเลือด เช่น กรณีน้ำตาลในเลือดสูง ควรลดการบริโภคอาหารที่มีน้ำตาลและแป้งสูง พร้อมทั้งออกกำลังกายมากขึ้น
- แจ้งแพทย์และ/หรือเภสัชกรว่ากำลังใช้ยานี้ หากต้องผ่าตัด หรือเข้ารับการรักษาตัว เช่น ได้รับความเจ็บ ติดเชื้อรุนแรง มีไข้สูง ท้องเสีย หรืออาเจียนอย่างมาก

5. อันตรายจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ ผื่นแพ้ คัน
- มีอาการตัวเหลือง ตาเหลือง

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้าทนไม่ได้ ให้ไปพบแพทย์

- ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ สังเกตจากอาการต่อไปนี้ ง่วงซึม มึนงง ใจสั่น เหงื่อออก หัวใจ ถ้าเกิดอาการภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ ให้รีบดื่มน้ำหวาน หรืออมลูกอม ถ้าอาการยังไม่ดีขึ้น ให้พบแพทย์ทันที

อาการอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นหลังจากใช้ยานี้ เช่น คลื่นไส้ อาเจียน อึดอัด จุกแน่น มีอาการแสบร้อนกลางอก เบื่ออาหาร อาหารไม่ย่อย ปวดท้อง ท้องเสีย

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- แกะยาออกจากแผงเมื่อจะกินในแต่ละครั้งเท่านั้น
- เก็บยาในที่แห้ง ปล่อยให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส
- ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บให้พ้นมือเด็ก

ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า/ผู้แทนจำหน่าย.....
เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2559