

ในเฟดิพิน 5 มิลลิกรัม และ 10 มิลลิกรัม ชนิดเม็ดรูปแบนปลดปล่อยยาทันที

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อสามัญว่าอะไร

- ในเฟดิพิน (nifedipine) เป็นยาในกลุ่มต้านแคลเซียม

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้ป้องกันและรักษาอาการปวดแค้นหัวใจ และกลุ่มอาการเรย์นอร์ด

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ยาในเฟดิพิน ส่วนประกอบอื่นๆในยานี้ และยากลุ่มที่มีโครงสร้างคล้ายคลึงกัน เช่น แอมโลดิพิน เฟโลดิพิน แมนดิพิน
- ห้ามใช้ในผู้ที่มีภาวะช็อกที่มีสาเหตุจากหัวใจและหลอดเลือด
- ห้ามใช้ยานี้ร่วมกับยาไรแฟมพิซิน

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยานี้ถ้าท่านกำลังตั้งครรภ์ ให้นมบุตร มีความผิดปกติของหัวใจ ผู้ป่วยที่ไม่สามารถควบคุมอาการปวดแค้นหัวใจ และโรคความดันเลือดสูงได้ เป็นโรคตับ โรคเบาหวาน โรคไตเสื่อม และผู้ป่วยที่ทำไตอะลี่ยซิส
- อย่าใช้ยานี้ในขนาดสูงกว่าที่แพทย์หรือเภสัชกรแนะนำ และอย่าหยุดใช้ยานี้เองโดยไม่ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น
- กินยานี้ก่อนอาหาร
- ไม่ใช้ยานี้เกินกว่าขนาดที่แพทย์สั่ง

3.2 หากลืมกินยา ควรทำอย่างไร

- กินยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้านึกได้ใกล้กับเวลาของมื้อถัดไป ให้เว้นยาในมื้อนั้น แล้วข้ามไปกินยาของมื้อถัดไป ในขนาดปกติที่แพทย์สั่ง โดยห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด โดยอาจมีอาการความดันเลือดตก หัวใจเต้นไม่สม่ำเสมอ ช็อกเหตุจากหัวใจร่วมกับปวดบวมหน้า ไม่รู้สึกตัว หหมดสติ โคมา ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างการใช้ยา

- ระวังเกี่ยวกับการขับชียานพาหนะ และทำงานกับเครื่องจักร เนื่องจากยานี้อาจทำให้เกิดอาการเวียนศีรษะ ง่วงซึม
- ปรึกษาแพทย์และเภสัชกรเกี่ยวกับยาที่ใช้ อยู่ อาหารเสริม สมุนไพร รวมไปถึงแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ หรือยาอื่นๆที่มีความจำเป็นต้องใช้ เนื่องจากอาจมีผลต่อยาที่ใช้
- หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เพื่อลดการเกิดอาการเวียน หัวใจเต้นเร็ว
- ถ้าท่านต้องผ่าตัด แจ้งแพทย์หรือทันตแพทย์ให้ทราบว่าคุณกำลังใช้ยานี้อยู่

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- อาการแพ้ยา เช่น บวมที่ใบหน้า เปลือกตาริมฝีปาก ลมพิษ หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก คั้น ผื่นแดง ผิวหนังหลุดลอก ผม่ว่ง ตุ่มพองที่ผิวหนังร่วมกับเจ็บในปากและตา

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ นอนไม่หลับ รู้สึกหุน ความดันเลือดตกเมื่อยืนขึ้น ใจสั่น
- คลื่นไส้ ปวดท้อง อ่อนแรง รู้สึกไม่สบายท้องผูก ท้องร่วง การย่อยอาหารไม่ดี
- บวมบริเวณแขนขา

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อบอุ่นแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิห้อง (ไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส) ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาทุกชนิดให้พ้นมือเด็ก

ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า/ผู้แทนจำหน่าย.....
เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 25 พฤศจิกายน 59

ข้อมูลยานี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร