

แคลเซียมคาร์บอเนต 1500 มิลลิกรัม ชนิดเม็ดเดี่ยว

1. ยานี้คือยาอะไร

- ยานี้เป็นยาในกลุ่มวิตามินและแร่ธาตุ มีชื่อสามัญว่า แคลเซียมคาร์บอเนต (calcium carbonate)
- ยานี้ใช้เพื่อรักษาภาวะขาดแคลเซียม เป็นยาเสริมในการป้องกันและรักษาโรคกระดูกพรุน เป็นอาหารเสริมเมื่อได้รับแคลเซียมในปริมาณที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะในเด็ก ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ และให้นมบุตร และใช้เป็นตัวจับฟอสเฟตในผู้ป่วยที่มีภาวะไตบกพร่อง

2. ข้อควรรู้ก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้แคลเซียมหรือ ส่วนประกอบอื่นๆ ในตัวยา
- ห้ามใช้ในผู้ที่มีภาวะแคลเซียมในเลือดสูง เนื่องจากภาวะต่อมพาราไทรอยด์ทำงานเกิน ภาวะวิตามินดีเกิน มะเร็งไขกระดูก หรือโรคชาร์คอร์ด
- ห้ามใช้ในผู้ที่มีภาวะไตบกพร่องรุนแรงที่ไม่ได้ทำการล้างไต
- ห้ามใช้ในผู้ที่มีภาวะแคลเซียมในปัสสาวะสูง

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยานี้ หากหันมีภาวะต่อไปนี้ เพราะอาจทำให้เกิดอันตรายจากยานี้มากขึ้น
 - หญิงตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร
 - ภาวะไตบกพร่องและแคลเซียมในปัสสาวะสูงชนิดไม่รุนแรง

- ไม่ควรใช้ยานี้ร่วมกับยาหรือเครื่องดื่มต่อไปนี้ เพราะอาจมีผลต่อการรักษาหรือเกิดอันตรายได้ เช่น
 - ยาขับปัสสาวะ ยากลุ่มบิสฟอสโฟเนต ยาโซเดียมฟลูออโรเดท ยาฆ่าเชื้อ (เช่น เดตราไซคลิน คิตโคนาโซล ไอಥราโคนาโซล คิรโนโลน) วิตามินดี ยาคุมกำเนิดที่มีเอสโตรเจน หรือ เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรอย่างเคร่งครัด เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- เคี้ยวเม็ดยาให้ละเอียดก่อนกลืน ก่อนอาหารพร้อมอาหาร หรือหลังอาหารหันที่

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- ไม่ต้องกินยาเมื่อนั้นให้รอกินยาของมื้อต่อไปโดยไม่ต้องเพิ่มน้ำยาเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลหันที่

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ใช้ยานี้ตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด หากอาการแย่ลงหรือมีผลข้างเคียงจากยาที่หันไม่ได้ให้แจ้งแพทย์
- ห้ามลดหรือหยุดกินยาเอง เพราะอาจทำให้อาการของโรคกำเริบหรือเกิดอาการขาดยาได้
- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา
- หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์หันที่

- หากมีอาการแพ้ยา เช่น บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ แน่นหน้าอัก หายใจลำบาก ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวนังหลุดลอก มีจ้ำเลือดตามผิวนัง ให้หยุดกินยา และรีบไปพบแพทย์

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ต้องมี

- อาการรุนแรงควรไปพบแพทย์หันที่ เช่น
- คลื่นไส้ หัวอืด หัวผูก หัวเสีย ปวดหัว

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บยาไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- นำยาออกจากภาชนะบรรจุเมื่อจะกินในแต่ละครั้งเท่านั้น
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรงโดยทั่วไป ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ชื้น
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า/ผู้แทนจำหน่าย

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ

10 กันยายน 2559

ข้อมูลยานี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร