

ເຝ່ອຮ້າສຸມາເຣຕ 200 ມີລົກຮັມ (ມີທາດໜ່າຍ 65 ມີລົກຮັມ) ໜັດເມັດ

1. ยานี้คือยาอะไร

- ยานี้เป็นยาในกลุ่มแร่ธาต มีชื่อสามัญว่า เพฟอร์รัสฟูมาเรต (ferrous fumarate)
 - ยานี้ใช้เพื่อป้องกันและรักษาภาวะเลือดจางจากการขาดธาตเหล็ก

2. ข้อควรรู้ก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- ห้ามใช้ยานี้ในผู้ที่แพ้ยาเฟอร์รัสฟูมาเรต หรือ เกลือของเหล็กชนิดอื่น หรือ ธาตุเหล็ก หรือ ส่วนประกอบอื่นในตำรับยา
 - ห้ามใช้ยานี้ในผู้ป่วยที่มีเหล็กสะสมใน ร่างกายมากอยู่แล้ว เช่น โรคผิวหนังเปลี่ยนสี จากระยะเหล็กคั่งในเนื้อเยื่อ ภาวะเหล็กคั่ง ในเลือด ผู้ที่รับเลือดบ่อยๆ และภาวะ ปัสสาวะมีเขมโนโกรลบินกำเริบยามคลางคืน เพาะเจ Ortiz อาจทำให้เกิดพิษจากเหล็กได้
 - ห้ามใช้ยานี้ในผู้ป่วยที่กำลังมีแพ้ในทางเดิน อาหาร ลำไส้เล็กอักเสบเฉพาะที่ และ ลำไส้ ใหญ่อักเสบเป็นแพ้เปื้อย
 - ห้ามใช้ยานี้ในผู้ป่วยที่มีภาวะเลือดจางจาก สาเหตุอื่นที่ไม่ใช่เกิดจากการขาดธาตุเหล็ก

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยาเนื่องจากท่านมีภาวะต่อไปนี้ เพราะอาจทำให้เกิดอันตรายจากยาน้ำมากขึ้น
 - เป็นโรคตับ หรือโรคแพลงในทางเดินอาหาร ที่สามารถควบคุมอาการได้
 - ผู้ป่วยบางกลุ่มอาจได้รับอันตรายจากยาน้ำมากขึ้น ได้แก่
 - หญิงมีครรภ์หรือกำลังจะตั้งครรภ์ และหญิงให้นมบุตร
 - ไม่ควรใช้ยาเนื่องร่วมกับ ยา อาหาร หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบางชนิด เพราะอาจมีผลต่อการรักษาหรือเกิดอันตรายได้ เช่น ยาลดกรด ยากลุ่มบิสฟอสโฟเนต ยาฆ่าเชื้อ กลุ่มคิวโนโลนและเตตราไซคลีน ชา หรือ นม เพราะอาจลดการดูดซึมยาได้

3. ວິທີໃຊ້ຢາ

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น
 - ขนาดยาที่ใช้เสริมเพื่อป้องกันหรือรักษาภาวะเลือดจางจากการขาดธาตุเหล็กแตกต่างกันในแต่ละช่วงอายุ และความรุนแรงของผู้ป่วยแต่ละราย
 - ควรกินยานี้ขณะท้องว่าง ก่อนอาหารอย่างน้อย 1 ชั่วโมง หรือหลังอาหารอย่างน้อย 2 ชั่วโมง แต่หากกินวันวึ้นแล้วมีอาการปวดท้องให้เปลี่ยนเป็นกินยาพร้อมอาหารหรือหลังอาหารทันที
 - ไม่ใช้ยานี้เกินกว่าขนาดยาที่แพทย์สั่ง
 - ไม่ควรกินยานี้อย่างต่อเนื่องด้วยตนเอง โดยไม่ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร เพราะอาจเกิดอันตรายจากยาได้

3.2 หากลืมกินยา ควรทำอย่างไร

- หากกินเพื่อป้องกันภาวะเลือดจางควรขยำยา มือที่ลีม และกินมื้อต่อไปตามปกติ แต่หาก กินเพื่อรักษาภาวะเลือดจาง ให้กินยาทันทีที่ นึกได้ แต่ถ้าใกล้เวลาขึ้นยา มื้อต่อไปให้ขยำ ยา มื้อที่ลีมกินและกินต่อในมื้อปกติ โดยไม่ ต้องเพิ่มจำนวนเม็ดยา

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง เช่น คลื่นไส้ อาเจียน อาเจียนเป็นเลือด ปวดท้อง ท้องร่วง ถ่ายอุจจาระเป็นเลือด หรือ ข้าก ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างการใช้ยา

- กินยาเนื้อเยื่าต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้อง หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- อาการที่หมายถึงการแพ้ยา คือหายใจลำบาก ผืนขึ้น หายใจมีเสียงหวิด แน่นหน้าอก คัน บวมบริเวณใบหน้า ริมฝีปาก ลิ้น หรือในลำคอ ผิวนัง ริมฝีปาก เล็บและฝ่ามือเป็นสีเขียวหรือฟ้า
 - อาการที่แสดงถึงพิษของยา คือ อาเจียน รุนแรง มีไข้ เชื่องซึม ผิวนังชัดหรือเย็นชื้น ชา หัวใจเต้นอ่อนลง เรื้อรัง หรือไม่สม่ำเสมอ
 - ผู้หญิงมีประจำเดือนผิดปกติ คือมีเลือดออกมาก เลือดออกกะปริดกะปรอย หรือมีเลือดออกระหว่างรอบเดือน

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยดยา แต่ก็มี

อาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- ห้องผูก ห้องร่วง ระคายเคืองทางเดินอาหาร
คลื่นไส้ หรือ ปวดบริเวณลิ้นปี่
- อุจจาระมีสีดำหรือคล้ำขึ้น

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บยานี้ในช่องทึบหรือขวดสีขาวที่ปิดสนิท
และไม่ให้ยาโดนแสงโดยตรง
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง
โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิห้อง (ไม่เกิน 30
องศาเซลเซียส) ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น
 เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า/ผู้แทนจำหน่าย

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ

10 กันยายน 2559

ข้อมูล yan เป็นข้อมูลโดยย่อ

หากมีข้อสงสัย ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร