



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักยา กคุมกำหนดมาตรฐาน โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๗๓๔๔
ที่ สธ ๑๐๐๙.๓.๑/๒ ๘๗ ๘๔ วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งสำเนาประกาศกระทรวงสาธารณสุข

เรียน นักวิชาการอาหารและยาทรงคุณวุฒิ / ผู้เชี่ยวชาญ / ผู้อำนวยการสำนักยา / ผู้อำนวยการกอง / หัวหน้ากลุ่มกำหนดมาตรฐาน / หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบ / หัวหน้ากลุ่มกำกับดูแลก่อนออกสู่ตลาด / หัวหน้ากลุ่มกำกับดูแลหลังออกสู่ตลาด / หัวหน้ากลุ่มยาแผนไทยและยาจากสมุนไพร / หัวหน้ากลุ่มนโยบายแห่งชาติด้านยา

สำนักยาขอส่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข จำนวน ๖ ฉบับ ซึ่งได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ดังนี้

๑. สำเนาประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาอันตราย ฉบับที่ ๒๙ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐

๒. สำเนาประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาที่ต้องแจ้งคำเตือนการใช้ยาไว้ในยามากและที่ออกสารกำกับยาและข้อความของคำเตือน ฉบับที่ ๒๖ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐

ทั้งนี้ สำนักยาได้เผยแพร่การประกาศกระทรวงสาธารณสุข บนเว็บไซต์ของสำนักยา ซึ่งสามารถติดตามตรวจสอบได้ทาง <http://www.fda.moph.go.th/sites/drug/Pages/Main.aspx> หรือ QR code ดังนี้

QR code (ยาอันตราย ฉบับที่ ๒๙)	QR code (ยาที่ต้องแจ้งคำเตือนฯ ฉบับที่ ๒๖)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

①

- บริหารฯ () พัฒนาระบบ () กำหนดฯ
- Pre () Post () นโยบายฯ
- แผนไทยฯ () โปรดทราบ () โปรดพิจารณา
- โปรดแจ้งเวียน ()

(นายสุชาติ จ่องประเสริฐ)
เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักยา

1๕.๑๒.๖๐
(นายสุชาติ จ่องประเสริฐ)
เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักยา

② ผู้ให้ผู้รับ

นางสาวเจน่า คงกานต์
พญานันท์ คงกานต์

(นางสาวรัชดา คงกานต์)
เข้าพบที่สำนักงานธุรการ ชั้น二楼 สำนักงาน

๑๙.๖๗๙ ๗๙๖ ถนนรัชดาภิเษก
แขวงลาดยาว เขตสาทร กรุงเทพฯ
๑๘๗๗, ๖๐

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง ยาอันตราย
ฉบับที่ ๒๙

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๖ (๓) แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยคำแนะนำของคณะกรรมการยาในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในข้อ (๓) ของข้อ ๓ แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาอันตราย ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๒๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาอันตราย ฉบับที่ ๒๙ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(๓) ยาจำพวกซัลโฟนาไมด์ (Sulfonamides) ยกเว้น

ก. ที่ประกาศเป็นยาควบคุมพิเศษ”

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ (๓) ของข้อ ๓ แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาอันตราย ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๒๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาอันตราย ฉบับที่ ๑๕ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(๓) ยาจำพวกปฏิชีวนะ (Antibiotics) ยกเว้น

ก. สำหรับใช้เฉพาะที่ ทั้งนี้ไม่รวมถึงยาจำพวกเพนิซิลลิน

ข. ที่ประกาศเป็นยาควบคุมพิเศษ”

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ (๔) ของข้อ ๓ แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาอันตราย ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๒๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาอันตราย ฉบับที่ ๔ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(๔) ยาจำพวกป้องกันและรักษา malariae (Antimalarial drugs)”

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ปิยะสกล ศกลสัตยาทร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง ยาที่ต้องแจ้งคำเตือนการใช้ยาไว้ในคลากและที่เอกสารกำกับยา
และข้อความของคำเตือน
ฉบับที่ ๖๒

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๖ (๙) แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๗๒ และมาตรา ๗๘ แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคำแนะนำของคณะกรรมการยาในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบka เป็นต้นไป

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความใน (๑๖) ของข้อ ๓ แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาที่ต้องแจ้งคำเตือนการใช้ยาไว้ในคลากและที่เอกสารกำกับยาและข้อความของคำเตือน ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาที่ต้องแจ้งคำเตือนการใช้ยาไว้ในคลากและที่เอกสารกำกับยาและข้อความของคำเตือน ฉบับที่ ๔๖ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาที่ต้องแจ้งคำเตือนการใช้ยาไว้ในคลากและที่เอกสารกำกับยาและข้อความของคำเตือน ฉบับที่ ๔๗ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(๑๖) ยารักษาโรคเบาหวาน

(๑๖.๑) ยารักษาโรคเบาหวาน ยกเว้นยากลุ่ม (๑๖.๒) (๑๖.๓) (๑๖.๔) (๑๖.๕)

(๑๖.๖) (๑๖.๗)

คำเตือนที่คลากและเอกสารกำกับยา

ต้องใช้ยานี้ตามแพทย์สั่งเท่านั้น หากมีอาการวิงเวียนจะเป็นลมให้รับปรึกษาแพทย์

(๑๖.๒) ยากลุ่มเมroxโซลิดินไดโอน (Thiazolidinedione) ยกเว้นยาไฟโอลิทาโซน (Pioglitazone)

คำเตือนที่คลากและเอกสารกำกับยา

๑. ห้ามใช้ยานี้ในผู้ที่มีหัวใจล้มเหลวในระดับที่รุนแรง (NYHA ในระดับ ๓ และ ๔)

๒. ยานี้อาจทำให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลว หากใช้ยานี้แล้วมีอาการหายใจลำบาก เหนื่อยง่าย น้ำหนักเพิ่มอย่างรวดเร็ว หรือเกิดอาการบวมมากให้รับปรึกษาแพทย์โดยทันที

๓. การใช้ร่วมกับอินซูลินจะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดภาวะบวมน้ำ และหัวใจล้มเหลวมากขึ้น ต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง

(๑๖.๓) ยาไฟโอลิทาโซน (Pioglitazone)

คำเตือนที่ฉลากและเอกสารกำกับยา

๑. ห้ามใช้ยาในผู้ที่มีหัวใจล้มเหลวในระดับที่รุนแรง (NYHA ในระดับ ๓ และ ๔) ยานี้อาจทำให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลว หากใช้ยาแล้วมีอาการหายใจลำบาก เหนื่อยง่าย น้ำหนักเพิ่มอย่างรวดเร็ว หรือเกิดอาการบวมมากให้รีบปรึกษาแพทย์โดยทันที

๒. การใช้ร่วมกับ NSAIDs Coxib หรืออินซูลินจะเพิ่มความเสี่ยงการเกิดภาวะบวมน้ำ และหัวใจล้มเหลวมากขึ้นต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง

๓. ยานี้อาจเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ

๔. ไม่ควรใช้ยาในผู้ป่วยที่กำลังเป็นมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ

๕. ให้ใช้ยาด้วยความระมัดระวัง โดยคำนึงถึงประโยชน์และความเสี่ยงในผู้ป่วยที่เคยเป็นมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ หรือมีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ การใช้ยา pioglitazone มากกว่า ๑ ปี อาจจะเกี่ยวข้องกับการเกิดมะเร็งกระเพาะปัสสาวะเพิ่มขึ้น

๖. หากมีอาการ หรืออาการแสดงปัสสาวะเป็นเลือด กลั้นปัสสาวะไม่อญ ปวดเวลาปัสสาวะ ปวดหลัง หรือปวดท้อง ให้ปรึกษาแพทย์

(๑๖.๔) ยากลุ่มโซลฟอนิลูเรีย (sulfonylureas)

คำเตือนที่ฉลาก

๑. ห้ามใช้ในผู้ที่เคยแพ้ยา

๒. ห้ามใช้รักษาโรคเบาหวานชนิดที่ ๑ ผู้ป่วยภาวะ ketoacidosis ผู้ป่วยภาวะติดเชื้อรุนแรง ผู้ป่วยได้รับอุบัติเหตุรุนแรง

๓. สตรีมีครรภ์ควรหลีกเลี่ยงการใช้ยา แล้วสตรีให้นมบุตรระมัดระวังการใช้ยา

๔. ไม่ควรใช้ยาในเด็กและวัยรุ่นที่มีแอลกอฮอล์

๕. ระมัดระวังการใช้ยา เพราะอาจทำให้เกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำได้ เช่น มีอาการทิวไส้สั่น เหื่อออก

๖. หากใช้ยาแล้วมีอาการผื่นแดง ตุ่มน้ำพอง ให้รีบปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

คำเตือนที่เอกสารกำกับยา

๑ - ๕ เมื่อมองคำเตือนที่ฉลาก

๖. หากใช้ยาแล้วมีอาการผื่นแดง ตุ่มน้ำพอง มีการหลุดลอกของผิวนัง และเยื่อบุต่าง ๆ เช่น ช่องปาก ลำคอ จมูก อวัยวะสีบพันธุ์ และเยื่อบุตาอักเสบ ให้หยุดยา และปรึกษาแพทย์ เพราะอาจเป็น Stevens-Johnson syndrome

๗. ระมัดระวังการใช้ยาในผู้ป่วยที่มีภาระการทำงานของไตมากกว่า

(๑๖.๕) ยากลุ่มยับยั้งตัวลำเลียงร่วมโซเดียม-กลูโคส ๒ [Sodium-Glucose cotransporter-2 (SGLT2) inhibitors]

คำเตือนที่ฉลาก

๑. ห้ามใช้ในผู้ที่เคยแพ้ยา呢
๒. ห้ามใช้รักษาโรคเบาหวานชนิดที่ ๑ ผู้ป่วยภาวะ ketoacidosis ผู้ป่วยภาวะติดเชื้อรุนแรง ผู้ป่วยได้รับอุบัติเหตุรุนแรง
๓. สตรีมีครรภ์ควรหลีกเลี่ยงการใช้ยา呢 และสตรีให้นมบุตรระมัดระวังในการใช้ยา呢
๔. ไม่ควรใช้ยา呢ร่วมกับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
๕. หากผู้ป่วยมีอาการ คลื่นไส้ อาเจียน ทิวน้ำผิดปกติ หายใจลำบาก ให้รับปรึกษาแพทย์ หรือเภสัชกร
๖. หากมีอาการปัสสาวะแบบขัด ไข้สูง ปวดเอว คันบริเวณอวัยวะเพศให้ปรึกษาแพทย์ หรือเภสัชกร

คำเตือนที่เอกสารกำกับยา

๑. - ๔. เมื่อันคำเตือนที่ฉลาก
 ๕. หากผู้ป่วยมีอาการ คลื่นไส้ อาเจียน เปื้องอาหาร ปวดท้อง ทิวน้ำผิดปกติ อ่อนเพลีย หายใจลำบาก สับสน แม้กระทั่งตัวลงเลือดสูงมาก ให้รับปรึกษาแพทย์ หรือเภสัชกรเนื่องจาก อาจเกิดอาการ diabetic ketoacidosis
 ๖. ควรระมัดระวังการติดเชื้อแบคทีเรีย และเชื้อราที่อวัยวะเพศ และระบบทางเดินปัสสาวะในผู้ป่วยที่ใช้ยา呢
- (๑๖.๖) ยากลุ่มยับยั้งเอนไซม์ไดเพปทิดิลเพปทิเดส-๔ [dipeptidylpeptidase-4 (DPP-4) inhibitors] ยกเว้นยาแซกซ์กลิปทิน (saxagliptin)

คำเตือนที่ฉลาก

๑. ห้ามใช้ในผู้ที่เคยแพ้ยา呢
๒. ห้ามใช้รักษาโรคเบาหวานชนิดที่ ๑ ผู้ป่วยภาวะ ketoacidosis ผู้ป่วยภาวะติดเชื้อรุนแรง ผู้ป่วยได้รับอุบัติเหตุรุนแรง

๓. สตรีมีครรภ์ควรหลีกเลี่ยงการใช้ยา呢 และสตรีให้นมบุตรระมัดระวังในการใช้ยา呢

๔. ไม่ควรใช้ยา呢ร่วมกับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

คำเตือนที่เอกสารกำกับยา

๑. - ๔. เมื่อันคำเตือนที่ฉลาก

๕. yan อาจเพิ่มความเสียในการเจ็บข้ออย่างรุนแรง (severe joint pain)

(๑๖.๗) ยาแซกซ์กลิปทิน (saxagliptin)

คำเตือนที่ฉลาก

๑. ห้ามใช้ในผู้ที่เคยแพ้ยา呢

หน้า ๑๔

เล่ม ๓๓๔ ตอนพิเศษ ๒๕๒ ๑

ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

๒. ห้ามใช้รักษาโรคเบาหวานชนิดที่ ๑ ผู้ป่วยภาวะ ketoacidosis ผู้ป่วยภาวะติดเชื้อรุนแรง
ผู้ป่วยได้รับอุบัติเหตุรุนแรง

๓. สตรีมีครรภ์ควรหลีกเลี่ยงการใช้ยา呢 และสตรีให้นมบุตรระมัดระวังในการใช้ยา呢

๔. ไม่ควรใช้ยา呢ร่วมกับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

คำเตือนที่เอกสารกำกับยา

๑. - ๔. เมื่อมีอาการปวดที่ฉลาก

๕. ยา呢อาจเพิ่มความเสี่ยงในการเจ็บข้ออย่างรุนแรง (severe joint pain)

๖. ยา呢อาจเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดภาวะหัวใจล้มเหลว"

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ปัจจะสกล สกลสัตยาหาร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข