

## ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้พิจารณาพบทวนรายการยาสามัญประจำบ้านแล้วพบข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้ยารักษาแผลน้ำร้อนลวกฟีนอล ซึ่งไม่เหมาะสมในการใช้เป็นยาสามัญประจำบ้าน และพบว่ายาอมบรรเทาอาการเจ็บคอที่ประกอบด้วยตัวยาฆ่าเชื้อโรคในปากและลำคอที่มีความปลอดภัยสูงและประชาชนทั่วไปสามารถหาซื้อได้ง่าย จึงเห็นควรตัดยารักษาแผลน้ำร้อนลวกฟีนอลออกจากรายการยาสามัญประจำบ้าน และเพิ่มยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอที่ประกอบด้วย 2,4-Dichlorobenzyl Alcohol ไม่เกิน 1.2 mg. และ Amylmetacresol ไม่เกิน 0.6 mg. และอาจมี Ascorbic acid ไม่เกิน 100 mg. เป็นยาสามัญประจำบ้าน ตามมติคณะกรรมการยาในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๔๔ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๔ และครั้งที่ ๑/๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๔๕ ตามลำดับ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๖ (๕) (๗) (๘) แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ และมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๘ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๘ มาตรา ๔๗ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ให้กระทำโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคำแนะนำของคณะกรรมการยา ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความใน (๑๓.๑) ของข้อ ๒ แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๒

ข้อ ๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๑๑.๕) ของข้อ ๒ แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๒

“(๑๑.๕) ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอ

ในสูตรตำรับ ๑ เม็ด ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ

Amyl metacresol ไม่เกิน 0.6 mg.

2,4 Dichloro Benzyl Alcohol ไม่เกิน 1.2 mg.

และอาจมี Ascorbic acid ไม่เกิน 100 mg.

สรรพคุณ บรรเทาอาการเจ็บคอ

ขนาดและวิธีใช้ ผู้ใหญ่และเด็กอายุตั้งแต่ ๖ ปีขึ้นไป

อมครั้งละ ๑ เม็ดให้ละลายช้า ๆ ในปาก ทุก ๒-๓ ชั่วโมง

(โดยให้คณะกรรมการพิจารณาการขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบันที่ใช้สำหรับมนุษย์ที่เป็นยาสามัญพิจารณาตามขนาดที่ถูกต้องตามสูตรตำรับที่ผู้รับอนุญาตขอขึ้นทะเบียนตำรับยา)

คำเตือน

๑) หากใช้ติดต่อกัน ๒ วัน แล้วอาการไม่ดีขึ้นควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

๒) หญิงมีครรภ์และหญิงให้นมบุตรควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยา

๓) ไม่ควรใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า ๖ ปี

การเก็บรักษา เก็บยาในที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 °C

ขนาดบรรจุ แผงอลูมิเนียมหรือแผงพลาสติกแต่ละไม่เกิน ๘ เม็ด

ข้อ ๓ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

อนุทิน ชาญวีรกูล

รัฐมนตรีช่วยว่าการ ฯ ปฏิบัติราชการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข