

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน

(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๐

ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้พิจารณาทบทวนข้อมูลการใช้ยาพาราเซตามอลเห็นควรต้องปรับข้อมูลฉลาก เอกสารกำกับยาและคำเตือนของยาพาราเซตามอล เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการใช้ยาของผู้บริโภคนั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๖ (๕) (๗) (๘) แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ และมาตรา ๗๘ แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคำแนะนำของคณะกรรมการยา ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามร้อยหกสิบห้าวันนับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความใน (๕.๒) (๕.๓) และ (๕.๔) ของข้อ ๒ แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน ฉบับลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(๕.๒) ยาเม็ดบรรเทาปวด ลดไข้ พาราเซตามอล ๕๐๐ มก.

ในสูตรตำรับ ๑ เม็ด ประกอบด้วยตัวยาสสำคัญ คือ

Paracetamol ๕๐๐ mg

สรรพคุณ ลดไข้ บรรเทาอาการปวด

ขนาดและวิธีใช้

น้ำหนักตัว (กิโลกรัม)	ขนาดยา
น้ำหนักน้อยกว่า ๓๔	ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
น้ำหนักตั้งแต่ ๓๔ ถึง ๕๐	กินยาครั้งละ ๑ เม็ด แต่ละครั้งห่างกันอย่างน้อย ๔ ชั่วโมง เฉพาะเวลาปวดหรือมีไข้
น้ำหนักมากกว่า ๕๐ ถึง ๖๗	กินยาครั้งละ หนึ่งเม็ดครึ่ง วันละไม่เกิน ๕ ครั้ง แต่ละครั้งห่างกันอย่างน้อย ๔ ชั่วโมง เฉพาะเวลาปวดหรือมีไข้
น้ำหนักมากกว่า ๖๗	กินยาครั้งละ ๒ เม็ด วันละไม่เกิน ๔ ครั้ง แต่ละครั้งห่างกันอย่างน้อย ๔ ชั่วโมง เฉพาะเวลาปวดหรือมีไข้

คำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับยา

๑. ห้ามใช้ยาพาราเซตามอลเกินขนาดที่แนะนำในฉลากหรือเอกสารกำกับยา เพราะจะทำให้เป็นพิษต่อตับได้ และไม่ควรใช้ยานี้ติดต่อกันเกิน ๕ วัน

๒. หลีกเลี่ยงการใช้ยานี้ร่วมกับยาอื่นที่มีพาราเซตามอลเป็นส่วนประกอบ เพราะอาจทำให้ได้รับยาเกินขนาด

๓. ปรีกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยานี้ หากดื่มสุราเป็นประจำ เป็นโรคตับหรือโรคไต

๔. หากกินยาแล้วเกิดอาการ เช่น บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ หน้ามีด ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก ให้หยุดยาและรีบปรึกษาแพทย์ทันที

ขนาดบรรจุ แพ่งพลาสติกหรืออะลูมิเนียม แพ่งละ ๔ และ ๑๐ เม็ด

การเก็บรักษา, การแสดงข้อความบนฉลากและเอกสารกำกับยา ให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

(๕.๓) ยาเม็ดบรรเทาปวด ลดไข้ พาราเซตามอล ๓๒๕ มก.

ในสูตรตำรับ ๑ เม็ด ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ

Paracetamol ๓๒๕ mg

สรรพคุณ ลดไข้ บรรเทาอาการปวด

ขนาดและวิธีใช้

น้ำหนักตัว (กิโลกรัม)	ขนาดยา
น้ำหนักตั้งแต่ ๒๒ ถึง ๓๓	กินยาครั้งละ ๑ เม็ด แต่ละครั้งห่างกันอย่างน้อย ๔ ชั่วโมง เฉพาะเวลาปวดหรือมีไข้
น้ำหนักมากกว่า ๓๓ ถึง ๔๔	กินยาครั้งละ หนึ่งเม็ดครึ่ง แต่ละครั้งห่างกันอย่างน้อย ๔ ชั่วโมง เฉพาะเวลาปวดหรือมีไข้
น้ำหนักมากกว่า ๔๔	กินยาครั้งละ ๒ เม็ด แต่ละครั้งห่างกันอย่างน้อย ๔ ชั่วโมง เฉพาะเวลาปวดหรือมีไข้

คำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับยา

๑. ห้ามใช้ยาพาราเซตามอลเกินขนาดที่แนะนำในฉลากหรือเอกสารกำกับยา เพราะจะทำให้เป็นพิษต่อตับได้ และไม่ควรใช้ยานี้ติดต่อกันเกิน ๕ วัน

๒. หลีกเลี่ยงการใช้ยานี้ร่วมกับยาอื่นที่มีพาราเซตามอลเป็นส่วนประกอบ เพราะอาจทำให้ได้รับยาเกินขนาด

๓. ปรีกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยานี้ หากดื่มสุราเป็นประจำ เป็นโรคตับหรือโรคไต

๔. หากกินยาแล้วเกิดอาการ เช่น บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ หน้ามีด
ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวนั่งหลุดลอก ให้หยุดยาและรีบปรีกษาแพทย์ทันที

ขนาดบรรจุ แผงพลาสติกหรืออะลูมิเนียม แผงละ ๔ และ ๑๐ เม็ด

การเก็บรักษา, การแสดงข้อความบนฉลากและเอกสารกำกับยา ให้เป็นไปตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้

(๕.๔) ยาน้ำบรรเทาปวด ลดไข้ พาราเซตามอล

ในสูตรตำรับ ๕ มิลลิลิตร ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ

Paracetamol ๑๒๐ mg

โดยในสูตรตำรับไม่อนุญาตให้ใช้ Alcohol เป็นส่วนผสม

สรรพคุณ ลดไข้ บรรเทาอาการปวด

ขนาดและวิธีใช้

อายุ	ขนาดยา
น้อยกว่า ๒ เดือน	ให้ปรีกษาแพทย์
๒ ถึง ๓ เดือน ที่มีน้ำหนักตัว ๔ ถึง ๖ กิโลกรัม	กินครั้งละ ครั้งซ็อนซา (หรือ ๒.๕ มิลลิลิตร) วันละ ๑ ครั้ง เฉพาะเวลาปวดหรือมีไข้ หากจำเป็น กินได้อีกครั้ง ห่างจากครั้งแรกอย่างน้อย ๔ ชั่วโมง ถ้าไม่ดีขึ้น ให้ปรีกษาแพทย์หรือเภสัชกร
มากกว่า ๓ เดือน	กินยาเฉพาะเวลาปวดหรือมีไข้ วันละไม่เกิน ๕ ครั้ง แต่ละครั้งห่างกันอย่างน้อย ๔ ชั่วโมง ตามขนาดยาในตาราง

น้ำหนักตัว (กิโลกรัม)	ซ็อนตวงยา	กระบอกฉีดยา*
ตั้งแต่ ๔ ถึง ๖	ครั้งซ็อน	๒.๕ มิลลิลิตร
มากกว่า ๖ ถึง ๘	สามส่วนสี่ซ็อน	๓.๗๕ มิลลิลิตร
มากกว่า ๘ ถึง ๑๒	หนึ่งซ็อน	๕ มิลลิลิตร
มากกว่า ๑๒ ถึง ๑๖	หนึ่งซ็อนครึ่ง	๗.๕ มิลลิลิตร
มากกว่า ๑๖ ถึง ๒๔	สองซ็อน	๑๐ มิลลิลิตร

* หรือถ้วยตวงยา

คำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับยา

๑. ห้ามใช้ยาพาราเซตามอลเกินขนาดที่แนะนำในฉลากหรือเอกสารกำกับยา เพราะจะทำให้เป็นพิษต่อตับได้ และไม่ควรใช้ยานี้ติดต่อกันเกิน ๕ วัน

๒. หลีกเลี่ยงการใช้ยานี้ร่วมกับยาอื่นที่มีพาราเซตามอลเป็นส่วนประกอบเพราะอาจทำให้ได้รับยาเกินขนาด

๓. ปรีกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยานี้ หากดื่มสุราเป็นประจำ เป็นโรคตับหรือโรคไต

๔. หากกินยาแล้วเกิดอาการ เช่น บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ หน้ามีด ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวนองหลุดลอก ให้หยุดยาและรีบปรึกษาแพทย์ทันที

ขนาดบรรจุ ขวดสีชา ๓๐ มิลลิลิตร ในกล่องกระดาษพร้อมหลอดหยด

(๑.๒ มิลลิลิตร) และขวดสีชา ๖๐ มิลลิลิตร ในกล่องกระดาษ
พร้อมช้อนชา

การเก็บรักษา, การแสดงข้อความบนฉลากและเอกสารกำกับยา ให้เป็นไปตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้”

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

ปิยะสกล สกลสัตยาธร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

เอกสารแนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๐

๑. การแสดงข้อความบนฉลากยาพาราเซตามอลชนิดรับประทาน

๑.๑ ให้มีข้อความ “ยานี้มีพาราเซตามอล” อยู่ใต้ชื่อการค้า ให้เห็นเด่นชัด โดยมีขนาดตัวอักษรไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๔ ของข้อความที่มีขนาดตัวอักษรใหญ่ที่สุดในฉลาก และสีอักษรตัดกับสีพื้น

๑.๒ ให้แสดงความแรงของพาราเซตามอลเป็นภาษาไทย (เช่น ๕๐๐ มิลลิกรัม) ให้เห็นเด่นชัด และปรากฏใกล้เคียงกับข้อความ “ยานี้มีพาราเซตามอล”

๑.๓ การแสดงตัวเลขบนฉลาก อาจใช้เลขไทย หรือเลขอารบิก ก็ได้

๑.๔ สำหรับยาเม็ดบรรจุแผง ขนาด ๓๒๕ และ ๕๐๐ มิลลิกรัม ให้แสดงคำเตือน ขนาดและวิธีใช้ยา ตามแนวทางการแสดงข้อมูลยาในฉลากที่มีพื้นที่จำกัดดังรูปที่ ๑ หรือ ๒ แล้วแต่กรณี

[ชื่อการค้า] ยานี้มีพาราเซตามอล ๓๒๕ มิลลิกรัม	
น้ำหนักตัว (กิโลกรัม)	ขนาดและวิธีใช้ยา
ตั้งแต่ ๒๒ ถึง ๓๓	ครั้งละ ๑ เม็ด
มากกว่า ๓๓ ถึง ๔๔	ครั้งละ หนึ่งเม็ดครึ่ง
มากกว่า ๔๔	ครั้งละ ๒ เม็ด

กินยาห่างกันอย่างน้อย ๔ ชั่วโมง
เฉพาะเวลาปวดหรือมีไข้

คำเตือน
“ระบุคำเตือนตามประกาศ”

รูปที่ ๑

[ชื่อการค้า] ยานี้มีพาราเซตามอล ๕๐๐ มิลลิกรัม	
น้ำหนักตัว (กิโลกรัม)	ขนาดและวิธีใช้ยา
ตั้งแต่ ๓๔ ถึง ๕๐	ครั้งละ ๑ เม็ด
มากกว่า ๕๐ ถึง ๖๗	ครั้งละ หนึ่งเม็ดครึ่ง วันละไม่เกิน ๕ ครั้ง
มากกว่า ๖๗	ครั้งละ ๒ เม็ด วันละไม่เกิน ๔ ครั้ง

กินยาห่างกันอย่างน้อย ๔ ชั่วโมง
เฉพาะเวลาปวดหรือมีไข้

คำเตือน
“ระบุคำเตือนตามประกาศ”

รูปที่ ๒

๒. การแสดงเอกสารกำกับยาพาราเซตามอลสำหรับประชาชน

**พาราเซตามอล ขนาด 500 มิลลิกรัม
ชนิดเม็ด
[ชื่อการค้า]**

คำเตือน
"ระบุคำเตือนตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง ยาที่ต้องแจ้งคำเตือนการใช้ยา
ไว้ในฉลากและที่เอกสารกำกับยา
และข้อความของคำเตือน"

1. ยานี้คือยาอะไร

- ยานี้มีชื่อสามัญว่าพาราเซตามอล (paracetamol) เป็นยาในกลุ่มลดไข้ บรรเทาปวด
- ยานี้ใช้เพื่อลดไข้ บรรเทาอาการปวดเล็กน้อยถึงปานกลาง เช่น ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยจากไข้หวัด ปวดฟัน ปวดประจำเดือน ปวดกล้ามเนื้อ ปวดหลัง ปวดจากข้อเสื่อม

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไหร่

- ห้ามใช้ในผู้ที่เคยแพ้ยาพาราเซตามอลหรือแพ้ส่วนประกอบอื่นในตำรับนี้
- ห้ามใช้พาราเซตามอล เกินขนาด ที่แนะนำ ในฉลาก และเอกสารกำกับยา เพราะอาจเกิดพิษร้ายแรงจนตับวาย และเสียชีวิตได้

หลีกเลี่ยงการใช้ยานี้ร่วมกับยาอื่นที่มีพาราเซตามอล เป็นส่วนประกอบ เพราะอาจทำให้ได้รับยาเกินขนาด

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยานี้หากมีภาวะพร่องจีซิกซ์พีดี (G6PD) หรือกำลังกินยาด้านการแข็งตัวของเลือดวอร์ฟาริน เพราะอาจเกิดอันตรายจากยานี้ได้ง่ายขึ้น

- ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยานี้ หากดื่มสุราเป็นประจำ เป็นโรคตับหรือโรคไต เพราะอาจเกิดอันตรายจากยานี้ได้ง่ายขึ้น
- ถ้ามีไข้สูง (อุณหภูมิสูงกว่า 39.5 องศาเซลเซียส) ให้รีบไปพบแพทย์

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

น้ำหนักตัว (กิโลกรัม)	ขนาดยา
น้อยกว่า 34	ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
ตั้งแต่ 34 ถึง 50	กินยาครั้งละ 1 เม็ด แต่ละครั้งห่างกันอย่างน้อย 4 ชั่วโมง เฉพาะเวลาปวดหรือมีไข้
มากกว่า 50 ถึง 67	กินยาครั้งละ หนึ่งเม็ดครึ่ง วันละไม่เกิน 5 ครั้ง แต่ละครั้งห่างกันอย่างน้อย 4 ชั่วโมง เฉพาะเวลาปวดหรือมีไข้
มากกว่า 67	กินยาครั้งละ 2 เม็ด วันละไม่เกิน 4 ครั้ง แต่ละครั้งห่างกันอย่างน้อย 4 ชั่วโมง เฉพาะเวลาปวดหรือมีไข้

3.2 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร
รีบไปพบ แพทย์ทันที เพราะหากได้รับยาเกินขนาดไปมากและได้รับการรักษาไม่ทันท่วงทีจะทำให้ตับถูกทำลาย ภาไปสู่การเสียชีวิตจากตับวายได้

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างการใช้ยา

- ไม่กินยาคิดต่อกันเป็นเวลานาน โดยไม่ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
- ถ้ากินยาแล้วไข้ไม่ลดภายใน 3 วัน หรืออาการปวดของเด็กไม่บรรเทาภายใน 5 วัน หรืออาการปวดของผู้ใหญ่ไม่บรรเทาใน 10 วัน ให้ไปพบแพทย์เนื่องจากอาจเป็นอาการของโรคที่ร้ายแรงได้

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 หากกินยาแล้วเกิดอาการ เช่น

- ขวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก
- มีจ้ำตามผิวหนัง เลือดออกผิดปกติ เหนื่อยง่าย เป็นหวัดได้ง่าย

ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

5.2 หากจำเป็นต้องกินยานี้ต่อเนื่องแล้วเกิดอาการ เช่น

- อาการปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน ท้องอืด ตัวเหลือง ตาเหลือง ปัสสาวะสีเข้มขึ้น

ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บยาไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- แยกยาออกจากแผงเมื่อจะกินในแต่ละครั้งเท่านั้น
- เก็บยาในที่แห้ง อบอุ่นโดยแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิ ...<ปรับตามทะเบียนยา>... องศาเซลเซียส
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

ระบุลักษณะและสีของยา และระบุส่วนประกอบในตำรับ ...<ปรับตามทะเบียนยา>...

ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า/ผู้แทนจำหน่าย.....
เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ.....

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัย
ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**

**พาราเซตามอล ขนาด 325 มิลลิกรัม
ชนิดเม็ด
[ชื่อการค้า]**

คำเตือน
"ระบุคำเตือนตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาที่ต้องแจ้งคำเตือนการใช้ยาไว้ในฉลากและที่เอกสารกำกับยา และข้อความของคำเตือน"

1. ยานี้คืออะไร

- ยานี้มีชื่อสามัญว่าพาราเซตามอล (paracetamol) เป็นยาในกลุ่มลดไข้ บรรเทาปวด
- ยานี้ใช้เพื่อลดไข้ บรรเทาอาการปวดเล็กน้อยถึงปานกลาง เช่น ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยจากใช้หวัด ปวดฟัน ปวดประจำเดือน ปวดกล้ามเนื้อ ปวดหลัง ปวดจากข้อเสื่อม

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

- 2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไหร่**
- ☒ ห้ามใช้ในผู้ที่เคยแพ้ยาพาราเซตามอลหรือแพ้ส่วนประกอบอื่นในตำรับนี้
 - ☒ ห้ามใช้พาราเซตามอลเกินขนาดที่แนะนำในฉลากและเอกสารกำกับยา เพราะอาจเกิดพิษร้ายแรงจนตับวายและเสียชีวิตได้
 - ☒ หลีกเลี่ยงการใช้ยานี้ร่วมกับยาอื่นที่มีพาราเซตามอลเป็นส่วนประกอบ เพราะอาจทำให้ได้รับยาเกินขนาด

- 2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้**
- ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยานี้หากมีภาวะพร่องจีซิกซ์พีดี (G6PD) หรือกำลังกินยาด้านการแข็งตัวของเลือดวอร์ฟาริน เพราะอาจเกิดอันตรายจากยานี้ได้ง่ายขึ้น

- ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยานี้ หากดื่มสุราเป็นประจำ เป็นโรคตับหรือโรคไต เพราะอาจเกิดอันตรายจากยานี้ได้ง่ายขึ้น
- ถ้ามีไข้สูง (อุณหภูมิสูงกว่า 39.5 องศาเซลเซียส) ให้รีบไปพบแพทย์

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

น้ำหนักตัว (กิโลกรัม)	ขนาดยา
ตั้งแต่ 22 ถึง 33	กินยาครั้งละ 1 เม็ด แต่ละครึ่งชั่วโมงอย่างน้อย 4 ชั่วโมง เฉพาะเวลาปวดหรือมีไข้
มากกว่า 33 ถึง 44	กินยาครั้งละ หนึ่งเม็ดครึ่ง แต่ละครึ่งชั่วโมงอย่างน้อย 4 ชั่วโมง เฉพาะเวลาปวดหรือมีไข้
มากกว่า 44	กินยาครั้งละ 2 เม็ด แต่ละครึ่งชั่วโมงอย่างน้อย 4 ชั่วโมง เฉพาะเวลาปวดหรือมีไข้

3.2 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร
รีบไปพบ แพทย์ทันที เพราะหากได้รับยาเกินขนาดไปมากและได้รับการรักษาไม่ทันท่วงทีจะทำให้ตับถูกทำลาย นำไปสู่การเสียชีวิตจากตับวายได้

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างการใช้อย่างไร

- ไม่กินยาดัดต่อกันเป็นเวลานาน โดยไม่ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
- ถ้ากินยาแล้วไข้ไม่ลดภายใน 3 วัน หรืออาการปวดของเด็กไม่บรรเทาภายใน 5 วัน หรืออาการปวดของผู้ใหญ่ไม่บรรเทาใน 10 วัน ให้ไปพบแพทย์เนื่องจากอาจเป็นอาการของโรคที่ร้ายแรงได้

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

- 5.1 หากกินยาแล้วเกิดอาการ เช่น**
- บวมที่ใบหน้า เปลือกตาริมฝีปาก ลมพิษ
 - หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
 - ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก
 - มีจ้ำตามผิวหนัง เลือดออกผิดปกติ เทหน้อยง่าย เป็นหวัดได้ง่าย

ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

5.2 หากจำเป็นต้องกินยานี้ต่อเนื่องแล้วเกิดอาการ เช่น

- อาการปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน ท้องอืด ตัวเหลือง ตาเหลือง ปัสสาวะสีเข้มขึ้น

ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บยาไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- แกะยาออกจากแผงเมื่อจะกินในแต่ละครั้งเท่านั้น
- เก็บยาในที่แห้ง อบอุ่นโดยแสงโดยตรง โดยทั่วไป ควรเก็บที่อุณหภูมิ ...<ปรับตามทะเบียนยา>... องศาเซลเซียส
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

ระบุลักษณะและสีของยา และระบุส่วนประกอบในตำรับ ...<ปรับตามทะเบียนยา>...
ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า/ผู้แทนจำหน่าย.....
เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ.....

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัย
ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**

พาราเซตามอล
120 มิลลิกรัม ต่อ 5 มิลลิลิตร
ชนิดน้ำเชื่อมเข้มข้น/
ชนิดน้ำแขวนตะกอนเข้มข้น
[ชื่อการค้า]

คำเตือน
"ระบุคำเตือนตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง ยาที่ต้องแจ้งคำเตือนการใช้ยา
ไว้ในฉลากและที่เอกสารกำกับยา
และข้อความของคำเตือน"

1. ยานี้คืออะไร

- ยานี้มีชื่อสามัญว่าพาราเซตามอล (paracetamol) เป็นยาในกลุ่มลดไข้ บรรเทาปวด
- ยานี้ใช้เพื่อลดไข้ บรรเทาอาการปวดเล็กน้อยถึงปานกลาง เช่น ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยจากไข้หวัด ปวดฟัน ปวดกล้ามเนื้อ ปวดหลัง

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

- 2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไหร่**
- ☒ ห้ามใช้กับผู้ที่เคยแพ้ยาพาราเซตามอลหรือแพ้ส่วนประกอบอื่นในตำรับนี้
 - ☒ ห้ามใช้พาราเซตามอลเกินขนาดที่แนะนำในฉลากและเอกสารกำกับยาเพราะอาจเกิดพิษร้ายแรงจนดับวาย เสียชีวิตได้
 - ☒ หลีกเลี่ยงการใช้ยาร่วมกับยาอื่นที่มีพาราเซตามอลเป็นส่วนประกอบ เพราะอาจทำให้ได้รับยาเกินขนาด

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยานี้หากมีภาวะพร่องจีซีกซ์พีดี (GGPD) หรือกำลังกินยาด้านการแข็งตัวของเลือด วอร์ฟาริน หรือเป็นโรคตับหรือโรคไต เพราะอาจเกิดอันตรายจากยานี้ได้ง่ายขึ้น

- ถ้ามีไข้สูง (อุณหภูมิสูงกว่า 39.5 องศาเซลเซียส) ให้รีบไปพบแพทย์
- การใช้ยาในเด็กอายุต่ำกว่า 2 เดือน ให้ปรึกษาแพทย์

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

อายุ	ขนาดยา	
น้อยกว่า 2 เดือน	ให้ปรึกษาแพทย์	
2 ถึง 3 เดือน ที่มีน้ำหนักตัว 4 – 6 กิโลกรัม	กินครั้งละ ครึ่งช้อนชา (หรือ 2.5 มิลลิลิตร) วันละ 1 ครั้ง เฉพาะเวลาปวดหรือมีไข้ หากจำเป็นต้องกินอีกครั้ง ห่างจากครั้งแรกอย่างน้อย 4 ชั่วโมง ถ้าไม่ดีขึ้นให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร	
มากกว่า 3 เดือน	กินยาเฉพาะเวลาปวดหรือมีไข้ วันละไม่เกิน 5 ครั้ง แต่ละครึ่งห่างกันอย่างน้อย 4 ชั่วโมง <u>ตามขนาดยาในตาราง</u>	
	น้ำหนักตัว (กิโลกรัม)	กระบอกฉีดยา*
	ตั้งแต่ 4 - 6	ครึ่งช้อน
	มากกว่า 6 - 8	สามส่วนสี่ช้อน
	มากกว่า 8 - 12	หนึ่งช้อน
	มากกว่า 12 - 16	หนึ่งช้อนครึ่ง
	มากกว่า 16 - 24	สองช้อน
	* หรือถ้วยตวงยา	

วิธีใช้ยา

- เขย่าขวดก่อนใช้ยา
- ตวงยาและป้อนยา ด้วยกระบอกฉีดยา (ไซริงค์) หรือ ช้อนชา ตวงยา หรือ ถ้วยตวงยา

3.2 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร
รีบไปพบแพทย์ทันที เพราะหากได้รับยาเกินขนาดไปมาก และได้รับการรักษาไม่ทันท่วงทีจะทำให้ตับถูกทำลาย นำไปสู่การเสียชีวิตจากตับวายได้

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างการให้ยา

- ไม่กินยาคิดต่อกันเป็นเวลานาน โดยไม่ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
- ถ้ากินยาแล้วไข้ไม่ลดภายใน 3 วัน หรืออาการปวดของเด็กไม่บรรเทาภายใน 5 วัน หรืออาการปวดของผู้ใหญ่ไม่บรรเทาใน 10 วัน ให้ไปพบแพทย์เนื่องจากอาจเป็นอาการของโรคที่ร้ายแรงได้

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 หากกินยาแล้วเกิดอาการ เช่น

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง คุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก
- มีจ้ำตามผิวหนัง เลือดออกผิดปกติ เหนื่อยง่าย เป็นหวัดได้ง่าย

ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

5.2 หากจำเป็นต้องกินยานี้ต่อเนื่องแล้วเกิดอาการ เช่น

- อาการปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน ท้องอืด ตัวเหลือง ตาเหลือง ปัสสาวะสีเข้มขึ้น

ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บยาไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิ ... <ปรับตามทะเบียนยา> ... องศาเซลเซียส
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

ระบุลักษณะและสีของยา และระบุส่วนประกอบในตำรับ ... <ปรับตามทะเบียนยา> ...

ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า/ผู้แทนจำหน่าย.....
เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ.....