

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน

(ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๑

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๖ (๕) (๗) และ (๘) แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ และมาตรา ๗๘ แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยคำแนะนำของคณะกรรมการยา ในการประชุมครั้งที่ ๓๗๘ - ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๑.๑๒) (๑.๑๓) ข้อ ๒ ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๒

“(๑.๑๒) ยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกและอาหารไม่ย่อย เนื่องจากกรดไหลย้อน ชนิดเม็ด

ในสูตรตำรับ ๑ เม็ด ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ

Sodium alginate ๒๕๐ - ๕๐๐ มิลลิกรัม หรือในปริมาณอื่นที่เหมาะสม

Sodium bicarbonate ๙๕ - ๓๐๐ มิลลิกรัม หรือในปริมาณอื่นที่เหมาะสม

Calcium carbonate ๗๐ - ๓๖๐ มิลลิกรัม หรือในปริมาณอื่นที่เหมาะสม

(ปริมาณอื่นที่เหมาะสม ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาตำรับยาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์)

สรรพคุณ ๑. บรรเทาอาการแสบร้อนบริเวณกลางอกร่วมกับเรอเปรี้ยว และอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อน หรือ

๒. บรรเทาอาการแสบร้อน บริเวณกลางอก ร่วมกับเรอเปรี้ยว และอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อน และลดกรดในกระเพาะอาหาร ในกรณีที่มีค่าความสามารถในการสะเทินกรดในกระเพาะอาหาร (Acid Neutralizing Capacity : ANC) ไม่ต่ำกว่า ๕ มิลลิอิควิวาเลนซ์ (mEq) ต่อขนาดการใช้ยาหนึ่งครั้ง

ขนาดบรรจุ ภาชนะบรรจุขนาดไม่เกิน ๒๐ เม็ด

คำเตือนในฉลาก ๑. ผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจ โรคไต ต้องปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยา

๒. หากใช้แล้วอาการไม่ดีขึ้น หรือแสบท้องให้หยุดยา และไปพบแพทย์ทันที

๓. ในกรณีที่ได้รับประทานยานี้ร่วมกับยาอื่น ควรรับประทานห่างกัน

๒ ชั่วโมง

ในกรณีที่มีการใช้แอสปลาแตมเป็นสารให้ความหวาน ให้ระบุคำเตือน

เพิ่มเติม ดังนี้

๔. ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่มีสภาวะฟิสิกส์ไตนูเรีย ยานี้มีส่วนประกอบ

ของแอสปาแตม

ขนาดและวิธีใช้ คำเตือนบนเอกสารกำกับยาสำหรับประชาชน การเก็บรักษา การแสดงข้อความอื่นบนเอกสารกำกับยา ให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ (โดยให้แนบเอกสารกำกับยาสำหรับประชาชนไปกับทุกขนาดบรรจุที่ถึงมือผู้บริโภค)”

“(๑.๑๓) ยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกและอาหารไม่ย่อย เนื่องจากกรดไหลย้อน

ชนิดน้ำ

ในสูตรตำรับ ๑๐ มิลลิลิตร ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ

Sodium alginate ๒๕๐ - ๕๐๐ มิลลิกรัม หรือในปริมาณอื่นที่เหมาะสม

Sodium bicarbonate ๙๕ - ๓๐๐ มิลลิกรัม หรือในปริมาณอื่นที่เหมาะสม

Calcium carbonate ๗๐ - ๓๖๐ มิลลิกรัม หรือในปริมาณอื่นที่เหมาะสม

(ปริมาณอื่นที่เหมาะสม ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณา

ตำรับยาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์)

สรรพคุณ

๑. บรรเทาอาการแสบร้อนบริเวณกลางอกร่วมกับเรอเปรี้ยว และอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อน หรือ

๒. บรรเทาอาการแสบร้อน บริเวณกลางอก ร่วมกับเรอเปรี้ยว

และอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อน และลดกรดในกระเพาะอาหาร ในกรณีที่มีค่าความสามารถในการสะเทินกรดในกระเพาะอาหาร (Acid Neutralizing Capacity : ANC) ไม่ต่ำกว่า ๕ มิลลิอิกวิวาเลนซ์ (mEq) ต่อขนาดการใช้ยาหนึ่งครั้ง

ขนาดบรรจุ ภาชนะบรรจุขนาดไม่เกิน ๑๕๐ มิลลิลิตร

คำเตือนในฉลาก ๑. ผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจ โรคไต ต้องปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยา

๒. หากใช้แล้วอาการไม่ดีขึ้น หรือแยลงให้หยุดยา และไปพบแพทย์ทันที

๓. ในกรณีที่รับประทานยานี้ร่วมกับยาอื่น ควรรับประทานห่างกัน

๒ ชั่วโมง

ในกรณีที่มีการใช้แอสปาแตมเป็นสารให้ความหวาน ให้ระบุคำเตือน

เพิ่มเติม ดังนี้

๔. ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่มีสภาวะฟิสิกส์ไตนูเรีย ยานี้มีส่วนประกอบ

ของแอสปาแตม

ขนาดและวิธีใช้ คำเตือนบนเอกสารกำกับยาสำหรับประชาชน การเก็บรักษา การแสดงข้อความอื่นบนเอกสารกำกับยา ให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ (โดยให้แนบเอกสารกำกับยาสำหรับประชาชนไปกับทุกขนาดบรรจุที่ถึงมือผู้บริโภค)”

ข้อ ๓ ให้ยาที่ผลิต นำหรือส่งเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งยาแผนปัจจุบันที่ได้รับการขึ้นทะเบียนไว้แล้วก่อนได้รับอนุญาตให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงทะเบียนตำรับยาเป็นยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบันตามประกาศนี้ ยังคงเป็นยาตามที่ได้รับอนุญาตต่อไป จนกว่ายานั้นจะสิ้นอายุ

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๕ ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๕ ให้ผู้รับอนุญาตที่ประสงค์จะทำการผลิต นำหรือส่งเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งยาแผนปัจจุบันที่เป็นยาสามัญประจำบ้าน ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาโดยมีรายละเอียดเป็นไปตามประกาศนี้ และเมื่อได้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยาแล้วจึงจะผลิตหรือนำหรือส่งยาเข้ามาในราชอาณาจักรได้”

ข้อ ๕ ให้ผู้รับอนุญาตผลิต นำหรือส่งเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งยาแผนปัจจุบันที่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยาไว้และมีสูตรตำรับตามข้อ ๒ สามารถขอแก้ไขรายการในทะเบียนตำรับยาได้ และเมื่อได้รับอนุญาตให้แก้ไขทะเบียนตำรับยาแล้ว จึงจะผลิตหรือนำหรือส่งยาเข้ามาในราชอาณาจักรได้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ปิยะสกล สกลสัตยาทร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

เอกสารกำกับยาสำหรับประชาชน

ยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกและอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อน ชนิดเม็ด

อาการแสบหรือเจ็บหน้าอกอาจเป็นอาการของโรคหัวใจ
ซึ่งเป็นอันตรายรุนแรงถึงชีวิต หากไม่แน่ใจหรือมีข้อสงสัย ควรปรึกษาแพทย์

1. ยานี้คือยาอะไร

1.1 ยานี้มีชื่อสามัญว่าอะไร

ใน 1 เม็ด มีตัวยาไซโตเดียมแอลจีเนต 250 มิลลิกรัม
ไซโตเดียมไบคาร์บอเนต 133.5 มิลลิกรัม และแคลเซียม
คาร์บอเนต 80 มิลลิกรัม

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

เพื่อบรรเทาอาการแสบร้อนบริเวณกลางอก ร่วมกับเรอ
เปรี้ยว และอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อน

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ส่วนประกอบของยานี้ อาการแพ้ที่อาจ
เกิดขึ้น เช่น หายใจลำบาก ผื่นลมพิษ
- ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่มีสถานะฟิโนลดีโตนูเรีย ยานี้มี
ส่วนประกอบของแอสปาแตม (ถ้ามี)

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ผู้ที่เป็นโรคหัวใจหรือโรคไต ต้องปรึกษาแพทย์ก่อนใช้
ยานี้
- หากกินยาแล้วอาการไม่ดีขึ้นหรือแย่ลง
ให้หยุดยาและไปพบแพทย์ทันที

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ผู้ใหญ่และเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป กินครั้งละ 2-4 เม็ด
วันละ 4 ครั้ง หลังอาหารและก่อนนอน
- เคี้ยวให้ละเอียดก่อนกลืน

3.2 หากลืมกินยา ควรทำอย่างไร

- ถ้าลืมกินยา ไม่จำเป็นต้องกินเพิ่มเป็น 2 เท่าในครั้ง
ต่อไป ให้กินยาในขนาดปกติ

3.3 ถ้ากินยาเกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ในกรณีผู้ป่วยโรคหัวใจหรือโรคไต ที่กินยามากเกินไป
หากมีอาการท้องอืด อาจทำให้เกิดอันตราย ให้พบ
แพทย์ทันที
- ถ้ากินยานี้มากเกินไป อาจทำให้รู้สึกท้องอืด ให้สังเกต
อาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้
รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ในกรณีที่กินยานี้ร่วมกับยาอื่น เช่น เตตราไซคลิน
(tetracyclines), ฟลูออโรควิโนโลน
(fluoroquinolones), เกลือของธาตุเหล็ก (iron salts),
ไทรอยด์ฮอร์โมน (thyroid hormones), คลอโรควิน
(chloroquine), บิสฟอสโฟเนต (bisphosphonates)
และเอสตรามัสทีน (estramustine) ควรกินห่างกัน
อย่างน้อย 2 ชั่วโมง
- เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคกรดไหลย้อน
หลีกเลี่ยงการกินอาหารมัน หรืออาหารรสจัด งดการสูบ
บุหรี่และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที
หากมีอาการแพ้ต่อส่วนประกอบในยา และเกิดอาการ
ต่อไปนี้

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนังหรือ
เลือดออกผิดปกติ

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- ให้เก็บยาไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส
- ไม่ควรโดนแสงแดด
- ไม่เก็บยาในตู้เย็น
- ไม่เก็บยาในที่ชื้น

ผู้ผลิต

ผู้นำเข้า

ผู้แทนจำหน่าย (ถ้ามี)

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ

เอกสารกำกับยาสำหรับประชาชน

ยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกและอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อน ชนิดน้ำ

อาการแสบหรือเจ็บหน้าอกอาจเป็นอาการของโรคหัวใจ ซึ่งเป็นอันตรายรุนแรงถึงชีวิต หากไม่แน่ใจหรือมีข้อสงสัย ควรปรึกษาแพทย์

1. ยานี้คือยาอะไร

1.1 ยานี้มีชื่อสามัญว่าอะไร

ใน 10 มิลลิลิตร มีตัวยาไซเตียมแอลจีเนต 500 มิลลิกรัม ไซเตียมไบคาร์บอเนต 267 มิลลิกรัม และแคลเซียมคาร์บอเนต 160 มิลลิกรัม

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

เพื่อบรรเทาอาการแสบร้อนบริเวณกลางอก ร่วมกับเรอเปรี้ยว และอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อน

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ส่วนประกอบของยานี้ อาการแพ้ที่อาจเกิดขึ้น เช่น หายใจลำบาก ผื่นลมพิษ
- ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่มีสถานะฟิโนลดีโตนูเรีย ยานี้มีส่วนประกอบของแอสปาแตม (ถ้ามี)

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ผู้ที่เป็นโรคหัวใจหรือโรคไต ต้องปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยานี้
- หากกินยาแล้วอาการไม่ดีขึ้นหรือแย่ลง ให้หยุดยาและไปพบแพทย์ทันที

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ผู้ใหญ่และเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป กินครั้งละ 10-20 มิลลิลิตร (2-4 ช้อนชา) วันละ 4 ครั้ง หลังอาหารและก่อนนอน
- เขย่าขวด/ชงก่อนใช้ยา

3.2 หากลืมกินยา ควรทำอย่างไร

- ถ้าลืมกินยา ไม่จำเป็นต้องกินเพิ่มเป็น 2 เท่าในครั้งต่อไป ให้กินยาในขนาดปกติ

3.3 ถ้ากินยาเกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ในกรณีผู้ป่วยโรคหัวใจหรือโรคไต ที่กินยามากเกินไป หากมีอาการท้องอืด อาจทำให้เกิดอันตราย ให้พบแพทย์ทันที
- ถ้ากินยานี้มากเกินไป อาจทำให้รู้สึกท้องอืด ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ในกรณีที่กินยานี้ร่วมกับยาอื่น เช่น เตตราไซคลิน (tetracyclines), ฟลูออโรควิโนโลน (fluoroquinolones), เกลือของธาตุเหล็ก (iron salts), ไทรอยด์ฮอร์โมน (thyroid hormones), คลอโรควิน (chloroquine), บิสฟอสโฟเนต (bisphosphonates) และเอสตรามัสทีน (estramustine) ควรกินห่างกันอย่างน้อย 2 ชั่วโมง
- เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคกรดไหลย้อน หลีกเลี่ยงการกินอาหารมัน หรืออาหารรสจัด งดการสูบบุหรี่และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที หากมีอาการแพ้ต่อส่วนประกอบในยา และเกิดอาการต่อไปนี้

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวนิ่งหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนังหรือเลือดออกผิตก

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- ให้เก็บยาไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส
- ไม่ควรโดนแสงแดด
- ไม่เก็บยาในตู้เย็น
- ไม่เก็บยาในที่ชื้น

ผู้ผลิต

ผู้นำเข้า

ผู้แทนจำหน่าย (ถ้ามี)

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

ใช้ตัวอักษร Tahoma ขนาด 11

เอกสารกำกับยาสำหรับประชาชน

ยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอก อาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อน และลดกรดในกระเพาะอาหาร ชนิดเม็ด

อาการแสบหรือเจ็บหน้าอกอาจเป็นอาการของโรคหัวใจ ซึ่งเป็นอันตรายรุนแรงถึงชีวิต หากไม่แน่ใจหรือมีข้อสงสัย ควรปรึกษาแพทย์

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อสามัญว่าอะไร

ใน 1 เม็ด มีตัวยาไซโตเดียมแอลจินเนต 250 มิลลิกรัม ไซโตเดียมไบคาร์บอเนต 106.5 มิลลิกรัม และแคลเซียมคาร์บอเนต 187.5 มิลลิกรัม

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

เพื่อบรรเทาอาการแสบร้อนบริเวณกลางอก ร่วมกับเรอเปรี้ยว อาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อน และลดกรดในกระเพาะอาหาร

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ส่วนประกอบของยานี้ อาการแพ้ที่อาจเกิดขึ้น เช่น หายใจลำบาก ผื่นลมพิษ
- ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่มีสถานะฟิสิกส์ไตเนเรีย ยานี้มีส่วนประกอบของแอสปาแตม (ถ้ามี)

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ผู้ที่เป็นโรคหัวใจหรือโรคไต ต้องปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยานี้
- หากกินยาแล้วอาการไม่ดีขึ้นหรือแย่ลง ให้หยุดยาและไปพบแพทย์ทันที

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ผู้ใหญ่และเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป กินครั้งละ 2-4 เม็ด วันละ 4 ครั้ง หลังอาหารและก่อนนอน
- เคี้ยวให้ละเอียดก่อนกลืน

3.2 หากลืมกินยา ควรทำอย่างไร

- ถ้าลืมกินยา ไม่จำเป็นต้องกินเพิ่มเป็น 2 เท่าในครั้งต่อไป ให้กินยาในขนาดปกติ

3.3 ถ้ากินยาเกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ในกรณีผู้ป่วยโรคหัวใจหรือโรคไต ที่กินยามากเกินไป หากมีอาการท้องอืด อาจทำให้เกิดอันตราย ให้พบแพทย์ทันที
- ถ้ากินยานี้มากเกินไป อาจทำให้รู้สึกท้องอืด ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ในกรณีที่กินยานี้ร่วมกับยาอื่น เช่น เตตราไซคลิน (tetracyclines), ฟลูออโรควิโนโลน (fluoroquinolones), เกลือของธาตุเหล็ก (iron salts), ไทรอยด์ฮอร์โมน (thyroid hormones), คลอโรควิน (chloroquine), บิสฟอสโฟเนต (bisphosphonates) และเอสตรามัสทีน (estramustine) ควรกินห่างกันอย่างน้อย 2 ชั่วโมง
- เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคกรดไหลย้อน หลีกเลี่ยงการกินอาหารมัน หรืออาหารรสจัด งดการสูบบุหรี่และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที หากมีอาการแพ้ต่อส่วนประกอบในยา และเกิดอาการต่อไปนี้

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจุดตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- ให้เก็บยาไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส
- ไม่ควรโดนแสงแดด
- ไม่เก็บยาในตู้เย็น
- ไม่เก็บยาในที่ชื้น

ผู้ผลิต

ผู้นำเข้า

ผู้แทนจำหน่าย (ถ้ามี)

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

ใช้ตัวอักษร Tahoma ขนาด 11

เอกสารกำกับยาสำหรับประชาชน

ยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอก อาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อน และลดกรดในกระเพาะอาหาร ชนิดน้ำ

อาการแสบหรือเจ็บหน้าอกอาจเป็นอาการของโรคหัวใจ ซึ่งเป็นอันตรายรุนแรงถึงชีวิต หากไม่แน่ใจหรือมีข้อสงสัย ควรปรึกษาแพทย์

1. ยานี้คือยาอะไร

1.1 ยานี้มีชื่อสามัญว่าอะไร

ใน 10 มิลลิลิตร มีตัวยาไซเตียมแอลจินेट 500 มิลลิกรัม ไซเตียมโบคาร์บอเนต 213 มิลลิกรัม และแคลเซียมคาร์บอเนต 325 มิลลิกรัม

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

เพื่อบรรเทาอาการแสบร้อนบริเวณกลางอก ร่วมกับเรอเปรี้ยว อาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อน และลดกรดในกระเพาะอาหาร

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ส่วนประกอบของยานี้ อาการแพ้ที่อาจเกิดขึ้น เช่น หายใจลำบาก ผื่นลมพิษ
- ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่มีสภาวะฟีนิลคีโตนูเรีย ยานี้มีส่วนประกอบของแอสปาแตม (ถ้ามี)

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ผู้ที่เป็โรคหัวใจหรือโรคไต ต้องปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยานี้
- หากกินยาแล้วอาการไม่ดีขึ้นหรือแย่ลง ให้หยุดยาและไปพบแพทย์ทันที

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ผู้ใหญ่และเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป กินครั้งละ 10-20 มิลลิลิตร (2-4 ช้อนชา) วันละ 4 ครั้ง หลังอาหารและก่อนนอน
- เขย่าขวด/ชงก่อนใช้ยา

3.2 หากลืมกินยา ควรทำอย่างไร

- ถ้าลืมกินยา ไม่จำเป็นต้องกินเพิ่มเป็น 2 เท่าในครั้งต่อไป ให้กินยาในขนาดปกติ

3.3 ถ้ากินยาเกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ในกรณีผู้ป่วยโรคหัวใจหรือโรคไต ที่กินยามากเกินไป หากมีอาการท้องอืด อาจทำให้เกิดอันตราย ให้พบแพทย์ทันที
- ถ้ากินยานี้มากเกินไป อาจทำให้รู้สึกท้องอืด ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ในกรณีที่กินยานี้ร่วมกับยาอื่น เช่น เตตราไซคลิน (tetracyclines), ฟลูออโรควิโนโลน (fluoroquinolones), เกลือของธาตุเหล็ก (iron salts), ไทรอยด์ฮอร์โมน (thyroid hormones), คลอโรควิน (chloroquine), บิสฟอสโฟเนต (bisphosphonates) และเอสตรามัสทีน (estramustine) ควรกินห่างกันอย่างน้อย 2 ชั่วโมง
- เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคกรดไหลย้อน หลีกเลี่ยงการกินอาหารมัน หรืออาหารรสจัด งดการสูบบุหรี่และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที หากมีอาการแพ้ต่อส่วนประกอบในยา และเกิดอาการต่อไปนี้

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตาริมฝีปากลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผื่นหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- ให้เก็บยาไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส
- ไม่ควรโดนแสงแดด
- ไม่เก็บยาในตู้เย็น
- ไม่เก็บยาในที่ชื้น

ผู้ผลิต
ผู้นำเข้า
ผู้แทนจำหน่าย (ถ้ามี)

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

ใช้ตัวอักษร Tahoma ขนาด 11