

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง ยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ ให้เหมาะสมกับสภากาชาดไทยที่ทางการแพทย์และการสาธารณสุขในปัจจุบัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๖ (๕) (๗) (๘) และ (๙) แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยคำแนะนำของคณะกรรมการยาจึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิก ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาสามัญประจำบ้าน ฉบับที่ ๒ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๗

ข้อ ๒ ให้ยาแผนโบราณตามด้ำรับต่อไปนี้เป็นยาสามัญประจำบ้าน

๑. ยาขันลม แก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ

๑.๑ ยาประสะกะเพรา ยาวิสัมพยาใหญ่ ยาประสะกานพลู ยาแสงหมึก ยามันಥราดุ ยาประสะเจตพังคี ยานหاجرใหญ่ ที่มีส่วนประกอบ วิเชทำ สรรพคุณขนาดรับประทาน ขนาดบรรจุตามรายละเอียดในข้อ ๓ แห่งประกาศฉบับนี้

๑.๒ ด้ำรับยาที่มีตัวยาต่อไปนี้ ตัวหนึ่งตัวใดหรือหลายตัวเป็นตัวยาสำคัญ คือ ชิง ช่า ตะไคร้ กานพลู สาระแน่ โพรพะ กะเพรา ขมิ้นชัน ขมิ้นอ้อย กระเทียม หอมแดง กะทิอ ไฟล เม็ดพริกไทย เจตพังคี ลูกกระวน จันทน์เทศ อบเชย ดีปลี มหาหิงคุ์ ลูกจันทน์ ดอกจันทน์ ลูกเรือ ลูกผักชีลา เปราะหอม

ช้าพถุ สะค้าน เกสีดสะระแห่น การบูร ผิวและใบมะกรูด ผิวและใบมะนาว
สมัดน้อย สมัดใหญ่ โดยสูตรส่วนประกอบ วิธีทำ สรรพคุณ ขนาดรับประทาน
และขนาดบรรจุ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการยา

๒. ยาถ่าย ยาระบาย

๒.๑ ยาดีห่อน ยาธรณีสันทะมาด ยาถ่าย ที่มีส่วนประกอบ วิธีทำ
สรรพคุณ ขนาดรับประทาน ขนาดบรรจุตามรายละเอียดในข้อ ๓ แห่งประกาศฉบับนี้

๒.๒ ตำรับยาที่มีตัวยาดังต่อไปนี้ ตัวหนึ่งตัวใดหรือหลายตัวเป็นตัวยา
สำคัญ คือ ยาดำ โกฐน้ำเด็ก มะขามแขก ฝักคูณ ขี้เหล็ก สมอไทย น้ำมันละหุ่ง
ตีเกลือ ชะเอมไทย อ้อยสามส่วน ชุมเห็ดเทศ เกลือสินเชาว์ เกลือเทศ สดัดได
รากตองแขก มะขามป้อม มะขามเปี๊ยะ โดยสูตรส่วนประกอบ วิธีทำ สรรพคุณ
ขนาดรับประทาน และขนาดบรรจุ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการยา

๓. ยาแก้ท้องเสีย

๓.๑ ยาเหลืองปิดสมุทร ยาราดูบระบบ ที่มีส่วนประกอบ วิธีทำ สรรพคุณ
ขนาดรับประทาน ขนาดบรรจุตามรายละเอียดในข้อ ๓ แห่งประกาศฉบับนี้

๓.๒ ตำรับยาที่มีตัวยาดังต่อไปนี้ ตัวหนึ่งตัวใดหรือหลายตัวเป็นตัวยา
สำคัญ คือ ใบฝรั่ง เปลือกมังคุด เปลือกหัวพิม เปลือกขี้อ้าย รากกระท้อน
รากมะพร้าว รากดาล รากลาน เปลือกต้นไช่เน่า เปลือกต้นมะขาม เปลือกฝักเพกา
มาก ขบุนดิน ใบชา ครั่ง สีเสียด เปลือกซิก เปลือกแคน เปลือกมะเดื่อชุมพร
ขมีนชัน ถูกเบญ្យานี โดยสูตรส่วนประกอบ วิธีทำ สรรพคุณ ขนาดรับประทาน
และขนาดบรรจุ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการยา

๔. ยาแก้ไข้

๔.๑ ยาจันทน์ลีลา ยาประสะจันทน์แดง ที่มีส่วนประกอบ วิธีทำ สรรพคุณ ขนาดรับประทาน ขนาดบรรจุตามรายละเอียดในข้อ ๓ แห่งประกาศฉบับนี้

๔.๒ คำรับยาที่มีตัวยาต่อไปนี้ ตัวหนึ่งตัวใดหรือหลายตัวเป็นตัวยา สำคัญ คือ สะเดา หญ้าบัว หญ้าแพรอก บอร์เพ็ด ชิงช้าชาลี ลูกใต้ใบ พাতะลายโจร รากคนทา รากมะเดื่อชุมพร รากซิงชี่ รากท้าวยามมอม จันทน์เทศ จันทน์แดง ใบพิมเสน โกฐก้านพร้าว โกฐสอ โกฐจุฬาลัมพา รากปลาไหลเพือก ลูกกระดอน หญ้าตีนนก พญาเมือเหล็ก ต้นเหมือดคน รากไคร้เครือ กรุงเขมา เมล็ดในฝักเพกา ขี้ก้างหังสอง โดยสูตรส่วนประกอบ วิธีทำ สรรพคุณ ขนาดรับประทาน และขนาดบรรจุ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการยา

๕. ยาแก้ร้อนใน

๕.๑ ยาเขียวห่อน ที่มีส่วนประกอบ วิธีทำ สรรพคุณ ขนาดรับประทาน ขนาดบรรจุตามรายละเอียดในข้อ ๓ แห่งประกาศฉบับนี้

๕.๒ คำรับยาที่มีตัวยาต่อไปนี้ ตัวหนึ่งตัวใดหรือหลายตัวเป็นตัวยา สำคัญ คือ ผักกาดน้ำ เมล็ดมะกอก หญ้าใต้ใบ ใบพิมเสน จันทน์แดง จันทน์เทศ พাতะลายโจร แฟกห่อน ผักกระโภลง ใบสันพร้าห่อน ผลมะระเข็นก ลูกน้ำคำดีควาย เพา ดอกจื้า ใบคำลึง บอร์เพ็ด โดยสูตรส่วนประกอบ วิธีทำ สรรพคุณ ขนาดรับประทาน และขนาดบรรจุ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการยา

๖. ยานรรเทาหัด อีสุกอีใส

๖.๑ ยานานินดแท่งทอง ยาเขียวห่อน ที่มีส่วนประกอบ วิธีทำ สรรพคุณ ขนาดรับประทาน ขนาดบรรจุตามรายละเอียดในข้อ ๓ แห่งประกาศฉบับนี้

๖.๒ ตำรับยาที่มีดัวยาดังต่อไปนี้ ดัวหนึ่งดัวใดหรือหลายดัวเป็นดัวยาสำคัญ คือ จันทน์เทศ จันทน์แดง ใบพิมเสน ใบหญ้านาง ใบมะระ รากมะเดื่อชุมพร รากซิชชี่ รากหญ้านาง รากคนทา รากหัวยาเมื่อม ผักกระโภມ ใบสันพร้าหอน ว่านกินแรด ว่านร่อนทอง มหาสารคำ ไคร้เครื่อ เนระพูสี ลูกมะกำดีคำวย รากมะนาว รากมะกรุด รากมะปราง รากมะเพียง โดยสูตรส่วนประกอบ วิธีทำ สรรพคุณ ขนาดรับประทาน และขนาดบรรจุ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการยา

๗. ยาแก้ลมวิงเวียน

๗.๑ ยาหอนเทพจิตร ยาหอนพิพิoids ยาหอนอินทร์ ยาหอนนวโกร ที่มีส่วนประกอบ วิธีทำ สรรพคุณ ขนาดรับประทาน ขนาดบรรจุตามรายละเอียดในข้อ ๓ แห่งประกาศฉบับนี้

๗.๒ ตำรับยาที่มีดัวยาดังต่อไปนี้ ดัวหนึ่งดัวใดหรือหลายดัวเป็นดัวยาสำคัญ คือ เกสรหั้งห้า กฤษณา สมุลแวง โกฐพุงปลา โกฐกระดูก ประหมณ แฟกหอน อบเชย ชะมด เทียนหั้งห้า พิมเสน เกล็ดสะระแห่น โกฐหัวบัว โกฐเชียง กระลำพัก ขอนดอก หล่ายฝรั่น จันทน์หอน จันทน์เทศ เปลือกชะลุด การพุด จันทน์ชะมด ผิว ดอก ใบส้ม โดยสูตรส่วนประกอบ วิธีทำ สรรพคุณ ขนาดรับประทาน และขนาดบรรจุ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการยา

๘. ยาแก้ไอ

๘.๑ ยาอามฤควาที ยาประสาระแวง ที่มีส่วนประกอบ วิธีทำ สรรพคุณ ขนาดรับประทาน ขนาดบรรจุตามรายละเอียดในข้อ ๓ แห่งประกาศฉบับนี้

๘.๒ ตำรับยาที่มีดัวยาดังต่อไปนี้ ดัวหนึ่งดัวใดหรือหลายดัวเป็นดัวยาสำคัญ คือ มะแวง ชะเอมเทศ สมอเทศ มะขามป้อม ส้มปอย ใบสาวด มะนาว

มะเขือขี้น กฤษณา راكสัมกุ้ง มะขามเปียก โดยสูตรส่วนประกอบ วิธีทำ สรรพคุณ
ขนาดรับประทาน และขนาดบรรจุ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการยา

๕. ยาบำรุงร่างกาย

ตำรับยาที่มีตัวยาดังต่อไปนี้ ตัวหนึ่งตัวใดหรือหลายตัวเป็นตัวยาสำคัญ คือ
ระย่อง โกฐเชียง โกฐหัวบัว โสม เห็ดหลินจือ แห้วหมู กระชาย กำลังวัวเกลิง
กำลังหมูนา กำลังช้างสาร เม็ดข่อย เมล็ดอกตะโกรนา เมล็ดอกทิ้งถ่อน หัวกวางเครื่อ
กำลังเสือโครง โดยสูตรส่วนประกอบ วิธีทำ สรรพคุณ ขนาดรับประทาน และ
ขนาดบรรจุ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการยา

๖. ยาบำรุงโลหิต

๖.๑ ยาบำรุงโลหิต ที่มีส่วนประกอบ วิธีทำ สรรพคุณ ขนาด
รับประทาน ขนาดบรรจุตามรายละเอียดในข้อ ๓ แห่งประกาศฉบับนี้

๖.๒ ตำรับยาที่มีตัวยาดังต่อไปนี้ ตัวหนึ่งตัวใดหรือหลายตัวเป็นตัวยา
สำคัญ คือ ฝาง ดอกคำฝอย ผักเป็ดแดง โกฐเชียง ดอกคำไทย ดอกกรรณิการ์
สนนิมเหล็ก โกฐหัวห้า แกಡ แก่นขี้เหล็ก ว่านสาเกเหล็ก โดยสูตรส่วนประกอบ
วิธีทำ สรรพคุณ ขนาดรับประทาน และขนาดบรรจุ ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการยา

๗. ยาแก้ประจำเดือนไม่ปกติ

๗.๑ ยาประจำไฟ ที่มีส่วนประกอบ วิธีทำ สรรพคุณ ขนาด
รับประทาน ขนาดบรรจุตามรายละเอียดในข้อ ๓ แห่งประกาศฉบับนี้

๗.๒ ตำรับยาที่มีตัวยาต่อไปนี้ ตัวหนึ่งตัวใดหรือหลายตัวเป็นตัวยา
สำคัญ คือ แก่นแสมสาร แก่นแสมทะเล ลูกคัดเค้า หางไหหลัง มะไฟเดือนห้า

ເຊື່ອງເພື່ອມ້າ ສາຮສັນ ຝ່າງ ແກແລ ຄຳຝອຍ ຄຳໄທຍ ເຖິ່ນດຳ ໄພລ ຜິວມະກຽດ
ໃບສົມເສື້ຍາ ໃນສົມປອບ ຮາກນະດັນ ເຄົ້ານີ້ທີ່ສອງ ພັກເປີດແຜງ ພັກເສີ່ນຝຶ່ງ ຂມື່ນເຄື່ອ
ວ່ານ້ອມດູກ ໂດຍສູດຮ່ວມປະກອບ ວິທີທຳ ສຽງຄຸມ ບາດຮັບປະການ ແລະ
ບາດບຽງ ຕ້ອງໄດ້ຮັບຄວາມເຫັນຂອນຈາກຄະນະກຽມກາຍາ

๑๒. ຍາຂັບນ້າຄາວປລາ

๑๒.๑ ຍາໄຟປະລັກລັບປີ ຍາໄຟທ້າກອງ ທີ່ມີສ່ວນປະກອບ ວິທີທຳ
ສຽງຄຸມ ບາດຮັບປະການ ບາດບຽງຈຸດານຮາຍລະເວີດໃນຂ້ອ ๓ ແ່ງປະກາສົນນັບນີ້

๑๒.๒ ຕໍ່ຮັບຢາທີ່ມີຕ້ວຍາດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ ດ້ວຍໜຶ່ງຕົວໃຫ້ຮ່າຍຕ້ວມື່ນຕ້ວຍາ
ສຳຄັນ ອື່ນ ຮາກເຈດມູລເພີ່ງແຜງ ຈິງ ຕີປີລີ ພຣິກໄທຍ ຜິວມະກຽດ ແກ່ນແສນກະເລ
ຝ່າງ ສາຮສັນ ມັກເກົ່າໂທເກສ ທ່າງໄໜລແຜງ ວ່ານ້ອມດູກ ເປີດອກມະຮຸມ ກະເທື່ອມ
ໄພລ ດະໄກຮ ໂດຍສູດຮ່ວມປະກອບ ວິທີທຳ ສຽງຄຸມ ບາດຮັບປະການ ແລະບາດບຽງ
ຕ້ອງໄດ້ຮັບຄວາມເຫັນຂອນຈາກຄະນະກຽມກາຍາ

๑๓. ຍາກໝໍເສັນ ຢ້ອຍຢາແກ້ປວດເມື່ອຍ

ຕໍ່ຮັບຢາທີ່ມີຕ້ວຍາດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ ດ້ວຍໜຶ່ງຕົວໃຫ້ຮ່າຍຕ້ວມື່ນຕ້ວຍາສຳຄັນ ອື່ນ
ເຄົາວັລຍີເປົ້າຍ ເຄົາເອັນອ່ອນ ມະຄຳໄກ່ ຮາກແຈງ ຮາກແຜງ ເຄົາໂຄຄລານ ກຳແພັງເຈັດຫັ້ນ
ຫັ້ວດອົງດຶງ ຫັ້ວກະດາດທີ່ສອງ ຫັ້ວອຸດທີ່ຍ ຫັ້ວບຸກ ຫັ້ວກລອຍ ກຳລັງໜຸນມານ
ກຳລັງເສື່ອໂຄຮົງ ເຄົາເມື່ອຍ ແສ້າທະລາຍ ໂຮກແຜງ ໂຮກຂາວ ໂດຍສູດຮ່ວມປະກອບ
ວິທີທຳ ສຽງຄຸມ ບາດຮັບປະການ ແລະບາດບຽງ ຕ້ອງໄດ້ຮັບຄວາມເຫັນຂອນຈາກ
ຄະນະກຽມກາຍາ

๑๔. ຍາຂັບປັບສ່ວນ

ตำรับยาที่มีตัวยาดังต่อไปนี้ ตัวหนึ่งตัวใดหรือหลายตัวเป็นตัวยาสำคัญ คือ หญ้าคา หญ้าชันกาด ขี้อุ้ย อ้อยแดง โภคกระสุน หญ้าหนวดแมว รากลำเขียง เหง้าสับปะรด รากมะละกอ รากไม้ราก นานไม้รูโรย ใบอินทนิลน้ำ รากไทรย้อย กระเจี๊ยบ สารส้ม ต้นหงอนไก่ พักกาคน้ำ โดยสูตรส่วนประกอบ วิธีทำ สรรพคุณ ขนาดรับประทาน และขนาดบรรจุ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการยา

๑๕. ยาบรรเทาระดีดวงทวารหนัก

ตำรับยาที่มีตัวยาดังต่อไปนี้ ตัวหนึ่งตัวใดหรือหลายตัวเป็นตัวยาสำคัญ คือ โภคกั้กกรา อัคคีทวาร เพชรสังฆาต พักแพแดง แพงพวย เปลือกข้อม ขี้อุ้ย โดยสูตรส่วนประกอบ วิธีทำ สรรพคุณ ขนาดรับประทาน และขนาดบรรจุ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการยา

๑๖. ยาถ่ายพยาธิ

ตำรับยาที่มีตัวยาดังต่อไปนี้ ตัวหนึ่งตัวใดหรือหลายตัวเป็นตัวยาสำคัญ คือ อุกมะเกลือสด รากทับทิม เม็ดสะแก และสะแกทั้งห้า รากเล็บมือนาง เปลือก มะหาด ชุมเห็ดเทศ เปลือกดันไข่น่า ต้นคอมแอบน ปากหาด อุกเล็บมือนาง โดยสูตรส่วนประกอบ วิธีทำ สรรพคุณ ขนาดรับประทาน และขนาดบรรจุ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการยา

๑๗. ยาแก้ท้องตามขโนย

๑๗.๑ ยาประสะเปราะไหญ์ ที่มีส่วนประกอบ วิธีทำ สรรพคุณ ขนาดรับประทาน ขนาดบรรจุตามรายละเอียดในข้อ ๓ แห่งประกาศฉบับนี้

๑๗.๒ ตำรับยาที่มีตัวยาดังต่อไปนี้ ตัวหนึ่งตัวใดหรือหลายตัวเป็นตัวยาสำคัญ คือ ตานทั้งห้า อุกสะแก เล็บมือนาง คอมแอบน บอร์เพ็ต ขมิ้นอ้อย

เปลือกตันໄบ้เน่า แก่นมะเกลือ งวงดาล ชุมเห็ดเทศ เถ้าลินเสือ จูกหอม จูกกระเทียม รากทับทิม มะหาด โดยสูตรส่วนประกอบ วิธีทำ สรรพคุณ ขนาดรับประทาน และขนาดบรรจุ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการยา

๑๘. ยานรรเทาอาการผื่นคันตามผิวน้ำ

ตำรับยาที่มีตัวยาดังต่อไปนี้ ตัวหนึ่งตัวใดหรือหลายตัวเป็นตัวยาสำคัญ คือ ขันนิชน มนิล้ออย ข่า ดอกชุมเห็ดเทศ ใบเล็บมือนาง ข้าวเย็นทั้งสอง ขันทองพยานาท กำมะถันเหลือง น้ำสารส้ม ลิ้นทะเลข ตินสอพอง กระเทียม โดยสูตรส่วนประกอบ วิธีทำ สรรพคุณ ขนาดรับประทาน และขนาดบรรจุ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการยา

๑๙. ยาแก้กักลากเกลื้อน

ตำรับยาที่มีตัวยาดังต่อไปนี้ ตัวหนึ่งตัวใดหรือหลายตัวเป็นตัวยาสำคัญ คือ ขันทองพยานาท ใบเหنجอกปลาหม้อ ใบทองพันชั่ง กะเมิง ใบน้อยหน่า หนอน ตายอยาก กำมะถันเหลือง เม็ดในสะบ้าใหญ่ กระเทียม สารส้ม โดยสูตรส่วนประกอบ วิธีทำ สรรพคุณ ขนาดรับประทาน และขนาดบรรจุ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการยา

๒๐. ยาแก้ทิcid

ตำรับยาที่มีตัวยาดังต่อไปนี้ ตัวหนึ่งตัวใดหรือหลายตัวเป็นตัวยาสำคัญ คือ เมล็ดในน้อยหน่า กำมะถัน ลูกกระเบea ลูกกระเบียน ลูกสะบ้ามอมญ โดยสูตร ส่วนประกอบ วิธีทำ สรรพคุณ ขนาดรับประทาน และขนาดบรรจุ ต้องได้รับ ความเห็นชอบจากคณะกรรมการยา

๒๑. ยาบรรเทาไฟ แพล

คำรับยาที่มีตัวยาต่อไปนี้ ตัวหนึ่งตัวใดหรือหลายตัวเป็นตัวยาสำคัญ คือ ว่านหางจรเข้ ขมีนอ้อย ต้อยตึง หนากดิน สีเสียด เสน ยางสน ใบมะกา กำมะถันเหลือง โดยสูตรส่วนประกอบ วิธีทำ สรรพคุณ ขนาดรับประทาน และขนาดบรรจุ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการยา

๒๒. ยาไฟไหม้ น้ำร้อนลวก

คำรับยาที่มีตัวยาต่อไปนี้ ตัวหนึ่งตัวใดหรือหลายตัวเป็นตัวยาสำคัญ คือ ว่านหางจรเข้ ว่านหางช้าง ดินสอพอง ขมีนอ้อย ขมีนชัน พิมเสน การบูร เกล็ด สะระแหน่ ลี้นกะเล โดยสูตรส่วนประกอบ วิธีทำ สรรพคุณ ขนาดรับประทาน และขนาดบรรจุ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการยา

๒๓. ยาบรรเทาอาการปวดเมื่อย และแมลงกัดต่อย

คำรับยาที่มีตัวยาต่อไปนี้ ตัวหนึ่งตัวใดหรือหลายตัวเป็นตัวยาสำคัญ คือ เกล็ดสะระแหน่ พิมเสน การบูร น้ำมันยูคาลิปตัส เสลดพังพอน น้ำมันอบเชย น้ำมันกานพถุ น้ำมันเขียว น้ำมันระกำ ตะไคร้ร้อน ว่านเพชรทึ่ง โดยสูตร ส่วนประกอบ วิธีทำ สรรพคุณ ขนาดรับประทาน และขนาดบรรจุ ต้องได้รับ ความเห็นชอบจากคณะกรรมการยา

๒๔. ยาบรรเทาอาการเจ็บคอ

คำรับยาที่มีตัวยาต่อไปนี้ ตัวหนึ่งตัวใดหรือหลายตัวเป็นตัวยาสำคัญ คือ ฟ้าทะลายโจร มะขามป้อม ชะเอมเทศ สมอเทศ ลูกเบญจกานี ผักกระต หญ้าดอกขาว น้ำประสานทองสะคุ พิมเสน โดยสูตรส่วนประกอบ วิธีทำ สรรพคุณ ขนาดรับประทาน และขนาดบรรจุ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการยา

໣. ຍາແກ້ລື້ນເປັນຝ້າ

ດຳຮັບຢາທີ່ມີຕັວຢາຕ່ອໄປນີ້ ຕັວໜຶ່ງຕັວໄດ້ຮູ້ອໝາຍດັວເປັນຕັວຢາສຳກັນ ອີ່ອ
ຖຸກແຜຟການີ້ ຂາດກົອນ ພິມເສັນ ມິກໂຄນ ລື້ນທະເລ ໃນສວາດ ໃນຝຣັ້ງ ສີເສີຍດ ມາກ
ໂດຍສູດຮ່ວມປະກອບ ວິທີທຳ ສຽງພຸດ ພາດຮັບປະການ ແລະພາດບຽງ
ຕ້ອງໄດ້ຮັບຄວາມເຫັນຂອບຈາກຄະກຽມກາຍາ

ຂອ ๓ ໃຫ້ຢາແຜນໂປຣແນມ່ນີ້ຊື່ອ ສ່ວນປະກອບ ວິທີທຳ ສຽງພຸດ ພາດ
ຮັບປະການ ຄຳເຕືອນ ແລະພາດບຽງ ຕ່ອໄປນີ້ ເປັນຢາສານັ້ນປະຈຳບ້ານ

(១) ຍາປະສະກະເພຣາ

ວັດຖຸສ່ວນປະກອບ ພຣິກໄທຍ ຈິງ ດີປີ ກະເທິບນ ມັກສິ່ງລະ ២ ສ່ວນ
ໜະເອນເທີ່ ມາທີ່ງໆ ມັກສິ່ງລະ ៨ ສ່ວນ ແລ້ວສິນເຮົວ ມັກ ៣ ສ່ວນ ຜິວມະກຽດ
ມັກ ២០ ສ່ວນ ໃນກະເພຣາ ມັກ ៥៥ ສ່ວນ

ວິທີທຳ ບດເປັນຝ້າ ທຳເປັນເມືດ ມັກເມືດລະ ០.១ ກຣັມ

ສຽງພຸດ ແກ້ທ້ອງບັນ ທ້ອງເພື່ອ ລະລາຍນ້ຳສຸກ ທີ່ອນ້າໃນກະເພຣາດ້ວນ
ແກ້ທ້ອງແນ່ນຈຸກເສີຍດ ໃຫ້ໄພເພາໄຟພອສຸກ ຝົນແທຮກ

ພາດຮັບປະການ ຮັບປະການເຫຼົ້າ ເຢັນ

ເດືອກອາຍຸ ១ - ៣ ເດືອນ ກວັງລະ ១ - ២ ເມືດ

ເດືອກອາຍຸ ៤ - ៦ ເດືອນ ກວັງລະ ២ - ៣ ເມືດ

ເດືອກອາຍຸ ៧ - ១២ ເດືອນ ກວັງລະ ៤ - ៦ ເມືດ

ພາດບຽງ ៣០ ເມືດ

(២) ຍາວິສັນພຍາໃຫຍ່

วัดฤๅส่วนพระกอบ ลูกผักชีลา ลูกจันทน์ ดอกจันทน์ หนักสิ่งคละ
๙ ส่วน กระวน การพูด โกรธสอ โกรธเนมา โกรหัวบัว โกรธเชียง โกรธจุฬามพา
อบเชย สมุลแวง สมอเทศ สมอไทย รากไคร้เครือ ว่านน้ำ บอะระเพ็ด จิงแห้ง
พญา Rakxawa หนักสิ่งคละ ๒ ส่วน ดีปีสี หนัก ๕๖ ส่วน

วิธีทำ บดเป็นผง

สรรพคุณ แก้ท้องขึ้น อีดเพื້อ จูกเสียด

ขนาดรับประทาน รับประทานทุก ๔ ชั่วโมง

ครั้งละ ๑ ช้อนชา ใช้น้ำสุกเป็นกระสาย หรือผสม

น้ำผึ้งบีบเป็นลูกกลอน

ขนาดบรรจุ ๑๕ กรัม

(๓) ยาประสะกานพูด

วัดฤๅส่วนพระกอบ เทียนดำ เทียนขาว โกรธสอ โกรธกระดูก
กำมะถันเหลือง การบูร รากไคร้เครือ เปลือกเพกา เปลือกเขี้ยวย ใบกระวน
ลูกกระวน ลูกผักชีลา แฟกหอม ว่านน้ำ หัวกระชาย ประหมณ รากแจง
กรุงเขมา หนักสิ่งคละ ๔ ส่วน รากข้าวสาร เนื้อไม้ ลูกจันทน์ นมีนชัน หนักสิ่งคละ
๙ ส่วน จิงแห้ง ดีปีสี หนักสิ่งคละ ๓ ส่วน ไฟล เจดมูลเพลิงแดง สะค้าน ช้าพลู
หนักสิ่งคละ ๒ ส่วน เปลือกซิก หนัก ๑๐ ส่วน พริกไทย หนัก ๑ ส่วน การพูด
หนัก ๑๓ ส่วน

วิธีทำ บดเป็นผง

สรรพคุณ แก้ปวดท้อง เนื่องจากชาดูไม่ปกติ ใช้ไฟลเผาไฟฟนกับ
น้ำปูนใส ถ้าหาน้ำกระสายไม่ได้ ให้ใช้น้ำสุกแทน

ขนาดรับประทาน รับประทานทุก ๓ ชั่วโมง

ผู้ใหญ่ ครั้งละ ๑ ช้อนชา

ขนาดบรรจุ ๗๕ กรัม

(๔) ยาแสงหมีก

วัดถูกส่วนประกอบ หมึกหอบ จันทน์ชามด ลูกกระวน จันทน์เทศ
ใบพิมเสน ลูกจันทน์ ดอกจันทน์ กานพญ ใบสันพร้าหอม หัวหอบ ใบกะเพรา
หนักถึงลง ๕ กรัม พิมเสน หนัก ๑ ส่วน

วิธีทำ บดเป็นผง ทำเป็นเม็ด หนักเม็ดละ ๐.๒ กรัม

สรรพคุณ แก้ตัวร้อน ลดลายน้ำดอกไม้เทศ

แก้ท้องเสื้ืน ปวดท้อง ลดลายน้ำใบกะเพราดัน

แก้อิ ขับเสมหะ ลดลายน้ำลูกมะวงศ์เครือ หรือลูกมะวงศ์ดัน

ภาวดคอก

แก้ปากเป็นแผล แก้ลักษอง ลดลายน้ำลูกเบญจกานີຝານີຝາກปาก
ขนาดรับประทาน

ใช้ภาวดคอกวันละ ๑ ครั้ง หลังจากนั้นรับประทานทุก ๓ ชั่วโมง

เด็กอายุ ๑-๖ เดือน ครั้งละ ๒ เม็ด

เด็กอายุ ๗-๑๒ เดือน ครั้งละ ๓ เม็ด

ขนาดบรรจุ ๑๒ เม็ด

(๕) ยามันพชาตุ

วัดถูกส่วนประกอบ โกรูสอ โกรูเงนา โกรูหัวบัว โกรูเชียง โกรูขุพาลัมพา
เทียนคำ เทียนแดง เทียนขาว เทียนข้าวเปลือก เทียนตาตึกแตน รากไคร้เครือ

ลูกผักชีสีล้ม ลูกผักชีด้า การบูร กระเทียม เปลือกสมุนไพร เปลือกโนกมัน
จันทน์แดง จันทร์เทศ กานพลู ตีปีtie รากชาพู เถาสะค้าน รากเจดูคลเพลิงแดง
พริกไทยล่อน ลูกจันทน์ หนักสิ่งละ ๑ ส่วน ขิง ลูกเมญูกานี หนักสิ่งละ ๑ ส่วน
วิธีทำ บดเป็นผง

สารพุณ แก้ชาดูไม่ปกติ แก้ท้องเสื้นท้องเฟ้อ
ขนาดรับประทาน รับประทาน วันละ ๓ ครั้ง ก่อนอาหาร

ผู้ใหญ่ ครั้งละ ๑ ช้อนชา ละลายน้ำสุก
เด็ก ครั้งละ ๑/๒ ช้อนชา ละลายน้ำสุก
ขนาดบรรจุ ๑๕ กรัม

(๖) ยาประสารเจตพังคี

วัตถุส่วนประกอบ ดอกจันทน์ ลูกจันทน์ ลูกกระวน ในกระวน
กานพลู กรุงเขมา รากไคร้เครื่อ การบูร ลูกสมอทะเด พญากระขาว เปลือกหว้า
เกลือสินเชาว์ หนักสิ่งละ ๑ ส่วน พริกไทยล่อน บอร์เพ็ด หนักสิ่งละ ๒ ส่วน
ข่า หนัก ๑๖ ส่วน ระย่อง หนัก ๒ ส่วน เจตพังคี หนัก ๓๕ ส่วน

วิธีทำ บดเป็นผง

สารพุณ แก้ก้มยุกเสียด
ขนาดรับประทาน รับประทานเช้าและเย็น ก่อนอาหาร
ครั้งละ ๑ ช้อนชา ละลายน้ำสุก
ขนาดบรรจุ ๑๕ กรัม

(๗) ยามหาจักรไหญ่

วัดคุส่วนประกอบ โกรูสอ โกรูเมนา โกรูพุงปลา โกรูกันพร้าว
โกรูกระดูก เทียนคำ เทียนแดง เทียนขาว เทียนข้าวเปลือก เทียนเยาวพาณี
สมอไทย (เจาแต่เนื้อ) สมอพิเกก (เจาแต่เนื้อ) มะขามป้อม (เจาแต่เนื้อ)
ลูกจันทน์ ดอกจันทน์ ลูกกระวน กานพลู ชะเอมเทศ เม็ดหะร่าพา ลูกผักชีลา
สารส้ม นมันอ้อย หัวกระเทียม หนักสิ่งละ ๑ ส่วน ยาคำสะตุ หนัก ๔ ส่วน
ใบกระพังโภນ หนัก ๓๐ ส่วน

วิธีทำ บดเป็นผง ทำเป็นเม็ด หนักเม็ดละ ๐.๕ กรัม

สรรพคุณ แก้ลมthroat แก้อาการท้องอืด ห้องเพื่อ

ขนาดรับประทาน เด็กอายุต่ำกว่า ๕ ขวบ รับประทานครั้งละ ๑ - ๓

เม็ด

เพิ่มและลดได้ตามส่วน รับประทานกับน้ำสุกค่อนอาหารเช้า - เย็น
ขนาดบรรจุ ๑๐ เม็ด

(๙) ยาตรีหอม

วัดคุส่วนประกอบ เนื้อลูกสมอเทศ เนื้อลูกสมอพิเกก เนื้อลูกมะขาม
ป้อม ลูกผักชีลา หนักสิ่งละ ๔ ส่วน รากไคร้เครือ โกรูสอ ชะเอมเทศ ลูกชัดคั่ว
หนักสิ่งละ ๑ ส่วน เนื้อลูกสมอไทย โกรูน้ำเต้าใหญ่นึ่งสุก หนักสิ่งละ ๒๒ ส่วน
วิธีทำ บดเป็นผง ทำเป็นเม็ด หนักเม็ดละ ๐.๒ กรัม

สรรพคุณ แก้เด็กท้องผูก ระบบย่อยไข้

ขนาดรับประทาน รับประทานก่อนอาหารเช้า

เด็กอายุ ๑-๒ เดือน ครั้งละ ๒-๓ เม็ด

เด็กอายุ ๓-๕ เดือน ครั้งละ ๕-๘ เม็ด

เด็กอายุ ๖-๑๒ เดือน ครั้งละ ๖-๘ เม็ด

ขนาดบรรจุ ๓๐ เม็ด

(๕) ยาธารณีสันทะชาต

วัตถุส่วนประกอบ ลูกจันทน์ ดอกจันทน์ ลูกกระวน การพู
เทียนคำ เทียนขาว หัวดองดึง หัวบุก หัวกลอย หัวกระดาดขาว หัวกระดาดแดง
ลูกเรื่อง จิง ชะเอมเทศ รากเจตมูลเพลิงแดง โกรูกระดูก โกรูเขมา โกรูน้ำเต้า
หนักสิ่งละ ๑ ส่วน ผักแพวแดง เนื้อลูกมะขามป้อม หนักสิ่งละ ๒ ส่วน
เนื้อลูกสมอไทย มหาหิงคุ์ การบูร หนักสิ่งละ ๖ ส่วน รงทอง (ประสะแล้ว)
หนัก ๔ ส่วน ยาคำ หนัก ๒๐ ส่วน พริกไทยล่อน หนัก ๕๖ ส่วน

วิธีทำ บดเป็นผง

สารพคุณ แก้กษัยเส้น เคadaan ท้องผูก

ขนาดรับประทาน รับประทาน วันละ ๑ ครั้ง ก่อนอาหารเช้าหรือก่อนนอน

ครั้งละ ๑-๑ ช้อนชา ละลายน้ำสุก หรือผสม

น้ำผึ้งปั้นเป็นลูกกลอน

คำเตือน คนเป็นไข้ หรือสตรีมีครรภ์ ห้ามรับประทาน

ขนาดบรรจุ ๑๕ กรัม

(๖) ยาถ่าย

วัตถุส่วนประกอบใบมะกา ใบมะขาม ใบส้มปออย หญ้าไทร ใบไผ่ป่า
ผักคุณ รากขี้ก้าแดง รากขี้ก้าขาว รากดองಡอก เก้าลักษณะย หัวหอน ผักส้มปออย
สมอไทย สมอดึง หนักสิ่งละ ๑ ส่วน ขี้เหล็กหั้ง ๕ หนัก ๑ ส่วน ยาคำหนัก ๔ ส่วน
ดีเกลือฟรัง หนัก ๒๐ ส่วน

วิธีทำ บดเป็นผง ทำเป็นเม็ด หนักเม็ดละ ๐.๕ กรัม

สรรพคุณ แก้ท้องผูก

ขนาดรับประทาน รับประทาน วันละ ๑ ครั้ง ก่อนนอน ครั้งละ
๒-๕ เม็ด ตามชาดุหนักชาดูเบา

ขนาดบรรจุ ๑๐ เม็ด

(๑) ยาเหลืองปิดสมุทร

วัตถุส่วนประกอบ แพ้วหมู ขมิ้นอ้อย เปลือกเพกา รากกล้วยตีบ
กระเทียมคั่ว ดีปลี ชันย้อย ครั้ง สีเสียดเทศ สีเสียดไทย ในเทียน ใบทับทิม
หนักสิ่งละ ๖ ส่วน ขมิ้นชัน หนัก ๖ ส่วน

วิธีทำ บดเป็นผง ทำเป็นเม็ด หนักเม็ดละ ๐.๓ กรัม

สรรพคุณ แก้ท้องเสีย ใช้น้ำเปลือกกลุกทับทิมหรือเปลือกแคนดี้กับ
น้ำปูนใสเป็นกระสาย ถ้าหาน้ำกระสายไม่ได้ให้ใช้น้ำสุกแทน และให้รับประทาน
ร่วมกับน้ำคละลายเกลือแกงด้วย

ขนาดรับประทาน รับประทานวันละ ๓ เวลา ก่อนอาหาร

ผู้ใหญ่ ครั้งละ ๑๐ เม็ด

ขนาดบรรจุ ๓๐ เม็ด

(๒) ยาชาตุบรรจบ

วัตถุส่วนประกอบ จิง โกรูเเขม โกรูพุงปลา โกรูเชียง โกรูสอ
เทียนคำ เทียนขาว เทียนสัตตบุญย์ เทียนเยาวพาณี เทียนแดง ลูกจันทน์
ดอกจันทน์ กานพู การบูร เปลือกสมุลแวง ลูกกระวน ลูกผักชีลา ในพิมเสน
รากไครเครื่อ ดีปลี กระหอม หนักสิ่งละ ๕ ส่วน โกรูก้านพร้าว หนัก ๘ ส่วน
เนื้อลูกสมอไทย หนัก ๑๖ ส่วน

หน้า ๔๕

เล่ม ๑๖๖ ตอนที่ ๖๓ ง

ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๒

วิธีทำ บดเป็นผง

สรรพคุณ แก้ชาตุไม่ปกติ ท้องเสีย ใช้เปลือกแคหรือเปลือกสะเดา
หรือเปลือกถุงทับทิมต้มกับน้ำปูนใส

แก้ท้องขึ้น ท้องเฟ้อ ใช้กระเทียน ๗ ก้อน ทุบชงน้ำร้อน
หรือใช้ใบกะเพราดันเป็นกระสาย ถ้าหาน้ำกระสายไม่ได้ ให้ใช้น้ำสุกแทน

ขนาดรับประทาน รับประทานวันละ ๓ เวลา ก่อนอาหาร

ผู้ใหญ่ ครั้งละ ๑ ช้อนชา

เด็ก ครั้งละ ๑ ช้อนชา

ขนาดบรรจุ ๑๕ กรัม

(๓) ยาจันทน์ลีลา

วัตถุส่วนประกอบ โกฐสอ โกฐเขม่า โกฐชาลัมพา จันทน์เทศ
จันทน์แดง ถูกกระดอน บอะระเพ็ด รากปลาไหลเพือก หนักสิ่งละ ๔ ส่วน พิมเสน
หนัก ๑ ส่วน

วิธีทำ ชนิดผง บดเป็นผง

ชนิดเม็ด บดเป็นผง ทำเป็นเม็ด หนักเม็ดละ ๐.๕ กรัม

สรรพคุณ แก้ไข้ แก้ตัวร้อน

ขนาดรับประทาน รับประทานทุก ๔ ชั่วโมง

ชนิดผง เด็ก ครั้งละ ๑-๑ ช้อนชา

ผู้ใหญ่ ครั้งละ ๑-๒ ช้อนชา

ชนิดเม็ด เด็ก ครั้งละ ๑-๒ เม็ด

ผู้ใหญ่ ครั้งละ ๓-๔ เม็ด

ພະນາດບຽງ ຂົນດັວງ ອຸດ ກຣຳ

ຂົນດີເມືດ ຕົວ ເມືດ

(ໜ) ຍາປະສະຈັນທັນແດງ

ວັດຖຸສ່ວນປະກອນ ຮາກເໜີອົດຄນ ຮາກນະປ່າງຫວານ ຮາກນະນາວ
ປະຫອນ ໂກງູ້ຫັ້ວນ້ວາ ຈັນທັນເທັສ ຝຳເສັນ ມັກສິ່ງລະ ۴ ສ່ວນ ເກສຣນັວ່າລວງ
ດອກບຸນນາກ ດອກສາຮັກ ດອກມະລີ ມັກສິ່ງລະ ۱ ສ່ວນ ຈັນທັນແດງ ມັກ ຕົກ ສ່ວນ

ວິທີທຳ ບດເປັນຜົງ

ສරັບຄຸນ ແກ້ໄຂຕົວຮອນ ກະຫຍານນ້ຳ ລະລາຍນ້ຳສຸກຫຼືອນ້ຳດອກມະລີ
ພະນາດຮັບປະທານ ຮັບປະທານທຸກ ۳ ທັ້ງໂມງ

ຜູ້ໃຫຍ່ ຄົງລະ ۱ ຊັນໜາ

ເດືອກ ຄົງລະ ۱ ຊັນໜາ

ພະນາດບຽງ ອຸດ ກຣຳ

(ໜ) ຍາເຂົ້າຫອມ

ວັດຖຸສ່ວນປະກອນ ໃບພິມເສັນ ໃບຜັກຮະໂຄນ ໃບໝາກຜູ້ ໃບໝາກເນີຍ
ໃບສັນພັກຫອມ ຮາກແຟກຫອມ ເປົ້າຫອມ ຈັນທັນເທັສ ຈັນທັນແດງ ວ່ານກົບແຮດ
ວ່ານວ່ອນທອງ ເນະພູສີ ພິຍາສັນ ມາຫາສຳ ຮາກໄກຮ້າເຄື່ອ ດອກພິຄຸດ ເກສຣນັວ່າລວງ
ເກສຣສາຮັກ ເກສຣນັວ່າລວງ ມັກສິ່ງລະ ۱ ສ່ວນ

ວິທີທຳ ບດເປັນຜົງ

ສරັບຄຸນ ແກ້ຕົວຮອນ ຮັນໃນ ກະຫຍານນ້ຳ ລະລາຍນ້ຳສຸກ ຫຼືອນ້ຳ
ດອກມະລີ

ເລີ່ມ ເອັນທີ ໬ຕ ກ

ราชกิจຈານເມກນາ

๒๕ ຕຶງຫາຄມ ແກສະກິ

ແກ້ພິຍ້ອດ ພິຍສຸກໄສ ລະລາຍໜ້າຮາກຜັກຊື້ຕົ້ນ ທັງຮັບປະການ
ແລະຂະໂໄມ

ຂນາດຮັບປະການ ຮັບປະການວັນລະ ៥-໬ ຄຣັງ

ຜູ້ໃຫຍ່ ຄຣັງລະ ១ ຊັ້ນໜາ

ເຕີກ ຄຣັງລະ ១ ຊັ້ນໜາ
២

ຂນາດປຽບຈຸ ៣០ ກຣັມ

(៦) ຍາມຫານິລແທ່ງທອງ

ວັດຖຸສ່ວນປະກອບ ເນື້ອໃນເມືດສະບັນອຸ່ນສຸນ ມາຍຕະຄ້າສຸນ
ເມືດນະກອກສຸນ ລູກນະຄຳດີຄວາຍສຸນ ຕ່ານໄຟສັກ ຈັນທີແດງ ຈັນທີເທິດ ໃບພິມເສັນ
ໃນໜັງໝາງ ມີກອນ ມັກສິ່ງລະ ១ ສ່ວນ ເນື້ອຈົ້ນຄ້ວ່າໄຫ້ເລື້ອງ ៣ ເນື້ອ

ວິທີທຳ ບດເປັນຜົງ ທຳເປັນເມືດ ປິດທອງຄຳເປົ່າ ມັກເມືດລະ ០.៥ ກຣັມ

ສຽງພຸດ ແກ້ໄຂ ແກ້ກະຮາຍໜ້າ ແກ້ຫັດ ອືສຸກອື່ສ

ຂນາດຮັບປະການ ຮັບປະການ ວັນລະ ២ ຄຣັງ

ຜູ້ໃຫຍ່ ຄຣັງລະ ៣-៥ ເມືດ

ເຕີກ ຄຣັງລະ ១-២ ເມືດ

ຂນາດປຽບຈຸ ៣០ ເມືດ

(៧) ຍາຫອນເທິຈົກ

ວັດຖຸສ່ວນປະກອບ ລູກຈັນທີ ດອກຈັນທີ ລູກກະວານ ການພຸດ
ຈັນທີແດງ ຈັນທີໆຂາວ ກຸມໝາ ກະລຳພັກ ຂອນດອກ ຊະຄູດ ອົບເໜຍ ເປະກອນ
ແກກອນ ມັກສິ່ງລະ ២ ສ່ວນ ພິວນະກູດ ພິວນະໜ້ວ ພິວນະນາວ ພິວສັນຕະຮັງກະນູ
ພິວສັນຈິນ ພິວສັນໂອ ພິວສັນເຈີຍຫວານ ມັກສິ່ງລະ ៥ ສ່ວນ ພິວສັນຫ້ ມັກ ៤៥ ສ່ວນ

ดอกพิกุล ดอกบุนนาค ดอกสารี เกสรบัวหลวง ดอกบัวขม ดอกบัวเพื่อน
หนักสิ่งละ ๔ ส่วน การบูร หนัก ๑ ส่วน โกรสอ โกรสเนมา โกรหัวบัว โกรเชียง
โกรจุพาลัมพา โกรกระดูก โกรก้านพร้าว โกรพุงปลา โกรชฎามังสี หนักสิ่งละ
๔ ส่วน เทียนคำ เทียนแดง เทียนขาว เทียนข้าวเปลือก เทียนตาตึกแทน
เทียนเยาวพาณี เทียนสัตตบุญย์ เทียนเกล็ดหอย เทียนดาikon หนักสิ่งละ ๔ ส่วน
พิมเสน หนัก ๔ ส่วน ดอกมะตี หนัก ๘๙ ส่วน

วิธีทำ บดเป็นผง ผสมน้ำดอกไม้เทศ ทำเป็นเม็ด หนักเม็ดละ
๐.๒ กรัม

สรรพคุณ แก้ลม บำรุงหัวใจ

ขนาดรับประทาน ครั้งละ ๕-๗ เม็ด

ขนาดบรรจุ ๓๐ เม็ด

(๑๙) ยาหอมทิพโยสก

วัตถุส่วนประกอบ ดอกพิกุล ดอกบุนนาค ดอกสารี ดอกมะตี
เกสรบัวหลวง ดอกกระดังงา ดอกจำปา ดอกบัวงกลนี หัวแห้วไทย กระজับ
ฝาง จันทน์แดง จันทน์ขาว จันทร์เทศ กฤษณา ชะลุด อบเชย สมุกแวง สนเทศ
ว่าน้ำ กระชาย เปราะหอม ดอกคำไท ชะเอมเทศ สุรามฤต ข่าตัน ลูกจันทน์
ดอกจันทน์ หนักสิ่งละ ๔ ส่วน โกรสอ โกรสเนมา โกรหัวบัว โกรเชียง โกรจุพาลัมพา
โกรกระดูก โกรก้านพร้าว โกรพุงปลา โกรชฎามังสี หนักสิ่งละ ๒ ส่วน เทียนคำ
เทียนแดง เทียนขาว เทียนข้าวเปลือก เทียนตาตึกแทน เทียนเยาวพาณี เทียน
สัตตบุญย์ เทียนเกล็ดหอย เทียนดาikon การบูร หนักสิ่งละ ๑ ส่วน พิมเสน
หนัก ๒ ส่วน

วิธีทำ ชนิดผง บดเป็นผง

ชนิดเม็ด บดเป็นผง ทำเป็นเม็ด หนักเม็ดละ ๐.๒ กรัม
สรรพคุณ แก้ค้ม วิงเวียน ละลายน้ำดอกรไม้หรือน้ำสูก
ขนาดรับประทาน

ชนิดผง ครั้งละ ๑-๓ ช้อนชา

ชนิดเม็ด ครั้งละ ๕-๗ เม็ด

ขนาดบรรจุ ชนิดผง ๑๕ กรัม

ชนิดเม็ด ๓๐ เม็ด

(๑๕) ยาหกนอินทั้ก

วัดคุส่วนประกอน สะค้าน راكษาพุ จัง ดีปีติ รากเจตมูลเพลิงแดง
ลูกผักชีลา โกรูสอ โกรูเขมา โกรูก้านพร้าว โกรูพุงปลา โกรูขุพัลลัมพา โกรูเชียง
โกรูกักกรา โกรูน้ำเด้า โกรูกระดูก เทียนคำ เทียนขาว เทียนแดง เทียนขาวเปลือก
เทียนเยาวพาณี จันทน์แดง จันทน์เทศ เตาม梧แดง เถาม梧ขาว รากหญ้านาง
เปลือกชะฐุด อบเชย เปลือกสมุลแวง กฤษณา กระลำพัก บอระเพ็ด ลูกกระดอม
กำยาน ขอนดอก ลูกจันทน์ ดอกจันทน์ ลูกกระวน กาลพุ รากไคร้เครือ ลำพันแดง
ดอกสารกี ดอกพิกุล ดอกบุนนาค ดอกจำปา ดอกกระดังงา ดอกมะลิ ดอกคำไทย
ฝางเสน ศิริ พิมเสน สิงละ ๗ ส่วน

วิธีทำ ชนิดผง บดเป็นผง

ชนิดเม็ด บดเป็นผง ทำเป็นเม็ด หนักเม็ดละ
๐.๒ กรัม

สรรพคุณ แก้ค้มบาดทะจิต ใช้น้ำดอกรมะลิ

แก้คดีลี่นเหียนอาเจียน ใช้น้ำลูกผักชี เทียนดำต้ม
ถ้าไม่มีใช้น้ำสุก

แก้คดีลี่นเหียนอาเจียน ใช้น้ำจิ่งต้ม

ขนาดรับประทาน รับประทานทุก ๓ ชั่วโมง

ชนิดผง ครั้งละ $\frac{1}{2}$ -๑ ช้อนชา

ชนิดเม็ด ครั้งละ ๕ - ๑๐ เม็ด

ขนาดบรรจุ ชนิดผง ๑๕ กรัม

ชนิดเม็ด ๓๐ เม็ด

(๒๐) ยาหอมนวโกรู

วัตถุส่วนประกอบ ขิงแห้ง ดีปีชี เจตมูลเพลิงแดง สะค้าน ชี้พูล
หนักสิ่งละ ๓ ส่วน แห้วหมู โกรูสอ โกรูเขมา โกรูหัวบัว โกรูเชียง โกรูจุพามัมพา
โกรูกระดูก โกรูก้านพร้าว โกรูพุงปลา โกรูชვานมังสี เทียนดำ เทียนแดง เทียนขาว
เทียนขาวเปลือก เทียนดาด้วยตน เทียนเยาวพาณี เทียนสัตตบุญย์ เทียนเกลิดหอย
เทียนตากบ สักชี ลูกราชดัด ลูกสารพัดพิษ ลูกกระวน การพฐุ ดอกจันทน์ ลูกจันทน์
จันทน์เทศ จันทน์แดง อบเชยญวน เปลือกสมุลด้วง หลั่าตินนก แฟกหอน
เปลือกชะลุด เปราะหอน รากไคร้เครื่อ เนื้อไม้ ขอนคอ กะลำพัก เนื้อลูกมะนาวป้อม
เนื้อลูกสมอพิเกก ชะเอมเทศ ลูกผักชีคล้า ลูกกระดอน บอะระเพ็ด เกสรน้ำหลวง
เกสรบุนนาค ดอกพิกุล ดอกสารกี ดอกมะลิ แก่นสน หนักสิ่งละ ๔ ส่วน พิมเสน
หนัก ๑ ส่วน

วิธีทำ

ชนิดผง บดเป็นผง

ชนิดเม็ด บดเป็นผง ทำเป็นเม็ด หนักเม็ดละ ๐.๑

กรัม

สรรพคุณ แก้ลมคลื่นเหียน อาเจียน ใช้น้ำอุอกผักชี เทียนดำดัน

แก้ลมปลายไข้ ใช้ก้านสะเดา อุกระดอม และบอระเพ็ด

ต้มเอาน้ำ ถ้าหาน้ำกระษายไม่ได้ ใช้น้ำสูกแทน

ขนาดรับประทาน รับประทานทุก ๓ ชั่วโมง

ชนิดผง ครั้งละ $\frac{1}{3}$ - ๑ ช้อนชา

ชนิดเม็ด ครั้งละ $\frac{1}{2}$ - ๑๐ เม็ด

ขนาดบรรจุ ชนิดผง ๑๕ กรัม

ชนิดเม็ด ๓๐ เม็ด

(๒๑) ยาอ่านฤทธิ์

วัตถุส่วนประกอบ รากไคร้เครือ โภชพุงปลา เทียนขาว อุกผักชีลา
เนื้ออุกมะนามป้อม เนื้ออุกสมอพิเกก หนักสิ่งละ ๑ ส่วน ชะเอมเทศ หนัก ๕๓ ส่วน

วิธีทำ บดเป็นผง

สรรพคุณ แก้อ้อ ขับเสมหะ ลดลายน้ำมันน้ำแทรกเกลือ ใช้จับ
หรือกดกด

ขนาดที่ใช้

ผู้ใหญ่ ครั้งละ ๑ ช้อนชา

เด็ก ลดลงตามส่วน

ขนาดบรรจุ ๑๕ กรัม

(๒๒) ยาประสะมะแวง

วัตถุส่วนประกอบ สารส้ม หนัก ๑ ส่วน ขมีน้อออย หนัก ๓ ส่วน
ใบสาด ใบตานหม่อน ใบกะเพรา หนักสิ่งละ ๔ ส่วน ลูกมะแวงตัน ลูกมะแวงเครือ
หนักสิ่งละ ๘ ส่วน

วิธีทำ บดเป็นผง ผสมน้ำสุกแทรกพิมเสนพอควร ทำเป็นเม็ด
หนักเม็ดละ ๐.๒ กรัม

สรรพคุณ แก้ไอ แก้เสมหะ ลดลายน้ำมันนาวแทรกเกลือรับประทาน
หรือใช้ช้อน

ขนาดรับประทาน

เด็ก ครั้งละ ๑ - ๒ เม็ด

ผู้ใหญ่ ครั้งละ ๕ - ๗ เม็ด

ขนาดบรรจุ ๓๐ เม็ด

(๒๓) ยานำรุงโลหิต

วัตถุส่วนประกอบ ขิงแห้ง ดีปลี เจตมูลเพลิงแดง สะค้าน ช้าพัญ
ขมีนเครือ เตานากแดง กำลังวัวเคลิง ดอกสารกี ดอกพิกุล ดอกบุนนาค เกสร
บัวหลวง หนักสิ่งละ ๒ ส่วน ดอกจันทน์ ลูกจันทน์ ลูกกระวน กานพตู เทียนดำเน
เทียนแดง เทียนขาว เทียนข้าวเปลือก เทียนตาตี้กั้นแนน โกรูสอ โกรูเขมา โกรูหัวนัว
โกรูเชียง โกรูชาลันพา เนื้อลูกสมอไทย เนื้อลูกสมอดึง เนื้อลูกสมอพิกา
เปลือกชะลุด เปลือกอบเชยเทศ จันทน์แดง แก่นแสมสาร แก่นแสมทะเล กฤษณา
หนักสิ่งละ ๑ ส่วน ครั้ง หนัก ๙ ส่วน ฝางดอกคำไทย หนักสิ่งละ ๑๐ ส่วน

วิธีทำ บดเป็นผง

สารพคุณ บำรุงโลหิต

ขนาดรับประทาน รับประทาน วันละ ๒ ครั้ง เช้า - เย็น ก่อนอาหาร

ครั้งละ ๑ ช้อนชา ละลายน้ำสุก

ขนาดบรรจุ ๑๕ กรัม

(๒๔) ยาปะระสะไพล

วัตถุส่วนประกอบ ผิวนะกรูด ว่านน้ำ กระเทียม หัวหอม พริกไทย
ดีปี๊ จิง ขมีนอ้อย เทียนคำ เกลือสินเชาว์ หนักสิ่งละ ๘ ส่วน การบูร หนัก ๑ ส่วน
ไพล หนัก ๘๐ ส่วน

วิธีทำ บดเป็นผง

สารพคุณ แก้จุกเสียด แก้รำดูไม่ปกติ ขับน้ำคาวปลา

ขนาดรับประทาน รับประทาน วันละ ๓ ครั้ง ก่อนอาหาร

ครั้งละ ๑ ช้อนชา ละลายน้ำสุก หรือน้ำสุรา

ขนาดบรรจุ ๓๐ กรัม

(๒๕) ยาไฟประลัยกัลปี

วัตถุส่วนประกอบ พริกไทยล่อน จิง ดีปี๊ กระเทียม หนักสิ่งละ
๔ ส่วน ขมีนอ้อย กะทิอ ขา ไพล เปลือกมะรุม หนักสิ่งละ ๕ ส่วน รากเจตมูล
เพลิงแดง สารส้ม แก่นแสมทะเล การบูร ผิวนะกรูด หนักสิ่งละ ๖ ส่วน

วิธีทำ บดเป็นผง

สารพคุณ ขับน้ำคาวปลาในเรือนไฟ ช่วยให้มดลูกเข้าอู่

ขนาดรับประทาน รับประทาน วันละ ๓ ครั้ง ก่อนอาหาร

គົງລະ ១ ຂ້ອນໜາ ລະລາຍນ້ຳສຸກ ທີ່ອນ້ຳສຸງ

խາດບຣຸ ១៥ ກຣັນ

(២៦) ຍາໄຟຫ້າກອງ

ວັດຖຸສ່ວນປະກອນ ຮາກເຈດມູລເພີ້ງແຕງ ຈິງ ພົກໄທຢລ່ອນ ສາຮສັນ
ຝັກສັນປ້ອຍ ມັກສິ່ງລະ ១ ສ່ວນ

ວິທີທຳ ບດເປັນຜົງ

ສຽງຄຸມ ຂັບນ້ຳຄວາມປລາໃນເຮືອນໄຟ ຂ່າຍໃຫ້ມີຄູກເຂົ້າງໆ

խາດຮັບປະການ ຮັບປະການ ວັນລະ ៣ ກວັງ ກ່ອນອາຫານ

គົງລະ ១ ຂ້ອນໜາ ລະລາຍນ້ຳສຸກ ທີ່ອນ້ຳສຸງ

խາດບຣຸ ១៥ ກຣັນ

(២៧) ຍາປະສະເປດໄຫຍ່

ວັດຖຸສ່ວນປະກອນ ໂກງູສອ ໂກງູເບນາ ໂກງູຫວັນວ ໂກງູເຊີຍ ໂກງູພາ
ລັນພາ ເທີນດຳ ເທີນແດງ ເທີນຂາວ ເທີນຫ້າວເປີລືອກ ເທີນຕາຕິກແຕນ ລູກຈັນທິນ
ດອກຈັນທິນ ລູກຮະວານ ການພູ້ ຈັນທິນເທີສ ຈັນທິນແດງ ດອກບຸນນາດ ດອກສາຮກີ
ດອກພິກຸລ ເກສຣບັວຫລວງ ມັກສິ່ງລະ ១ ສ່ວນ ເປະກອນ ມັກ ២០ ສ່ວນ

ວິທີທຳ ບດເປັນຜົງ

ສຽງຄຸມ ດອນພິຍໄໝຕານທຽງສໍາຫັບເດືອກ ລະລາຍນ້ຳດອກໄມ້ເທີສ

ທີ່ອນ້ຳສຸກ

ຮັບປະການ ທີ່ອີພສນ້ຳສຸງສຸມກະຮ່າມ່ອນ

խາດຮັບປະການ ຮັບປະການທຸກ ៣ ຊ້ວນໂມງ

គົງລະ ១ - ១ ຂ້ອນໜາ

խາດບຣຸ ១៥ ກຣັນ

ข้อ ๕ ยาสามัญประจำบ้านตามประกาศนี้ต้องแสดงข้อความดังต่อไปนี้

๔.๑ ชื่อยาตามที่ระบุในประกาศ ในกรณีเป็นตำรับยาที่มีการกำหนดชื่อยาไว้ในประกาศฉบับนี้

กรณีมีชื่อทางการค้า ให้แสดงชื่อยาตามประกาศควบคู่กับชื่อทางการค้าด้วย

๔.๒ คำว่า “ยาสามัญประจำบ้าน” ในกรอบสีเขียวมีขนาดตัวอักษรที่สามารถอ่านได้ชัดเจน

๔.๓ คำว่า “ยาสื้นอายุ” และแสดงวันเดือนปีที่ยาสื้นอายุ

ให้ยาสามัญประจำบ้านตามประกาศฉบับนี้มีอายุการใช้ของยาได้ไม่เกิน ๒ ปี สำหรับยาน้ำ และไม่เกิน ๓ ปี สำหรับยารูปแบบอื่น เว้นแต่ยาใดที่มีหลักฐานชัดเจนแสดงว่ามีอายุการใช้มากกว่าที่กำหนด ให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีอำนาจขยายอายุการใช้ของยานิดนั้นได้เป็นเฉพาะราย

๔.๔ ข้อความอื่นตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๕๗ (๒) แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ แล้วแต่กรณี

ข้อ ๕ ยาสามัญประจำบ้านที่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยาไว้ก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นยาสามัญประจำบ้านต่อไปได้ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ

ข้อ ๖ ให้ผู้รับอนุญาตผลิตยาแผนโบราณที่ประสงค์จะผลิตตำรับยาสามัญประจำบ้านตามประกาศฉบับนี้ ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยา โดยต้องมีสูตรส่วนประกอบ วิธีทำ สรรพคุณ วิธีการใช้ และข้อความคำเตือน ตามประกาศฉบับนี้ หรือตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอนุมัติโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการยา เมื่อได้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยาแล้ว จึงจะผลิตยานั้นได้

ข้อ ๓ ให้ผู้รับอนุญาตผลิตยาแผนโบราณที่มีคำรับยาตามประกาศฉบับนี้ และได้เขียนทะเบียนคำรับยาไว้ก่อนที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับที่ประسังค์จะให้คำรับยานั้นเป็นยาสามัญประจำบ้านโดยไม่ต้องขอเขียนทะเบียนคำรับยาใหม่ ขอแก้ไขรายการทะเบียนคำรับยา ภายในกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่ว่าประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ

ข้อ ๔ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒

กร ทพพะวงศ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข