

## ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง ยาอันตราย

ฉบับที่ ๔

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖ (๓) แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยคำแนะนำของคณะกรรมการยา ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ให้ยกเลิกความใน (๔) และ (๕) ของข้อ ๓ แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาอันตราย ฉบับลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๒๑ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“(๔) ยาจำพวกแก้ไอ (Antitussive drugs) ยกเว้น

ก. ที่ใช้สำหรับขับเสมหะ (Expectorants)

ข. เดกซ์โทรเมทอร์แฟน ไฮโดรโบรไมด์ (Dextromethorphan hydrobromide) ขนาด ๑.๕ มิลลิกรัม ที่ผลิตขึ้นเป็นยาบรรจุเสร็จชนิดเม็ด

(๕) ยาจำพวกแอดรีเนอร์จิก (Adrenergic drugs) ยกเว้น

ก. ที่ใช้สำหรับหยุดจุก ตามคำรายนายกรัฐมนตรีประกาศ

ข. ฟีนิลโพรปานอลามีน ไฮโดรคลอไรด์ (Phenylpropanolamine hydrochloride) ขนาด ๑๒.๕-๒๕ มิลลิกรัม ผสมกับพาราเซตามอล (Paracetamol) ขนาด ๓๐๐-๕๐๐ มิลลิกรัม และคลอร์เฟนิรามีน มาลีเอต

(Chlorpheniramine maleate) ขนาด ๑-๒ มิลลิกรัม ที่ผลิตขึ้นเป็นยาบรรจุ  
เสร็จชนิดเม็ด

ก. เอฟีดรีน ไฮโดรคลอไรด์ (Ephedrine hydrochloride)  
ขนาด ๑๕-๕๐ มิลลิกรัม ผสมกับทีโอฟีลลีน แอนไฮดรัส (Theophylline  
anhydrous) ขนาด ๖๐-๑๕๐ มิลลิกรัม ที่ผลิตขึ้นเป็นยาบรรจุเสร็จชนิดเม็ด”

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความใน (๑๕) ของข้อ ๓ แห่งประกาศกระทรวง  
สาธารณสุข เรื่อง ยาอันตราย ฉบับลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๒๑ และให้ใช้  
ข้อความต่อไปนี้แทน

“(๑๕) ยาจำพวกขับปัสสาวะ (Diuretic drugs) ยกเว้น

ก. ยาขับปัสสาวะจำพวกออสโมติก (Osmotic diuretic  
drugs)

ข. อุวาเออร์ซี (Uva Ursi)

ค. บุษู (Buchu)

ง. ไฮโดรคลอโรไทอะไซด์ (Hydrochlorothiazide) ขนาด  
๕๐ มิลลิกรัม ที่ผลิตขึ้นเป็นยาบรรจุเสร็จชนิดเม็ด”

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความใน (๒๓) ของข้อ ๓ แห่งประกาศกระทรวง  
สาธารณสุข เรื่อง ยาอันตราย ฉบับลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๒๑ และให้ใช้  
ข้อความต่อไปนี้แทน

“(๒๓) ยาจำพวกฮอร์โมนของรังไข่ (Ovarian hormones) ที่ได้จาก  
ธรรมชาติหรือที่ได้จากการสังเคราะห์ ยกเว้น

ก. เอthinylestradiol (Ethinylestradiol) ขนาด ๐.๐๓-๐.๐๕ มิลลิกรัม ผสมกับนอร์เจสตริล (Norgestrel) ขนาด ๐.๐-๒.๕ มิลลิกรัม เลvonorgestrel (Levonorgestrel) ขนาด ๐.๑๒๕-๐.๒๕ มิลลิกรัม นอร์เอthisเตอโรน (Norethisterone) ขนาด ๐.๐-๒.๕ มิลลิกรัม นอร์เอthisเตอโรนอะซีเตต (Norethisterone acetate) ขนาด ๐.๐-๒.๕ มิลลิกรัม หรือ ไลเนสตรีนอล (Lynestrenol) ขนาด ๐.๐-๒.๕ มิลลิกรัม ที่ผลิตขึ้นเป็นยาบรรจุเสร็จชนิดเม็ด

ข. เมสตรานอล (Mestranol) ขนาด ๐.๐๓-๐.๐๕ มิลลิกรัม ผสมกับนอร์เจสตริล (Norgestrel) ขนาด ๐.๐-๒.๕ มิลลิกรัม เลvonorgestrel (Levonorgestrel) ขนาด ๐.๑๒๕-๐.๒๕ มิลลิกรัม นอร์เอthisเตอโรน (Norethisterone) ขนาด ๐.๐-๒.๕ มิลลิกรัม นอร์เอthisเตอโรนอะซีเตต (Norethisterone acetate) ขนาด ๐.๐-๒.๕ มิลลิกรัม หรือไลเนสตรีนอล (Lynestrenol) ขนาด ๐.๐-๒.๕ มิลลิกรัม ที่ผลิตขึ้นเป็นยาบรรจุเสร็จชนิดเม็ด”

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความใน (๓๒) และ (๓๓) ของข้อ ๓ แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ขาดันตราย ฉบับลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๒๐ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“(๓๒) ยาจำพวกฮิสตามีนและแอนติฮิสตามีน (Histamine and antihistamine drugs) ยกเว้น:

ก. ที่ใช้เฉพาะกับผิวหนัง

ข. ไดเมนไฮดริเนต (Dimenhydrinate) ขนาด ๕.๐ มิลลิกรัม ที่ผลิตขึ้นเป็นยาบรรจุเสร็จชนิดเม็ด

ก. คลอร์เฟนิรามีน มาเลเอต (Chlorpheniramine maleate)

ขนาด ๒ มิลลิกรัม ที่ผลิตขึ้นเป็นยาบรรจุกึ่งชนิดเม็ด

จ. คลอร์เฟนิรามีน มาเลเอต (Chlorpheniramine maleate)

ขนาด ๑-๒ มิลลิกรัม ผสมกับพาราเซตามอล (Paracetamol) ขนาด ๓๐๐-๕๐๐ มิลลิกรัม และฟีนลโพรปิโลลามีน ไฮโดรคลอไรด์ (Phenylpropanolamine hydrochloride) ขนาด ๑๒.๕-๒๕ มิลลิกรัม ที่ผลิตขึ้นเป็นยาบรรจุกึ่งชนิดเม็ด

(๓๓) ยาจำพวกแซนทีน (Xanthines) ยกเว้น

ก. แคลเฟอีน (Caffeine) ไม่เกิน ๑๐๐ มิลลิกรัม ต่อขนาดรับประทานหนึ่งมื้อ

ข. อะมีโนฟีลลีน (Aminophylline) ขนาด ๑๐๐ มิลลิกรัม ที่ผลิตขึ้นเป็นยาบรรจุกึ่งชนิดเม็ด

ค. ทีโอฟีลลีน แอนไฮดรัส (Theophylline anhydrous) ขนาด ๖๐ - ๑๕๐ มิลลิกรัม ผสมกับเอเฟดรีน ไฮโดรคลอไรด์ (Ephedrine hydrochloride) ขนาด ๑๕-๕๐ มิลลิกรัม ที่ผลิตขึ้นเป็นยาบรรจุกึ่งชนิดเม็ด”

ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความใน (๓๑) และ (๓๘) ของข้อ ๓ แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาอันตราย ฉบับลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๒๑ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“(๓๑) ยาจำพวกซัลโฟนาไมด์ (Sulfonamides) ยกเว้น

ก. ที่ประกาศเป็นยาควบคุมพิเศษ

ข. ที่ผลิตขึ้นเป็นยาบรรจุกึ่งชนิดเม็ดตามประกาศยาสามัญประจำบ้าน

ค. สำหรับใช้เฉพาะที่

ง. ทาลิซัลฟาโทอะโซล (Phthalylsulphathiazole) ขนาด ๕๐๐ มิลลิกรัม ที่ผลิตขึ้นเป็นยาบรรจุเสร็จชนิดเม็ด

จ. ซัลฟาเมโทกซาโซล (Sulphamethoxazole) ขนาด ๔๐๐ มิลลิกรัม ผสมกับไตรเมโทพริม (Trimethoprim) ขนาด ๘๐ มิลลิกรัม ที่ผลิตขึ้นเป็นยาบรรจุเสร็จชนิดเม็ดหรือแคปซูล

ฉ. ซัลฟาดอกซีน (Sulphadoxine) ขนาด ๕๐๐ มิลลิกรัม ผสมกับไพริเมทามีน (Pyrimethamine) ขนาด ๒๕ มิลลิกรัม ที่ผลิตขึ้นเป็นยาบรรจุเสร็จชนิดเม็ด

(๓๘) ยาจำพวกปฏิชีวนะ (Antibiotics) ยกเว้น

ก. สำหรับใช้เฉพาะที่ ทั้งนี้ไม่รวมถึงยาจำพวกเพนิซิลลิน

ข. เพนิซิลลิน วี โปแตสเซียม (Penicillin V Potassium) ที่ผลิตขึ้นเป็นยาบรรจุเสร็จชนิดทรายไซรัป (Dry Syrup) ชั่งในน้ำยา ๕ มิลลิกรัม มีเพนิซิลลิน วี (Penicillin V) ขนาด ๒๐๐,๐๐๐ ยูนิต

ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความใน (๔๒) ของข้อ ๓ แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาอันตราย ฉบับลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๒๑ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“(๔๒) ยาจำพวกป้องกันและรักษามาลาเรีย (Antimalarial drugs) ยกเว้น

ก. ที่ผลิตขึ้นเป็นยาบรรจุเสร็จตามประกาศยาสามัญประจำบ้าน

ข. ไพริเมทามีน (Pyrimethamine) ขนาด ๒๕ มิลลิกรัม ผสมกับซัลฟาดอกซีน (Sulphadoxine) ขนาด ๕๐๐ มิลลิกรัม ที่ผลิตขึ้นเป็นยาบรรจสุเสร็จชนิดเม็ด”

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความใน (๔๗) ของข้อ ๓ แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาอันตราย ฉบับลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๒๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาอันตราย ฉบับที่ ๓ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๒๕ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“(๔๗) ยาจำพวกรักษาโรคหนอนพยาธิ (Anthelmintic drugs) ยกเว้น

ก. ที่ผลิตขึ้นเป็นยาบรรจสุเสร็จตามประกาศยาสามัญประจำบ้าน

ข. เมเบนดาโซล (Mebendazole) ขนาด ๑๐๐ มิลลิกรัม หรือ ๕๐๐ มิลลิกรัม ที่ผลิตขึ้นเป็นยาบรรจสุเสร็จชนิดเม็ด”

ข้อ ๘ ให้ยกเลิกความใน (๔๘) ของข้อ ๓ แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาอันตราย ฉบับลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๒๑ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“(๔๘) ยาจำพวกแก้อาการคลื่นเหียนอาเจียน (Antinauseants, antiemetics and motion sickness control drugs) ยกเว้นไดเมนไฮดริเนต (Dimenhydrinate) ขนาด ๕๐ มิลลิกรัม ที่ผลิตขึ้นเป็นยาบรรจสุเสร็จชนิดเม็ด”

ข้อ ๙ ยาที่ได้รับยกเว้นไม่เป็นยาอันตรายตาม (๘) ข (๘) ข ค (๑๕) ง (๒๓) ก ข (๓๒) ข ค ง (๓๓) ข ค (๓๗) ง จ ฉ (๔๒) ข (๔๓) ข และ (๔๘) ของข้อ ๓ แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาอันตราย ฉบับลง

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๒๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๕๕ จะต้องเป็นไปตามสูตร ขอบ่งใช้ วิธืใช้ ขนาดบรรจุ และข้อความ คำเตือน สำหรับยาที่ได้รับขั้ยกเว้นไม่เป็นยาอันตรายท้ายประกาศฉบับนี้

ข้อ ๑๐ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๓๐

เทอดพงษ์ ไชยนันทน์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

สูตร ช็อบ่งไซ้ วิถีไซ้ ขนาดบรรจุ และชื่อความของคำเตือน

สำหรับยาที่ได้รับการยกเว้นไม่เป็นยาอันตราย

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2530

เรื่อง ยาอันตราย ฉบับที่ 4

รายการที่ 1

ในยาเม็ด 1 เม็ดประกอบด้วยตัวยาสำคัญ

เดกซ์โทรเมทอร์แฟน ไฮโดรโบรไมด์

15 มิลลิกรัม

(Dextromethorphan hydrobromide)

ช็อบ่งไซ้ ใช้สำหรับบรรเทาอาการไอ

วิถีไซ้ ผู้ใหญ่รับประทานครั้งละ 1-2 เม็ด ทุก 6-8 ชั่วโมง

คำเตือน

1. ผู้ที่มีไข้สูง เป็นคลื่น ปวดศีรษะ และคลื่นไส้อาเจียน ควรปรึกษาแพทย์
2. ไม่ควรใช้ยานี้เกิน 5 วัน
3. ควรใช้อย่างระมัดระวังในผู้เป็นโรคตับ
4. ไม่ควรใช้เมื่อมีอาการไอเรื้อรังหรือไอเรื้อรังเนื่องจากสูบบุหรี่จัด เป็นโรคถุงลมโป่งพอง โรคหอบหืด หรืออาการไอที่มีเสมหะมาก

ขนาดบรรจุ แผงละ 4 เม็ด หรือ 10 เม็ด

รายการที่ 2

ในยาเม็ด 1 เม็ดประกอบด้วยตัวยาสำคัญ

ไฮโดรคลอโรไทอะไซด์

50 มิลลิกรัม

(Hydrochlorothiazide)

ช็อบ่งไซ้ ใช้ลดความดันโลหิตในโรคความดันโลหิตสูง

วิถีไซ้ ผู้ใหญ่รับประทานครั้งละ 1 เม็ด วันละ 1 ครั้ง ตอนเช้า

คำเตือน

1. ผู้เป็นโรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคตับหรือไต ให้ปรึกษาแพทย์ก่อนใช้
2. ยานี้อาจทำให้เกิดอันตรายเนื่องจากระบบเกลือแร่ในร่างกายเสียสมดุลได้

ขนาดบรรจุ แผงละ 4 เม็ด หรือ 10 เม็ด

รายการที่ 3

ในยาเม็ด 1 เม็ดประกอบด้วยตัวยาสำคัญ

	เอthinylestradiol	0.03-0.05 มิลลิกรัม
	(Ethinylestradiol)	
หรือ	เมสทรานอล	0.03-0.05 มิลลิกรัม
	(Mestranol)	
	นอร์เจสทรีล	0.25-0.5 มิลลิกรัม
	(Norgestrel)	
หรือ	เลโวเนอร์เจสทรีล	0.125-0.25 มิลลิกรัม
	(Levonorgestrel)	
หรือ	นอร์เอทิสเทอโรน	1.0-2.5 มิลลิกรัม
	(Norethisterone)	
หรือ	นอร์เอทิสเทอโรน อะซิเตต	1.0-2.5 มิลลิกรัม
	(Norethisterone acetate)	
หรือ	ไลเนสทรีนอล	1.0-2.5 มิลลิกรัม
	(Lynestrenol)	

ชอ่งไซ ใช้เป็นยาคูกำเนิด

วิธีใช้ ยานี้รับประทานวันละ 1 เม็ด ติดต่อกันเป็นเวลา 21 วัน โดยเริ่มต้นในวันที่ 5 หลังจากวันที่เริ่มมีประจำเดือน การรับประทานยาให้รับประทานยาในเวลาเดียวกันทุกวัน (เช่น หลังอาหารเย็นหรือก่อนนอน) เมื่อรับประทานยาคิดต่อกันครบ 21 วันแล้วให้หยุดยา หลังจากหยุดรับประทานยานี้จะมีเลือดออกเหมือนประจำเดือนภายใน 2-4 วัน การเริ่มรับประทานยาแผงใหม่ให้ปฏิบัติตามวิธีใช้ดังกล่าวข้างต้น

กรณีลืมรับประทานยาคามวันและเวลา

ถ้าลืมรับประทานยาเกิน 12 ชั่วโมง ต้องใช้การคุมกำเนิดวิธีอื่นควบคู่ไปด้วย มิฉะนั้นอาจตั้งครรภ์ได้

การเริ่มใช้ยาใหม่ให้ปฏิบัติตามวิธีใช้ดังกล่าวข้างต้น

- คำเตือน 1. ห้ามใช้กับผู้ที่ไขมันในเลือดสูง โรคหลอดเลือดอุดตันหรือโรคตับ  
2. ในระหว่างที่รับประทานยานี้อาจมีอาการไม่สบาย ปวดศีรษะ ตาพร่ามัว  
ปวดขาหรือหน้าอก หรือประจำเดือนมาไม่ปกติ หรือไม่มาเลย ให้รีบปรึกษาแพทย์  
หรือศูนย์วางแผนครอบครัวที่ใกล้ที่สุด
- ขนาดบรรจุ แผลงละ 21 เม็ด หรือ 28 เม็ด
- หมายเหตุ ถ้าเป็นขนาดบรรจุ 28 เม็ด วิธีใช้ให้แสดงข้อความต่อไปนี้
- "วิธีใช้ ให้รับประทานยารวันละ 1 เม็ด โดยรับประทานเม็ดแรกในวันแรกที่มีประจำเดือน  
จากส่วที่มีแถบสี..... (บนแผงยาคตามชนิดของผลิตภัณฑ์) จนกระทั่งหมดแผง  
เมื่อหมดแผงแรกแล้วให้เริ่มรับประทานยาแผงต่อไป โดยไม่ต้องหยุดยา การรับประทาน  
ยาให้รับประทานในเวลาเดียวกันทุกวัน (เช่น หลังอาหารเย็นหรือก่อนนอน)  
กรณีรับประทานยาคตามวันและเวลา  
ถ้าลืมรับประทานยาเกิน 12 ชั่วโมง ต้องใช้การคุมกำเนิดวิธีอื่นควบคู่ไปด้วย  
มิฉะนั้นอาจตั้งครรภ์ได้  
การเริ่มใช้ยาใหม่ให้ปฏิบัติตามวิธีใช้ดังกล่าวข้างต้น"

รายการที่ 4

ในยาเม็ด 1 เม็ดประกอบด้วยตัวยาสำคัญ

คลอร์เฟนิรามีน มาลีเอต

2 มิลลิกรัม

(Chlorpheniramine maleate)

ข้อบ่งใช้ บรรเทาอาการแพ้ เช่น ลมพิษ น้ำมูกไหล

วิธีใช้ ผู้ใหญ่รับประทานครั้งละ 1-2 เม็ด

เด็กอายุ 6-12 ปี รับประทานครั้งละ 1 เม็ด ทุก 6 ชั่วโมง

คำเตือน

1. ไม่ควรใช้ยาคติดต่อกันนานเกิน 7 วัน
2. ยานี้อาจทำให้เกิดอาการง่วงซึม จึงไม่ควรขับชี่ยานยนต์ หรือทำงานเกี่ยวกับ  
เครื่องจักรกล
3. ไม่ควรใช้ยานี้ในกรณีที่มีเครื่องที่มีแอลกอฮอล์

ขนาดบรรจุ แผลงละ 4 เม็ด หรือ 20 เม็ด

รายการที่ 5

ในยาเม็ด 1 เม็ดประกอบด้วยตัวยาสำคัญ

พาราเซตามอล (Paracetamol)	300-500 มิลลิกรัม
คลอร์เฟนิรามีน มาลีเอต (Chlorpheniramine maleate)	1-2 มิลลิกรัม
ฟีนิลโพรพานอลามีน ไฮโดรคลอไรด์ (Phenylpropanolamine HCl)	12.5-25 มิลลิกรัม

ข้อบ่งใช้ บรรเทาหวัดที่มีอาการคัดจมูก น้ำมูกไหล ปวดศีรษะ และเป็นไข้

วิธีใช้ ผู้ใหญ่รับประทานครั้งละ 1 หรือ 2 เม็ด ทุก 6-8 ชั่วโมง (ขนาดรับประทานจะเป็น 1 หรือ 2 เม็ด ให้คณะกรรมการศึกษาและวิจัยคำรับยาแผนปัจจุบันที่ใช่สำหรับมนุษย์ฯ พิจารณาคาตามขนาดที่ถูกต้อง ตามสูตรคำรับที่ผู้รับอนุญาตฯ ขอขึ้นทะเบียนคำรับยา)

- คำเตือน
1. ห้ามใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
  2. ห้ามใช้ยาติดต่อกันนานเกิน 5 วัน เนื่องจากอาจมีพิษต่อตับได้
  3. ยานี้อาจทำให้เกิดอาการง่วงซึม จึงไม่ควรขับขี่ยานยนต์ หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล
  4. ผู้ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคเบาหวาน หรือโรคต่อมไทรอยด์ ให้ปรึกษาแพทย์ก่อนใช้

ขนาดบรรจุ แผงละ 4 เม็ด หรือ 10 เม็ด

รายการที่ 6

ในยาเม็ด 1 เม็ดประกอบด้วยตัวยาสำคัญ

อะมิโนฟิลลีน (Aminophylline)	100 มิลลิกรัม
---------------------------------	---------------

ชอบงใช้ ช่วชยชยหลอคลมในโรททอบทืค  
วธิใช้ ผูโหญรับประทวนครั้งละ 1 เม็ด ทุก 6-8 ช่วโมง  
ค่วเคือณ 1. ในผูปวยสูงออายุ ผูเป็นโรทหัวใจ โรทคับ ท้องเสีย เป็นใช้ มีกรคคคเชือของ  
ทวงเคินหอยใจ หรือผูที่มีประวัติเคยเป็นโรทกระเพาะอหอรให้ปรีกษาแพทยก่อนใช้  
2. ยานี้ใช้บรเรทอการเพ่านัน ผูปวยควรไปพบแพทย  
ชนาทบรจรู แดงละ 4 เม็ด

รายการที่ 7

ในยาเม็ด 1 เม็ดประกอบด้วยควยวส่วสำคัญ  
ทีโอฟิลลีน แอนไฮดรัส 60-150 มิลลิกรัม  
(Theophylline anhydrous)  
เอเฟดรีน ไฮโดรคลอไรด์ 15-50 มิลลิกรัม  
(Ephedrine HCl)

ชอบงใช้ ช่วชยชยหลอคลมในโรททอบทืค  
วธิใช้ ผูโหญรับประทวนครั้งละ 1 เม็ด ทุก 6-8 ช่วโมง  
ค่วเคือณ 1. ห้ามใช้ในผูเป็นโรทควมคั่นโลหิตสูง โรทหัวใจ โรทเบทววน หรือโรทของ  
ค่อมไทรอยด์ นอกจกจากแพทยสั่ง  
2. ในผูที่สูงออายุ ผูเป็นโรทคับ ท้องเสีย เป็นใช้ มีกรคคคเชือของทวงเคินหอยใจ  
หรือผูที่มีประวัติเคยเป็นโรทกระเพาะอหอร ให้ปรีกษาแพทยก่อนใช้  
3. ยานี้ใช้บรเรทอการเพ่านัน ผูปวยควรไปพบแพทย  
ชนาทบรจรู แดงละ 4 เม็ด

รายการที่ 8

ในยาเม็ด 1 เม็ด หรือ 1 แคปซูล ประกอบด้วยควยวส่วสำคัญ  
ซัลฟาเมโทซอล 400 มิลลิกรัม  
(Sulphamethoxazole)  
ไตรเมโทพริม 80 มิลลิกรัม  
(Trimethoprim)

- ข้อบ่งชี้ ใช้ในการรักษาโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ เช่น ทอนซิลอักเสบ
- วิธีใช้ ผู้ใหญ่รับประทานครั้งละ 2 เม็ด วันละ 2 ครั้ง หลังอาหารเข้า เช้า และควรรดน้ำ  
ความมากา ให้ใช้ยานี้ติดต่อกันจนครบ 7 วัน
- คำเตือน 1. ห้ามใช้ยานี้ในเด็ก  
2. ห้ามใช้ยานี้ในผู้ที่มีประวัติแพ้ยาซัลฟา ผู้เป็นโรคตับ โรคไต โรคโลหิตจาง  
หญิงมีครรภ์ หรือหญิงในระหว่างให้นมบุตร  
3. ไม่ควรใช้ยานี้ติดต่อกันเป็นเวลานานเกิน 10 วัน
- ขนาดบรรจุ แผงละ 4 เม็ด หรือ 10 เม็ด

รายการที่ 9

ในยาเม็ด 1 เม็ดประกอบด้วยตัวยาสำคัญ

ทาลิลซัลฟาโหลโซล 500 มิลลิกรัม

(Phthalylsulphathiazole)

ข้อบ่งชี้ ใช้สำหรับแก้อาการท้องเสีย

วิธีใช้ ผู้ใหญ่รับประทานครั้งแรก 3-4 เม็ด ค่อยไปครั้งละ 2 เม็ด ทุก 4 ชั่วโมง  
ผู้ป่วยควรรับประทานผงน้ำตาลเกลือแร่ (แก้ท้องร่วง) ด้วย

คำเตือน 1. ห้ามใช้ยานี้ในผู้ที่มีประวัติแพ้ยาซัลฟา ผู้เป็นโรคตับ โรคไต โรคโลหิตจาง  
หญิงมีครรภ์ หรือหญิงในระหว่างให้นมบุตร  
2. ไม่ควรใช้ยานี้เกิน 2 วัน ถ้าอาการไม่ดีขึ้น ให้รีบปรึกษาแพทย์

ขนาดบรรจุ แผงละ 4 เม็ด หรือ 20 เม็ด

รายการที่ 10

เมื่อผสมน้ำแล้วได้น้ำยา 5 มิลลิลิตร ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ

เพนิซิลลิน วี โปแตสเซียม อีควิวาเลนต์ พู เพนิซิลลิน วี 200,000 ยูนิต

(Penicillin V Potassium equivalent to Penicillin V 200,000 units)

ข้อบ่งชี้ ใช้ในการรักษาโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ เช่น ทอนซิลอักเสบ คออักเสบ

วิธีใช้      เติมน้ำ เขย่าให้เข้ากันแล้ว เติมน้ำให้ถึงขีดอีกครั้งหนึ่ง จะได้ยาซึ่งใน 1 ซ้อนชา (5 มิลลิกรัม) มีตัวยาเพนิซิลิน วี 200,000 ยูนิต  
เด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี รับประทานครั้งละ  $\frac{1}{2}$  ซ้อนชา  
เด็กอายุ 1-5 ปี รับประทานครั้งละ 1 ซ้อนชา  
เด็กอายุ 6-12 ปี รับประทานครั้งละ 2 ซ้อนชา  
ให้รับประทานวันละ 4 ครั้ง ก่อนอาหาร  $\frac{1}{2}$ -1 ชั่วโมง และก่อนนอน ต้องรับประทานติดต่อกัน 10 วัน

คำเตือน      1. ห้ามใช้ยาในผู้ที่แพ้ยากลุ่มเพนิซิลิน เพราะอาจเป็นอันตรายถึงตายได้  
2. หากเกิดอาการผื่นแดง ระบายเคือง บวมหรือท้องเสียให้หยุดใช้ยาและปรึกษาแพทย์  
3. ต้องรับประทานยานี้ติดต่อกันจนครบ 10 วัน ถ้าอาการไม่ดีขึ้นให้รีบปรึกษาแพทย์

ขนาดบรรจุ      ขวดละ 60 มิลลิกรัม

วิธีเก็บ      เมื่อละลายน้ำแล้วให้เก็บไว้ในที่เย็นและต้องไม่เก็บไว้นานเกิน 7 วัน

### รายการที่ 11

ในยาเม็ด 1 เม็ดประกอบด้วยตัวยาสำคัญ

มีเบนดาโซล      100 มิลลิกรัม

(Mebendazole)

หรือ มีเบนดาโซล      500 มิลลิกรัม

(Mebendazole)

ข้อบ่งใช้      ถ่ายพยาธิเส้นด้าย ตัวกลม ตัวตืด

วิธีใช้      ให้เคี้ยวยาก่อนกลืน

ชนิด 100 มิลลิกรัม

สำหรับ เด็กอายุตั้งแต่ 2 ขวบ ขึ้นไป และผู้ใหญ่รับประทานเหมือนกัน

สำหรับพยาธิเส้นด้าย

รับประทานครั้งละ 1 เม็ด หลังอาหารเพียงครั้งเดียว

สำหรับพยาธิตัวกลมอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นชนิดเดียวหรือหลายชนิด

รับประทานครั้งละ 1 เม็ด วันละ 2 ครั้ง หลังอาหารเช้าและเย็น  
ติดต่อกัน 3 วัน

สำหรับพยาธิตัวตืด

รับประทานครั้งละ 2 เม็ด วันละ 2 ครั้ง หลังอาหารเช้าและเย็น  
ติดต่อกัน 4 วัน

ชนิด 500 มิลลิกรัม

สำหรับพยาธิเส้นด้าย ตัวกลม ตัวตืด

รับประทานครั้งละ 1 เม็ด เพียงครั้งเดียว

- คำเตือน
- ห้ามใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี
  - ไม่ควรใช้ในสตรีมีครรภ์ในระยะ 3 เดือนแรก และผู้เป็นโรคตับ
- ขนาดบรรจุ
- ชนิด 100 มิลลิกรัม แผลละ 6 เม็ด
- ชนิด 500 มิลลิกรัม แผลละ 1 เม็ด

#### รายการที่ 12

ในยาเม็ด 1 เม็ดประกอบด้วยตัวยาสำคัญ

ไดเมนไฮดริเนต

50 มิลลิกรัม

(Dimenhydrinate)

ข้อบ่งใช้ ใช้ป้องกันอาการเมารถ เมาเรือ

วิธีใช้ ผู้ใหญ่รับประทานครั้งละ 1 เม็ด ก่อนออกเดินทางอย่างน้อย 30 นาที

คำเตือน ยานนี้อาจทำให้เกิดอาการง่วงซึม จึงไม่ควรขับขี่ยานยนต์ หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร

ขนาดบรรจุ แผลละ 4 เม็ด หรือ 10 เม็ด

#### รายการที่ 13

ในยาเม็ด 1 เม็ดประกอบด้วยตัวยาสำคัญ

ซัลฟาดอกซีน

500 มิลลิกรัม

(Sulphadoxine)

ไพริเมตามีน

25 มิลลิกรัม

(Pyrimethamine)

ข้อบ่งใช้	ใช้ป้องกันหรือรักษาไข้มาลาเรีย
วิธีใช้	<u>สำหรับป้องกัน</u> รับประทานทุก 2 สัปดาห์ เด็ก 4-8 ปี รับประทานครั้งละ 1 เม็ด เด็ก 9-14 ปี รับประทานครั้งละ 1 เม็ดครึ่ง ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 2 เม็ด <u>สำหรับรักษา</u> ผู้ใหญ่รับประทานครั้งละ 2-3 เม็ด เพียงครั้งเดียว
คำเตือน	1. ห้ามใช้ในสตรีมีครรภ์ และเด็กอายุต่ำกว่า 6 เดือน ถ้ารับประทานยานี้แล้ว ไม่หายภายใน 3 วัน ห้ามรับประทานซ้ำ ให้รีบปรึกษาแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ มาลาเรีย 2. ยานี้อาจทำให้เกิดอันตรายได้ 3. รับประทานยานี้แล้วควรดื่มน้ำมากๆ
ขนาดบรรจุ	แผงละ 4 เม็ด หรือ 10 เม็ด