

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง ยาอันตราย

ฉบับที่ ๓๐

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๖ (๓) แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ และมาตรา ๗๘ แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคำแนะนำของคณะกรรมการยาในการประชุมครั้งที่ ๓๘๒-๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความใน (๗๔) ของข้อ ๓ แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาอันตรายลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๒๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาอันตรายฉบับที่ ๑๙ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(๗๔) ยาที่มีนิโคติน (Nicotine) หรือสารประกอบของนิโคติน ซึ่งมุ่งหมายที่จะใช้สำหรับช่วยการอดบุหรี่ ยกเว้นรูปแบบมากฝรั่งสำหรับเคี้ยว (chewing gum) และรูปแบบแผ่นแปะ (transdermal patch)”

ข้อ ๓ ให้ผู้รับอนุญาตที่ประสงค์จะทำการผลิต นำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งยาแผนปัจจุบัน ที่ได้รับการยกเว้นตามข้อ ๒ ของประกาศนี้ ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนตารับยาพร้อมกับเอกสารกำกับยาสำหรับประชาชนซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารท้ายประกาศนี้ และเมื่อได้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตารับยาแล้ว จึงจะผลิตหรือนำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักรได้

ข้อ ๔ ให้ผู้รับอนุญาตผลิต นำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งยาแผนปัจจุบันที่ได้ขึ้นทะเบียนตารับยาไว้ และมีสูตรตารับที่ได้รับการยกเว้นตามข้อ ๒ ของประกาศนี้ สามารถขอแก้ไขรายการในทะเบียนตารับยาได้ โดยยื่นคำขอแก้ไขทะเบียนตารับยาพร้อมกับเอกสารกำกับยาสำหรับประชาชนซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารท้ายประกาศนี้ และเมื่อได้รับอนุญาตให้แก้ไขทะเบียนตารับยาแล้ว จึงจะผลิตหรือนำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักรได้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ปิยะสกล ศกลสัตยาทร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

เอกสารกำกับยาสำหรับประชาชน

นิโคติน 2 และ 4 มิลลิกรัม ชนิดมากฝรั่งสำหรับเด็ก ชื่อการค้าภาษาไทย (ชื่อการค้าภาษาอังกฤษ)

1. ยานี้คือยาอะไร

1.1 ยานี้มีชื่อสามัญว่าอะไร

- นิโคติน (nicotine) ออยู่ในกลุ่มยาต้านการเสพติดบุหรี่

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ช่วยในการเลิกบุหรี่
- ช่วยลดอาการถอนยาของผู้เสพติดบุหรี่
- ช่วยลดอาการอยากบุหรี่

2. ข้อควรรู้ก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้นิโคตินหรือสารประกอบอื่นๆ ในยานี้
- ห้ามใช้ในผู้ไม่สูบบุหรี่
- ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่มีผลในกระเพาะอาหารและลำไส้เล็ก
- ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่มีอาการชาดเลือดไปเลี้ยงหัวใจอย่างรุนแรง และหัวใจเดินผิดปกติ
- ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่มีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
- ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่หลอดอาหารอักเสบ
- ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่มีการอักเสบหรือเจ็บบริเวณกล้ามเนื้อขากรรไกร
- ห้ามใช้ในสตรีมีครรภ์
- ห้ามใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้ให้หลีกเลี่ยงใน

- หญิงให้นมบุตร
- รัยรุนอายุ 12-18 ปี
- ควรระวังการใช้หากท่านมีภาวะต่อไปนี้
 - ใสฟันปลอม
 - โรคหัวใจและหลอดเลือด
 - โรคหลอดเลือดสมองและอัมพาต
 - โรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายดีบ
 - โรคความดันโลหิตสูง
 - โรคเบาหวาน
 - โรคตับหรือมีผลตรวจการทำงานของตับผิดปกติ
 - โรคไตหรือมีผลตรวจการทำงานของไตผิดปกติ
 - โรคไทรอยด์ซอร์โนนสูง (hyperthyroidism)
 - โรคลมชัก
 - โรคเนื้องอกของต่อมหมูกไท
 - โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงชนิดมัยแอสทีเนีย เกรวิส (Myasthenia gravis)

- ไม่ควรใช้ยานี้ร่วมกับยาบางชนิด เช่น ธีโอฟิลลีน (theophylline), โคล札เปปีน (clozapine), โรพินิโรล (ropinirole), ทาครีน (tacrine), อินชูลิน (insulin), อิมิพราเมีน (imipramine), โอลันเซปปีน (olanzapine), โคลมิพราเมีน (clomipramine), ฟลูว็อกซามีน (fluvoxamine), ฟีนาซีติน (phenacetin), คาเฟอีน (caffeine), เพนตาโซซีน (pentazocine), โพรพอกซีฟีน (propoxyphene) เพราะอาจมีผลต่อการรักษาหรือเกิดอันตรายได้

หมายเหตุ หั้งนี้แพทย์อาจพิจารณาสั่งใช้ยาได้หากมีเหตุผลทางการแพทย์

3. วิธีใช้ยา

หยดสูบบุหรี่ทันที หรือภายใต้ส่องสปีด่าห์หลังเริ่มใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้


- การเลือกขนาดยาให้พิจารณาจากตารางที่ 1 และ 2 ตารางที่ 1 การเลือกขนาดมากฝรั่ง

จำนวนบุหรี่ที่สูบต่อวัน	ขนาดของมากฝรั่ง
1 ถึง 19 นวน	มากฝรั่งขนาด 2 มิลลิกรัม 1 ชิ้น ตามที่ต้องการเพื่อบรเทาความอยากบุหรี่ โดยใช้จำนวนชิ้นต่อวันตามตารางที่ 2
20 นวนขึ้นไป	มากฝรั่งขนาด 4 มิลลิกรัม 1 ชิ้น ตามที่ต้องการเพื่อบรเทาความอยากบุหรี่ โดยใช้จำนวนชิ้นต่อวันตามตารางที่ 2

- เด็กห้ามฝรั่งเข้า ๆ จนกระทั่งมีรีสชาติเป็นครั้งแรกนั้น เก็บ มากฝรั่งไว้ที่กระพังแก้มด้านใน รอจนรสเป็นครั้งแรกแล้วจึงเริ่มเคี้ยวมากฝรั่งอีกครั้ง โดยเปลี่ยนการเก็บมากฝรั่งไว้ที่กระพังแก้มอีกด้านหนึ่ง สลับไปมา จนกระทั่งมากฝรั่งรสชาติดีจีด (โดยทั่วไป 1 เม็ด ใช้เวลา 30 นาที)
- ใช้กระดาษห่อมากฝรั่งที่เคี้ยวแล้ว ก่อนนำไปทิ้งในถังขยะ
- ไม่ควรดื่มเครื่องดื่มที่เป็นกรด เช่น กาแฟ น้ำผลไม้ หรือน้ำแร่ ก่อนเคี้ยว มากฝรั่ง 15 นาที เพราะจะทำให้การดูดซึมของยาลดลง
- จำนวนชิ้นของมากฝรั่งที่แนะนำให้ใช้ต่อวัน ในแต่ละสปีด่าห์จะแตกต่างกันไป โดยจะค่อย ๆ ลดจำนวนชิ้นของมากฝรั่งลง ตามตารางที่ 2 ตารางที่ 2 จำนวนชิ้นมากฝรั่งต่อวัน ที่แนะนำให้ใช้ในแต่ละสปีด่าห์

สปีด่าห์ที่	ความถี่ในการใช้ยา	จำนวนชิ้นที่แนะนำต่อวัน
1 ถึง 6	1 ชิ้น ทุก 1 ถึง 2 ชม.	8 ถึง 12 ชิ้น
7 ถึง 9	1 ชิ้น ทุก 2 ถึง 4 ชม.	4 ถึง 6 ชิ้น
10 ถึง 12	1 ชิ้น ทุก 4 ถึง 8 ชม.	1 ถึง 3 ชิ้น ค่อย ๆ ลดลงจนเหลือศูนย์

หมายเหตุ: วิธีใช้ยาอาจปรับเปลี่ยนได้ตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรหรือโตรสารยด่วนเลิกบุหรี่ 1600



3.2 ถ้าใช้ยา nicotine กินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง เช่น คลื่นไส้หรืออาเจียนรุนแรง ท้องเสียรุนแรง ปวดเกร็งท้องรุนแรง ใจสั่น หัวใจเต้นเร็วหรือช้าผิดปกติ กล้ามเนื้ออ่อนแรง หายใจลำบาก สติสัมปชัญญะเปลี่ยนแปลง ขัก หรือหมดสติ การมองเห็น การได้ยินหรือประสาทสัมผัสผิดปกติ ให้รีบไปพบแพทย์ทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- หยุดสูบบุหรี่ทันที** หรือภายในสองสัปดาห์ หลังเริ่มใช้ยา เนื่องจากการใช้ยาаницความคุ้กับการสูบบุหรี่จะทำให้ได้รับ尼古ตินเพิ่มมากขึ้น จนเกิดอันตรายได้
- ถ้าต้องการผ่าตัดหรือทำฟัน ควรแจ้งแพทย์หรือทันตแพทย์ว่ากำลังใช้ยา

- ควรพกยาติดตัวเสมอ เพื่อให้มียาใช้ในกรณีที่อยากบุหรี่

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกด ริมฝีปาก ลมพิษ หน้ามีด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวน้ำหนึบลอก มีจ้ำตามผิวน้ำหนัง หรือเลือดออกผิดปกติ
- ใจสั่น หัวใจเต้นเร็วหรือช้าผิดปกติ หรือเต้นผิดจังหวะ
- เจ็บหน้าอก
- กล้ามเนื้ออ่อนแรง
- สติสัมปชัญญะเปลี่ยนแปลง ขัก หรือหมดสติ
- คลื่นไส้รุนแรง หรืออาเจียนรุนแรง ท้องเสียรุนแรง ปวดเกร็งท้องรุนแรง
- การมองเห็น การได้ยินหรือประสาทสัมผัสผิดปกติ

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้รีบไปพบแพทย์ทันที

- มีน้ำ ปวดศีรษะ
- นอนไม่หลับ ฝันร้าย
- คลื่นไส้ ไม่สบายท้อง
- สะอึก
- ปวดขากรรไกร
- มีแพลในปากหรือคอ
- ผื่น คัน ระคายเคืองผิวน้ำหนัง
- ท้องเสีย

6. ควรเก็บยาอย่างไร

- เก็บยาไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน ... (ปรับตาม)

ทะเบียน)... องศาเซลเซียส

- เก็บยาทุกชนิดให้พ้นมือเด็ก
- หยอดยาออกจากแผงเมื่อจะใช้ในแต่ละครั้งเท่านั้น

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ หากมีข้อสงสัยให้
ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

หากต้องการคำแนะนำในการเลิกบุหรี่ ปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์ หรือโตรสารยด่วนเลิกบุหรี่ 1600

ผู้ผลิต (ปรับตามทะเบียน)

ผู้นำเข้า โทร. (ปรับตามทะเบียน)

ผู้จัดจำหน่าย (ปรับตามทะเบียน)

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อ มิถุนายน 2561
ความรู้เพิ่มเติม

ผู้ใช้ยาควรเริ่มประเมินความรุนแรงในการสเปดิดนิโคตินตามตารางที่ 3

ตารางที่ 3 การประเมินความรุนแรงในการติดนิโคติน

คำถามที่ใช้	คะแนน
ข้อ 1. ท่านสูบบุหรี่/ยาสูบ มวนแรกหลังตื่นนอนตอนเช้า นานแค่ไหน?	
<input type="checkbox"/> ภายใน 5 นาทีหลังตื่น	3
<input type="checkbox"/> 6 ถึง 30 นาทีหลังตื่น	2
<input type="checkbox"/> มากกว่า 30 นาทีหลังตื่น	1
ข้อ 2. ปกติท่านสูบบุหรี่/ยาสูบ วันละกี่มวน ?	
<input type="checkbox"/> มากกว่า 30 มวนต่อวัน	3
<input type="checkbox"/> 21 ถึง 30 มวนต่อวัน	2
<input type="checkbox"/> 11 ถึง 20 มวนต่อวัน	1
การแปลผลความรุนแรง: คะแนนรวมทั้ง 2 ข้อ	
5 ถึง 6 คะแนน = ติดนิโคตินรุนแรง	
3 ถึง 4 คะแนน = ติดนิโคตินปานกลาง	
1 ถึง 2 คะแนน = ติดนิโคตินเล็กน้อย	

**นิโคติน 7 มิลลิกรัม/24 ชั่วโมง
นิโคติน 14 มิลลิกรัม/24 ชั่วโมง
นิโคติน 21 มิลลิกรัม/24 ชั่วโมง
ชนิดแผ่นแปะผิวนัง
ชื่อการค้าภาษาไทย
(ชื่อการค้าภาษาอังกฤษ)**

1. yaneeดีอย่าไร

1.1 yaneeมีชื่อสามัญว่าอะไร

- นิโคติน (nicotine) อยู่ในกลุ่มยาต้านการเสพติดบุหรี่

1.2 yaneeใช้เพื่ออะไร

- ช่วยในการเลิกบุหรี่
- ช่วยลดอาการถอนยาของผู้เสพติดบุหรี่
- ช่วยลดการอყูกสูบบุหรี่

2. ข้อควรรู้ก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้yaneeเมื่อไร

- ห้ามใช้เมื่อแพ้สารนิโคตินหรือส่วนประกอบในแผ่นแปะ ที่ผิวนัง
- ห้ามใช้เมื่อเป็นโรคผิวนังที่มีความผิดปกติของอวัยวะ อื่นร่วมด้วย
- ห้ามใช้เมื่อมีภาวะเจ็บแน่นหน้าอกหรืออาการปวดเด่น หัวใจ ที่อาการไม่คงที่ (Unstable angina)
- ห้ามใช้ในผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน
- ห้ามใช้ในผู้ป่วยโรคหัวใจเต้นผิดปกติ
- ห้ามใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้yanee

ให้หลีกเลี่ยงในผู้ที่มีภาวะต่อไปนี้

- สตรีมีครรภ์
- หญิงให้นมบุตร
- วัยรุ่นอายุ 12-18 ปี
- ควรระวังการใช้ยาหากท่านมีภาวะต่อไปนี้
 - โรคหัวใจและหลอดเลือด
 - โรคหลอดเลือดสมองและอัมพาต
 - โรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายดีบ
 - โรคความดันโลหิตสูง
 - โรคเบาหวาน
 - โรคตับหรือมีผลตรวจการทำงานของตับผิดปกติ

- โรคไตหรือมีผลตรวจการทำงานของไตผิดปกติ
- โรคไทรอยด์สอร์โนนสูง (hyperthyroidism)
- มีแผลในระบบทางเดินอาหาร กระเพาะอาหาร อักเสบ
- โรคลมชัก
- โรคเนื้องอกของต่อมหมวกไต
- โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงชนิดมัยแอสทีเนีย เกรวิส (Myasthenia gravis)
- โรคผิวนังที่เกิดจากการแพ้

ไม่ควรใช้yaneeร่วมกับยาบางชนิด เพราะอาจมีผลต่อ การรักษาหรือเกิดอันตรายได้ เช่น ทีโอฟิลลีน (theophylline) โคล札ปีน (clozapine) โรพินิโรล (ropinirole) ทาครีน (tacrine) อินชูลิน (insulin) อิมิพรามีน (imipramine) โอลันซานาปีน (olanzapine) โคลมิพرامีน (clomipramine) ฟลูวอกซามีน (fluvoxamine) ฟีนาเซติน (phenacetin) คาเฟอีน (caffeine) เพนตาโซซีน (pentazocine) โพรพอกซีฟีน (propoxyphene)

หมายเหตุ ทั้งนี้แพทย์อาจพิจารณาสั่งใช้ยาได้หากมี เหตุผลทางการแพทย์

3. วิธีใช้ยา

หยดสูบบุหรี่ทันทีหรือภายในสองสัปดาห์หลังเริ่มใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

ในกรณีที่ห้ามสูบบุหรี่ไม่เกิน 20 นาทีต่อวัน

ช่วงระยะเวลา	ขนาดยาที่เลือกใช้
สัปดาห์ที่ 1 ถึง 8	14 มิลลิกรัม/24 ชั่วโมง
สัปดาห์ที่ 9 ถึง 12	7 มิลลิกรัม/24 ชั่วโมง

ในกรณีที่ห้ามสูบบุหรี่ตั้งแต่วันละ 21 นาทีขึ้นไป


ช่วงระยะเวลา	ขนาดยาที่เลือกใช้
สัปดาห์ที่ 1 ถึง 4	21 มิลลิกรัม/24 ชั่วโมง
สัปดาห์ที่ 5 ถึง 8	14 มิลลิกรัม/24 ชั่วโมง
สัปดาห์ที่ 9 ถึง 12	7 มิลลิกรัม/24 ชั่วโมง

** โดยเปลี่ยนแผ่นแปะใหม่ทุกวัน


หมายเหตุ: วิธีใช้ยาอาจปรับเปลี่ยนได้ตามค่าแนะนำของ 医师 หรือเภสัชกรหรือ โทรสายด่วนเลิกบุหรี่ 1600

วิธีการใช้ยา

ควรติดแผ่นแปะหลังตื่นนอนตอนเช้าในเวลาเดียวกันทุกวัน



- ล้างมือให้สะอาดแล้วเช็ดให้แห้ง
- ทำความสะอาดผิวนังบริเวณที่ใช้ติดแผ่นแปะ




- ใช้กรรไกรสะอาดตัดตามรอยประ



- ภายในของ จะพบแผ่นแปะสี น้ำตาลบนแผ่นฟอยล์ ให้ดึงแผ่น ฟอยล์สีเงินขึ้นแล้วกตามรอยปรุทึ่งไป



- ลอกแผ่นแปะสีน้ำตาลออกจาก แผ่นฟอยล์สีเงินขึ้นใหญ่



- ติดแผ่นแปะต้านที่มีภาวะเหนี่ยว ลงบนผิวนังบริเวณที่ไม่มีขน และ ไม่มีแผลบริเวณใดบริเวณหนึ่งดังต่อไปนี้ คือถึงจะหาย เช่น บริเวณต้นแขน หน้าอก แผ่นหลังส่วนบน-ส่วนล่าง ดังบริเวณที่แรเงา

หมายเหตุ บริเวณแผ่นหลังส่วนบน สะโพก ก้น สามารถติดแผ่นแปะได้ แต่มีโอกาสหลุดได้ง่าย



- ติดแผ่นแปะให้เรียบสนิท แนบ กับผิวนัง และกดแผ่นแปะด้วยฝ่า มือค้างไว้ประมาณ 20 วินาที



- ใช้นิ้วมือกด วนรอบ ๆ แผ่นแปะ เพื่อให้มั่นใจว่าแผ่นแปะติดแน่น กับ ผิวนัง

วิธีการใช้ยา (ต่อ)

- ติดแผ่นแปะตลอด 24 ชั่วโมง แม้ว่าจะนอนหรืออาบน้ำ
- ให้ลอกแผ่นแปะเก่าออกแล้วติดแผ่นแปะใหม่ทันทีในเวลาเดิมทุกวัน
- เมื่อติดแผ่นแปะเสร็จเรียบร้อย ล้างมือให้สะอาดเพื่อกำจัดนิโคตินที่ติดที่เล็บและมือ
- เปลี่ยนตัวແղນที่ติดแผ่นแปะทุกวัน เพื่อป้องกันการระคายเคืองผิวหนังจากการสัมผัสนิโคตินหลายวัน หรือส่วนประกอบในแผ่นแปะอย่างต่อเนื่อง
- หากแผ่นแปะเลื่อนหลุดในระหว่างวัน ให้ติดแผ่นแปะอันใหม่ที่มีขนาดยาเท่าเดิมทันที โดยเปลี่ยนตัวແղນที่ติด และเปลี่ยนแผ่นแปะใหม่ตามรอบเวลาที่เลือก เช่น เก้าโมงเช้า
- ห้ามตัดแผ่นแปะ เพราะอาจทำให้การปลดปล่อยยาเสียไป และมีโอกาสระคายเคืองผิวหนังได้มากขึ้น
- แผ่นแปะเก่าที่ลอกทิ้ง ให้พับครึ่ง ก่อนทิ้งลงขยะ

3.2 หากลืมเปลี่ยนแผ่นแปะควรทำอย่างไร

- ให้เปลี่ยนแผ่นแปะทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าเกินหกโมงเย็น หรือจนครบรอบต่อไปในตอนเช้าหรือทันทีที่ตื่นนอน เพราะอาจทำให้นอนไม่หลับ หรือฝันร้าย ทั้งนี้ห้ามติดเพิ่มเป็น 2 แผ่น

3.3 ถ้าใช้ยาแล้วเกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้ตึงแผ่นแปะออกทันที
- ให้ลังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากพบว่ามีอาการผิดปกติที่รุนแรง เช่น คลื่นไส้หรืออาเจียนรุนแรง ท้องเสียรุนแรง ปวดเกร็งท้องรุนแรง ใจสั่น หัวใจเต้นเร็วหรือชาผิดปกติ กล้ามเนื้ออ่อนแรง หายใจลำบาก สติสัมปชัญญะเปลี่ยนแปลง ชัก หรือหมดสติ การมองเห็น การได้ยิน หรือประสาทสัมผัสผิดปกติ ให้รีบไปพบแพทย์

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างการใช้ยา

- หยุดสูบบุหรี่ทันที** หรือภายในสองสัปดาห์หลังเริ่มใช้ยา เนื่องจากการใช้ยาแล้วควบคู่กับการสูบบุหรี่จะทำให้ได้รับนิโคตินเพิ่มมากขึ้น จนเกิดอันตรายได้
- แจ้งแพทย์หรือทันตแพทย์ว่ากำลังใช้ยา หากต้องการผ่าตัดหรือทำฟัน

- หากท่านต้องเข้าเครื่องตรวจ เอ็ม อาร์ ไอ (MRI) ให้ดึงแผ่นแปะออกก่อนเข้าเครื่องตรวจ และติดแผ่นแปะอันเดิมหลังตรวจเสร็จ

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกด้วยมือ ลิมฟ์มาก หน้ามีดีเป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่นพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนัง หรือเลือดออกผิดปกติ
- ใจสั่น หัวใจเต้นเร็วหรือชาผิดปกติ หรือหัวใจเต้นผิดจังหวะ
- เจ็บหน้าอก
- กล้ามเนื้ออ่อนแรง
- สติสัมปชัญญะเปลี่ยนแปลง ชัก หรือหมดสติ
- คลื่นไส้รุนแรง หรืออาเจียนรุนแรง ท้องเสียรุนแรง ปวดเกร็งท้องรุนแรง
- การมองเห็น การได้ยิน หรือประสาทสัมผัสผิดปกติ

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- มึนงง ปวดศีรษะ
- นอนไม่หลับ ฝันร้าย
- คลื่นไส้ อาการไม่สบายในท้อง
- ผื่นคัน ระคายเคืองผิวหนัง
- ท้องเสีย

6. เก็บยานี้อย่างไร

- เก็บยาไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน ... (ปรับตามทะเบียน)... องศาเซลเซียส
- เก็บยาให้พันมือเด็ก
- หยอดแผ่นแปะออกจากกล่องเมื่อจะใช้ในแต่ละครั้งเท่านั้น

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

หากต้องการคำแนะนำในการเลิกบุหรี่
ปรึกษานักการทางการแพทย์
หรือโทรศัพย์ต่อวนเลิกบุหรี่ 1600

ผู้ผลิต (ปรับตามทะเบียน)
ผู้นำเข้า โทร. (ปรับตามทะเบียน)
ผู้จัดจำหน่าย (ปรับตามทะเบียน)

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อ มิถุนายน 2561

การประเมินความรุนแรงการติดนิโคติน

ก่อนเริ่มใช้ยา ผู้ใช้ยาควรประเมินความรุนแรงในการสเปดติดนิโคติน

ตารางแสดงการประเมินความรุนแรงในการสเปดติดนิโคติน

คำถามที่ใช้	คะแนน
ข้อ 1. ท่านสูบบุหรี่/ยาสูบ นานแกร่งตั้นตอนนี้ นานแค่ไหน?	
<input type="checkbox"/> ภายใต้ 5 นาทีหลังตื่น	3
<input type="checkbox"/> 6 ถึง 30 นาทีหลังตื่น	2
<input type="checkbox"/> มากกว่า 30 นาทีหลังตื่น	1
ข้อ 2. ปกติท่านสูบบุหรี่/ยาสูบ วันละกี่วัน?	
<input type="checkbox"/> มากกว่า 30 นาทีต่อวัน	3
<input type="checkbox"/> 21 ถึง 30 นาทีต่อวัน	2
<input type="checkbox"/> 11 ถึง 20 นาทีต่อวัน	1
การแปลผลความรุนแรง: คะแนนรวมทั้ง 2 ข้อ	
5 ถึง 6 คะแนน = ติดนิโคตินรุนแรง	
3 ถึง 4 คะแนน = ติดนิโคตินปานกลาง	
1 ถึง 2 คะแนน = ติดนิโคตินเล็กน้อย	