

คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข

ທີ ៤៧៦/២៥៦២

ເຮືອງ ແກ້ໄຂທະບຽນຕໍ່ຮັບຢາທີ່ມີເອົກໂຄຕາມືນ (Ergotamine) ເປັນສ່ວນປະກອບ
ສໍາຫຼັບຮັກໝາໄມເກຣນ (Migraine)

ດ້ວຍປະກຸບຂໍ້ມູນທາງວິຊາກວ່າເກີດເຫດຖາກນີ້ໄປໆພຶກປະສົງຈາກປະກຸບກິຈນາກວ່າຕໍ່ຮັບຢາທີ່ມີເອົກໂຄຕາມືນ (Ergotamine) ເປັນສ່ວນປະກອບ ສໍາຫຼັບຮັກໝາໄມເກຣນ (Migraine) ກັບຍາບາງໜິດທີ່ອ່ານຸ່າໃປສູ່ການເກີດກວາະ ergotism ຊຶ່ງມີອາການຮ້າຍແຮງທ່າໃຫ້ເກີດການທຸພພລພາພຄາວຮ້ອງເສີຍຊີວິດໄດ້ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງສົມຄວນແກ້ໄຂຂ້ອງບໍ່ໃໝ່ ຂາດຍາແລະວິທີການໃໝ່ຢາ ຮວມถึงເພີ່ມຂໍ້ອຳນວຍຕໍ່ເຕືອນໃນຈລາກຢາແລະເອກສາກຳກັບຢາ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງຄວາມປລອດກັບຂອງຜູ້ໃໝ່ຢາ

ອາສີຍອໍານາຈຕາມຄວາມໃນມາຕາຮາ ៨៦ ທີ່ ແກ້ໄຂພະພາບບັນຫຼຸດຕີຢາ ພ.ສ. ២៥១០ ຊຶ່ງແກ້ໄຂເພີ່ມເຕີມໂດຍພະພາບບັນຫຼຸດຕີຢາ (ฉบັບທີ ៣) ພ.ສ. ២៥៦២ ຮັ້ນມາຕີວ່າກາງກະທຽບສູ່ໂດຍຄໍາແນະນຳຂອງຄະນະການກາຍາ ໃນກະຊວງມະນຸຍາ ໄກສະກິດຕະກິດທີ່ ៣៩៥-៨/២៥៦០ ເມື່ອວັນທີ ១៤ ກັນຍານ ២៥៦០ ແລະຄຣັງທີ່ ៣៩៥-៦/២៥៦១ ເມື່ອວັນທີ ២០ ກຣກງູມ ២៥៦២ ຈຶ່ງມີຄຳສັ່ງ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້

ຂໍ້ອຳນວຍຕໍ່ເຕືອນໃຫ້ແກ້ໄຂທະບຽນຕໍ່ຮັບຢາທີ່ມີເອົກໂຄຕາມືນ (Ergotamine) ເປັນສ່ວນປະກອບ ສໍາຫຼັບຮັກໝາໄມເກຣນ (Migraine) ດັ່ງນີ້

(១) ແກ້ໄຂຂະລາກ ດັ່ງນີ້

(១.១) ຂ້ອບ່ອນໃໝ່ (ກຣນີທີ່ມີກາຣະບຸ້ຂ້ອບ່ອນໃໝ່ຂັ້ນຂະລາກ)
ໃໝ່ຢານີ້ສໍາຫຼັບຮັກໝາໄມເກຣນ (Migraine)

(១.២) ຂາດແລະວິທີການໃໝ່ (ກຣນີທີ່ມີກາຣະບຸ້ຂາດແລະວິທີການໃໝ່ຂັ້ນຂະລາກ)
ຜູ້ໃໝ່ແລະເຕັກອາຍຸ ១២ ປີ້ຂັ້ນໄປ: ເມື່ອປວດສີຮະໄມເກຣນ (Migraine)

ໃຫ້ຮັບປະທານ ២ ເມື່ອທັນທີ ຫາກອາການໄມ່ປະທານຫັ້ງຈາກຮັບປະທານຢາແລ້ວ ៣០ ນາທີ ສາມາດຮັບປະທານຫັ້ງໄດ້ອີກ ຄຣັງລະ ១ ເມື່ດ ແຕ່ທໍາມຮັບປະທານເກີນວັນລະ ៦ ເມື່ດ ທັງນີ້ ທໍາມຮັບປະທານຢາເກີນ ១០ ເມື່ດຕໍ່ສັບດາຫີ່ ຫາກໃໝ່ຢາຕ່ອນເນື່ອງນາແລ້ວ ៦ ເມື່ດກາຍໃນ ១ ວັນ ຕ້ອງຫຼຸດການໃໝ່ຢາອ່າງນ້ອຍ ៤ ວັນ

ເຕັກອາຍຸຕໍ່ກວ່າ ១២ ປີ: ໃຊ້ຕາມແພທຍີສັ່ງ

(១.៣) ຄຳເຕືອນ

ໃຫ້ເປັນໄປຕາມປະກາສກະທຽບສູ່ໂດຍໃຫ້ຢາທີ່ຕໍ່ເຕືອນໃຫ້ໃໝ່ຢາໄວ້ໃນຂະລາກແລະທີ່ເອກສາກຳກັບຢາ ແລະຂໍ້ອຳນວຍຕໍ່ເຕືອນ

(២) ແກ້ໄຂເອກສາກຳກັບຢາ ດັ່ງນີ້

(២.១) ຮະບຸ້ຂ້ອບ່ອນໃໝ່ ແລະ ຂາດແລະວິທີການໃໝ່ ໂດຍໃໝ່ຂໍ້ອຳນວຍຕໍ່ເຕືອນ (១.១) ແລະ (១.២)
ຕາມລຳດັບ

(๒.๒) ระบุคำเตือน ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยยาที่ต้องแจ้งคำเตือนการใช้ยาไว้ในฉลากและที่เอกสารกำกับยา และข้อความของคำเตือน ฉบับที่ ..

(๓) ปรับขนาดบรรจุเป็นแผงละ ๑๐ เม็ด และจัดทำ catch cover หรือแยกบรรจุภัณฑ์ใส่กล่องละ ๑ แผง

(๔) มีเอกสารกำกับยาสำหรับประชาชน (PIL) โดยให้มีข้อความ และรูปแบบตามเอกสารท้ายคำสั่งนี้ ซึ่งขนาดอักษรต้องไม่เล็กกว่า Tahoma ๑๑ points

ข้อ ๒ คำสั่งนี้ไม่ใช้บังคับกับทะเบียนตำรับยาเพื่อการส่งออก

ข้อ ๓ ให้ผู้รับอนุญาตผลิตยา หรือผู้รับอนุญาตนำหรือส่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร ยื่นคำขอแก้ไขทะเบียนตำรับยาตามข้อ ๑ ให้เป็นไปตามคำสั่งนี้ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับตั้งแต่วันที่คำสั่งนี้มีผลใช้บังคับ เมื่อพ้นกำหนดแล้วกระทรวงสาธารณสุขจะดำเนินการเพิกถอน ทะเบียนตำรับยาที่ไม่ได้ดำเนินการแก้ไขทะเบียนตามกฎหมายต่อไป

ข้อ ๔ คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับนับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ปิยะสกล ศกลสัตย์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

เออร์กอตตามีนหาร์เทรต ๑ มิลลิกรัม กับ แคฟเฟอีน ๑๐๐ มิลลิกรัม ชนิดเม็ด ชื่อการค้าภาษาไทย (ภาษาอังกฤษ)

๑. ยานี้คืออะไร

๑.๑ ยานี้มีชื่อสามัญว่าอะไร

- ยานี้มีส่วนประกอบของยาหลัก ๒ ชนิด คือ เออร์กอตตามีนหาร์เทรต (Ergotamine tartrate) กับ แคฟเฟอีน (Caffeine)

๑.๒ ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้ยานี้สำหรับรักษาไมเกรน

ยานี้เป็นยาในกลุ่ม เออร์กอต จึงห้ามใช้ยานี้ร่วมกับยาด้านไวรัส เช่น ไอวี กลุ่มโปรดีโอโซนอินซิมิเตอร์ (PI) เช่น ริโทนาเรียร์ โลพิโนเรียร์ อะทาชานาเรียร์ ดารูนาเรียร์ ชาครินาเรียร์ ยาจากเชื้อแบคทีเรียกลุ่มน้ำโคร์ไลด์ เช่น อร์โทไทรามีซิน คลาริโตรามีซิน โทรฟีแอนดรอยามีซิน เพราะอาจทำให้พิการหรือเสียชีวิตได้

๒. ข้อควรรู้ก่อนใช้ยา

๒.๑ ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- ห้ามใช้ในผู้ที่เคยแพ้ยา
- ห้ามใช้ในผู้ที่เคยแพ้ยาในกลุ่มเออร์กอตและยา ล็อกต์ หรือ แคฟเฟอีน
- ห้ามใช้ในหญิงที่วางแผนจะตั้งครรภ์ กำลังตั้งครรภ์ และหญิงที่ให้นมบุตร

เอกสารกำกับยาสำหรับประชาชน

- ห้ามใช้ร่วมกับยาจากเชื้อแบคทีเรีย ยาด้านเชื้อไวรัส ยาด้านเชื้อรา หรือยาที่ทำให้หลอดเลือดตีบตัว บางชนิด
- ห้ามใช้ในผู้ที่มีการทำงานของตับหรือไตบกพร่องอย่างรุนแรง
- ห้ามใช้ในผู้ที่เป็นโรคความดันเลือดสูงที่ควบคุมไม่ได้
- ห้ามใช้ในผู้ที่เป็นโรคหัวใจ หรือมีอาการของโรคหลอดเลือดส่วนปลาย
- ห้ามใช้ในผู้ที่มีภาวะติดเชื้อในกระเพาะปัสสาวะ

๒.๒ ข้อควรระวังเมื่อใช้ยา

- ยานี้อาจทำให้เกิดภาวะพิษ เออร์กอต (Ergotism) ได้ อาการที่เกิดได้แก่ ชา ปวดแปลบตามปลายมือปลายเท้า อวัยวะส่วนปลาย มีสีเขียวคล้ำจากการขาดเลือดไปเลี้ยง รุนแรง ถึงเนื้อตายเน่า กรณีที่เกิดอาการดังกล่าว ให้รีบหยุดยาแล้วไปพบแพทย์ทันที
- ไม่ควรใช้ยานี้ร่วมกับยา อาหาร หรือผลไม้ บางชนิด เพราะอาจมีผลต่อการรักษาหรือเกิดอันตรายได้ เนื่องจากเกิดภาวะพิษเออร์กอต เช่น
 - ยาด้านเชื้อรากลุ่มเอโซล เช่น คิโตโนโซล อิทธิโรโนโซล วอริโคโนโซล โคลไดรมาโซล ฟลูโคโนโซล
 - ยาลดความดันในกลุ่มปิดกั้นตัวรับนีต้า เช่น โพรพ拉โนอล
 - ยาลดความดันในกลุ่มปิดกั้นแคลเซียม เช่น เวอราฟามิล ติลไทอาเซน
 - ยา抗มาโคคีด เช่น ซีลต้อน
 - ยาด้านชีมเตรา เช่น ฟลูโวชาเม็น

- ผลไม้ เช่น เกรปฟรุต
- อีนๆ เช่น น้ำดื่มที่มีแคฟเฟอีน น้ำอัดลม ชา กาแฟ

๓. วิธีใช้ยา

๓.๑ ขนาดและวิธีใช้

- ผู้ใหญ่และเด็กอายุ ๑๒ ปีขึ้นไป：
 - เมื่อปวดหัวไมเกรน ให้กินยา ๒ เม็ดทันที ถ้าอาการปวดยังไม่หายภายใน ๓๐ นาที สามารถกินยาได้อีกครั้งละ ๑ เม็ด
 - ใน ๑ วัน กินยานี้ได้ไม่เกิน ๖ เม็ด
 - ใน ๑ สัปดาห์ กินยานี้ได้ไม่เกิน ๑๐ เม็ด
 - หากกินยาต่อเนื่องมาแล้ว ๖ เม็ดภายใน ๑ วัน ต้องหยุดการใช้ยาที่อย่างน้อย ๔ วัน
- เด็กอายุต่ำกว่า ๑๒ ปี : ใช้ตามแพทย์สั่ง

๓.๒ ถ้ากินยาที่เกินขนาดที่แนะนำ ควร怎么办

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติรุนแรง ได้แก่ คลื่นไส้ อาเจียน ห้องเสียกระหายน้ำ ปวดกล้ามเนื้อ ผิวนองเย็นชีด สับสน มีนงง ปวดหัว ง่วงซึม ภาวะชัก หมดสติ 昏迷 ให้รีบทำให้อาเจียน หรือกินผงถ่าน คาร์บอน แล้วรีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

๔. ข้อควรปฏิบัติระหว่างการใช้ยา

- ยานี้ใช้เฉพาะเมื่อมีอาการปวดหัวไมเกรน เจ็บพลันเท่านั้น ไม่มีผลป้องกันการปวดหัวในระยะยาว

เօร์กอตตามีนหาร์เทր 1 มิลลิกรัม กับ แคฟเฟอีน 100 มิลลิกรัม ชนิดเม็ด ชื่อการค้าภาษาไทย (ภาษาอังกฤษ)

- ยานี้เป็นเพียงตัวช่วยหนึ่งในการบรรเทาอาการปวดหัวนั้น ท่านจำเป็นต้องพักผ่อนในที่เงียบสงบ เพื่อให้หายปวดได้เร็วยิ่งขึ้น
- ควรสังเกตอาการต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างใช้ยา นี้ กรณ์ถ้าพบความผิดปกติขึ้นให้รีบไปพบแพทย์
- หากกินยาหนึ่งไปแล้ว 10 เม็ด แต่อารมณ์ไม่ดีขึ้น ควรพบแพทย์

เอกสารกำกับยาสำหรับประชาชน

- แกะยาออกจากแพลง เมื่อจะกินในแต่ละครั้ง เท่านั้น
- เก็บในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิ (ปรับตามทะเบียนยา)
- ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถยนต์ ห้องน้ำ ห้องครัว เป็นต้น
- เก็บยาหนึ่งให้พ้นมือเด็ก

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยา และรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกด้า ริมฝีปาก ลมพิษ ผื่นแพ้
- ภาวะพิษเօร์กอต โดยสังเกตจากการดื่มน้ำ
 - ชา ปวดแปลบตามปลายมือปลายเท้า
 - ปลายมือ ปลายเท้า มีสีม่วงคล้ำจากการขาดเลือดไปเลี้ยง เนื้อตายเน่า

ข้อมูล yanี้เป็นข้อมูลโดยย่อ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า ชื่อและที่อยู่ (ปรับตามทะเบียนยา)

ผู้แทนจำหน่าย ชื่อและที่อยู่ (ปรับตามทะเบียนยา)

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ วัน เดือน ปี (พ.ศ.)

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- คลื่นไส้ อาเจียน ห้องเสีย มึนงง ปวดหัว ตามปลายมือปลายเท้า

6. ควรเก็บยาหนึ่งอย่างไร

- เก็บยาไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา