

## ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง ยาที่ต้องแจ้งคำเตือนการใช้ยาไว้ในฉลากและที่เอกสารกำกับยา  
และข้อความของคำเตือน  
ฉบับที่ ๘

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖ (๕) แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยคำแนะนำของคณะกรรมการยา ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความใน (๓๑) ของข้อ ๓ แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาที่ต้องแจ้งคำเตือนการใช้ยาไว้ในฉลากและที่เอกสารกำกับยา และข้อความของคำเตือน ฉบับลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๓ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“(๓๑) ยาจำพวกสารหนู (Arsenic) ที่ใช้สำหรับสัตว์

(๓๑.๑) ยาจำพวกสารหนู (Arsenic) ที่ใช้สำหรับไก่

“คำเตือน: (๑) ห้ามใช้กับไก่ระยะออกไข่

(๒) ให้หยุดยาที่ใช้กับไก่ ไก่วง ก่อน  
ฆ่า ๕ วัน”

(๓๑.๒) ยาจำพวกสารหนู (Arsenic) ที่ใช้สำหรับสุกร

“คำเตือน : ให้หยุดยาก่อนฆ่า ๕ วัน”

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความใน (๓๓) ของข้อ ๓ แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาที่ต้องแจ้งคำเตือนการใช้ยาไว้ในฉลากและที่เอกสารกำกับยา และข้อความของคำเตือน ฉบับลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาที่ต้องแจ้งคำเตือนการใช้ยาไว้ในฉลากและที่เอกสารกำกับยา และข้อความของคำเตือน ฉบับที่ ๕ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(๓๓) ยาสำหรับควบคุมโรคบิดในสัตว์ (Anticoccidia) ดังต่อไปนี้

(๓๓.๑) ยาแอมโพรเลียม (Amprolium)

(๓๓.๑.๑) ยาแอมโพรเลียม (Amprolium) ที่ใช้สำหรับไก่

“คำเตือน : ห้ามใช้เป็นยาควบคุมโรคบิด สำหรับไก่  
และไก่งวง อายุเกิน ๑๖ สัปดาห์”

(๓๓.๑.๒) ยาแอมโพรเลียม (Amprolium) ที่ใช้สำหรับ  
ลูกวัว

“คำเตือน : ให้หยุดยาก่อนฆ่า ๒๔ ชั่วโมง”

(๓๓.๒) ยาโคลปีโดล (Clopidol)

(๓๓.๒.๑) ยาโคลปีโดล (Clopidol) ที่ใช้สำหรับไก่

“คำเตือน : (๑) ห้ามใช้เป็นยาควบคุมโรคบิดสำหรับ  
ไก่ อายุเกิน ๑๖ สัปดาห์

(๒) ให้หยุดยาที่ใช้กับไก่ ไก่งวง ก่อน  
ฆ่า ๕ วัน”

- (๓๓.๒.๒) ยาโคลปีโดล (Clopidol) ที่ใช้สำหรับสุกร  
“คำเตือน : ให้อุณหภูมิห้องก่อนฆ่า ๕ วัน”
- (๓๓.๒.๓) ยาโคลปีโดล (Clopidol) ที่ใช้สำหรับโค  
“คำเตือน : ให้อุณหภูมิห้องก่อนฆ่า ๕ วัน”
- (๓๓.๓) ยาดีโคควินาท (Decoquinat)
- (๓๓.๓.๑) ยาดีโคควินาท (Decoquinat) ที่ใช้สำหรับไก่  
“คำเตือน : (๑) ห้ามใช้เป็นยาควบคุมโรคบิดสำหรับ  
ไก่ระยะออกไข่  
(๒) ให้อุณหภูมิห้องก่อนฆ่า ๕ วัน”
- (๓๓.๓.๒) ยาดีโคควินาท (Decoquinat) ที่ใช้สำหรับโค  
“คำเตือน : (๑) ให้ใช้ในโคขุนเท่านั้น  
(๒) ให้อุณหภูมิห้องก่อนฆ่า ๕ วัน”
- (๓๓.๔) ยาฟูราโซลิโดน (Furazolidone) ที่ใช้สำหรับ  
สัตว์ปีก
- “คำเตือน : (๑) ห้ามใช้เป็นยาควบคุมโรคบิดสำหรับ  
เป็ด นกกระทาในระยะออกไข่ และ  
ไก่ ไก่วง อายุเกิน ๑๔ สัปดาห์  
(๒) ให้อุณหภูมิห้องก่อนฆ่า ๕ วัน”
- (๓๓.๕) ยาลาซาโลซิด (Lasalocid) ที่ใช้สำหรับไก่  
“คำเตือน : ให้อุณหภูมิห้องก่อนฆ่า ๓ วัน”

(๓๓.๖) ยาโมเนนซิน (Monensin) ที่ใช้สำหรับไก่  
 “คำเตือน : (๑) ห้ามใช้เป็นยาควบคุมโรคบิดสำหรับ  
 ไก่อระยะออกไข่  
 (๒) ห้ามใช้กับม้า เพราะอาจเป็น  
 อันตรายถึงตายได้”

(๓๓.๗) ยานิคบาซิน (Nicarbazin) ที่ใช้สำหรับไก่  
 “คำเตือน : (๑) ห้ามใช้เป็นยาควบคุมโรคบิดสำหรับ  
 ไก่อระยะออกไข่  
 (๒) ให้หยุดยาก่อนฆ่า ๔ วัน”

(๓๓.๘) ยาโรบินิดิน (Robenidine) ที่ใช้สำหรับไก่  
 “คำเตือน : (๑) ห้ามใช้เป็นยาควบคุมโรคบิดสำหรับ  
 ไก่อระยะออกไข่  
 (๒) ให้หยุดยาก่อนฆ่า ๖ วัน”

(๓๓.๙) ยาซาลิโนไมซิน (Salinomycin) ที่ใช้สำหรับไก่  
 “คำเตือน : (๑) ห้ามใช้เป็นยาควบคุมโรคบิดสำหรับ  
 ไก่อระยะออกไข่  
 (๒) ห้ามใช้กับไก่วงและม้า เพราะ  
 อาจเป็นอันตรายถึงตายได้”

(๓๓.๑๐) ยาซัลฟาควินออกซาลีน (Sulfaquinoxaline) ที่ใช้  
 สำหรับไก่

“คำเตือน : (๑) ห้ามใช้บนยาควบคุมโรคบิดสำหรับ  
ไก่ และไก่วง ระยะออกไข่  
(๒) ให้หยุดยาที่ใช้กับไก่ ไก่วง ก่อน  
ฆ่า ๑๐ วัน”

(๓๓.๑๑) ยาโซอะลีน (Zoalene) ที่ใช้สำหรับไก่

“คำเตือน : (๑) ห้ามใช้เป็นยาควบคุมโรคบิดสำหรับไก่  
ระยะออกไข่  
(๒) ให้หยุดยาที่ใช้กับไก่ก่อนฆ่า ๕ วัน”

ข้อ ๓ ประกาศฉบับนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราช  
กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕

ไพโรจน์ นิงสานนท์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข