

ປະກາສກຮຽນສູງ

ເຮືອງ ຍາທີ່ຕ້ອງແຈ້ງຄໍາເຕືອນການໃຊ້ຢາໄວ້ໃນຝລາກແລະທີ່ເອກສາຮຳກັບຢາ
ແລະຂໍ້ຄວາມຂອງຄໍາເຕືອນ
ນັບທີ່ ๓๗

ອາຫຍືຈຳນາຈດາມຄວາມໃນມາຕາ ລົ (ຂ) ແຫ່ງພຣະຣາຊບັນຍຸຕິຍາ ພ.ສ. ແກຊ ໨໫໫໠ ຜຶ່ງແກ້ໄຂເພີ່ມເຕີມ ໂດຍພຣະຣາຊບັນຍຸຕິຍາ (ນັບທີ່ ๓) ພ.ສ. ແກຊ ແລະມາຕາ ລົ ແຫ່ງພຣະຣາຊບັນຍຸຕິຍາ ພ.ສ. ແກຊ ໨໫໫໠ ຮັ້ງມັນຕີ່ວ່າກາຮັກຮຽນສູງ ໂດຍຄໍາແນະນຳຂອງຄົນະກຽມກາຍາອອກປະກາສໄວ້ ດັ່ງຕ່ອໄປນີ້

ຂໍ້ອ ໃຫ້ເພີ່ມຄວາມຕ່ອໄປນີ້ເປັນ (ຂໍ້ອ ๕) ແລະ (ຂໍ້ອ ๖) ຂອງຂໍ້ອ ๓ ແຫ່ງປະກາສກຮຽນສູງ ເຮືອງ ຍາທີ່ຕ້ອງແຈ້ງຄໍາເຕືອນການໃຊ້ຢາໄວ້ໃນຝລາກແລະທີ່ເອກສາຮຳກັບຢາແລະຂໍ້ຄວາມຂອງຄໍາເຕືອນ ລົງວັນທີ ១៦ ກຸມພັນນີ້ ພ.ສ. ແກຊ ແລະ ຜຶ່ງແກ້ໄຂເພີ່ມເຕີມ ໂດຍປະກາສກຮຽນສູງ ເຮືອງ ຍາທີ່ຕ້ອງແຈ້ງຄໍາເຕືອນການໃຊ້ຢາໄວ້ໃນຝລາກແລະທີ່ເອກສາຮຳກັບຢາແລະຂໍ້ຄວາມຂອງຄໍາເຕືອນ ນັບທີ່ ៣៦ ລົງວັນທີ ១៩ ພຖຍກາຄມ ພ.ສ. ແກຊ ແລະໃຫ້ໃຫ້ຄວາມຕ່ອໄປນີ້

“(ຂໍ້ອ ๕) ນໍາຢາແຊ່ເລັນສີ

“ຄໍາເຕືອນໃນຝລາກແລະເອກສາຮຳກັບຢາ :

១. ໂປຣຄໃຊ້ຕາມທີ່ຮະບູໃນເອກສາຮຳກັບຢາ ບາກໄມ່ປົງບັດຕາມອາຈກ່ອໃຫ້ເກີດກາຣຕິດເຊື່ອຕ່ອດວັງຕາໄດ້

២. ບາກເກີດກາຣະຄາຍເຄື່ອງ ຕາແດງ ອີ່ອກາມອອງເຫັນຜົດປົກຕິ ຕ້ອງຄອດເລັນສີອຸກແລະຮົບປີກາຍແພທບໍ່”

(ຂໍ້ອ ៤) ເດັກໜີໂຕຣເມໂທອ່ວແຟນ (Dextromethorphan) ທີ່ເປັນຕໍ່ຮັບຢາເຄີຍວາ

ຄໍາເຕືອນໃນຝລາກແລະເອກສາຮຳກັບຢາ :

ຢາເມື່ດ

ໃນຢາ ១ ເມື່ດປະກອບດ້ວຍເດັກໜີໂຕຣເມໂທອ່ວແຟນ ១៥ ມີລິກຣັນ ໃຫ້ໃຫ້ຂໍ້ຄວາມຄໍາເຕືອນ ດັ່ງນີ້

“ຢາເດັກໜີໂຕຣເມໂທອ່ວແຟນນີ້ໃຊ້ບຣເທາອາກາຣໄອ ເມື່ອໃຊ້ໃນຂາດທີ່ຖຸກຕ້ອງຕາມທີ່ຮະບູໄວ້ໃນເອກສາຮຳກັບຢາ ບາກໃຊ້ໃນຂາດທີ່ສູງ (ມາກກວ່າ ១២០ ມີລິກຣັນຫຼື ៨ ເມື່ດຕ່ວັນໃນຜູ້ໄໝ່ ແລະ ມາກກວ່າ ៦០ ມີລິກຣັນ ຫຼື ៤ ເມື່ດຕ່ວັນໃນເດັກ) ຈະກົດກາຣ້າຍໃຈ ຜຶ່ງອາຈເປັນອັນຕຽຍຄິງແກ່ໜີວິດ”

ໃນຢາ ១ ເມື່ດປະກອບດ້ວຍເດັກໜີໂຕຣເມໂທອ່ວແຟນ ៣០ ມີລິກຣັນ ໃຫ້ໃຫ້ຂໍ້ຄວາມຄໍາເຕືອນ ດັ່ງນີ້

“ยาเด็กซ์โตรเมธอร์แฟนนี่ใช้บรรเทาอาการไอ เมื่อใช้ในขนาดที่ถูกต้องตามที่ระบุไว้ในเอกสารกำกับยา หากใช้ในขนาดที่สูง (มากกว่า ๑๒๐ มิลลิกรัมหรือ ๔ เม็ดต่อวันในผู้ใหญ่ และมากกว่า ๖๐ มิลลิกรัมหรือ ๒ เม็ดต่อวันในเด็ก) จะกดการหายใจ ซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต”

ยาน้ำ

ในยา ๑ มิลลิลิตรประกอบด้วยเด็กซ์โตรเมธอร์แฟน ๕ มิลลิกรัม ให้ใช้ข้อความคำเตือน ดังนี้

“ยาเด็กซ์โตรเมธอร์แฟนนี่ใช้บรรเทาอาการไอ เมื่อใช้ในขนาดที่ถูกต้องตามที่ระบุไว้ในเอกสารกำกับยา หากใช้ในขนาดที่สูง (มากกว่า ๑๒๐ มิลลิกรัมหรือ ๒๕ มิลลิลิตร หรือ ๕ ช้อนชาต่อวันในผู้ใหญ่ และมากกว่า ๖๐ มิลลิกรัมหรือ ๑๒.๕ มิลลิลิตร หรือ ๒ ช้อนชาครึ่งต่อวันในเด็ก) จะกดการหายใจ ซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต”

ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพื้นกำหนดนิ่งร้อยแปดสิบวันนับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๐

มงคล ณ สงขลา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข