

หลักเกณฑ์การโฆษณาขายยาต่อประชาชนทั่วไป (เพิ่มเติม)

การแสดงข้อความในโฆษณาที่มี แอสไพรีน เป็นส่วนประกอบของตำรับยา

- ในการโฆษณาขายยาให้แสดงคำเตือนเป็น “อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา”* และ “ห้ามใช้แก้ปวด ลดไข้ ในเด็กและผู้มีอายุต่ำกว่า 18 ปีนอกจากแพทย์สั่ง ผู้ป่วยใช้หัวใจใหญ่ ใช้เลือดออก อีสุกอีใส” ในสื่อต่าง ๆ ดังนี้ ทางสื่อที่มีทั้งภาพและเสียง เช่น โทรทัศน์ , Internet
 1. ให้แสดงคำเตือนในส่วนของเสียงฟังได้ชัดเจนทุกพยางค์ และ
 2. ให้แสดงคำเตือนเป็นอักษรลอยไม่น้อยกว่า 5 วินาที ขนาดความสูงตัวอักษรไม่น้อยกว่าหนึ่งใน 25 ส่วนของขนาดความสูงของภาพ ภายในกรอบพื้นที่กรอบขนาด 1 ส่วนใน 10 ส่วนของความสูงของจอภาพโดยมีรูปแบบของตัวอักษรอ่านง่ายและชัดเจน วางไว้ ณ ตำแหน่งด้านบนหรือด้านล่างสุดของพื้นที่โฆษณาทางสื่อที่มีเสียง เช่น วิทยุ
 1. ให้แสดงคำเตือนในส่วนของเสียงฟังได้ชัดเจนทุกพยางค์ และทางสื่อที่มีภาพและ/หรือข้อความ เช่น หนังสือพิมพ์ , นิตยสาร, Internet
 1. ให้แสดงในคำเตือนตามแนวนอนอยู่ด้านบนสุดของพื้นที่โฆษณา ด้วยตัวอักษรสีขาวบนแถบสีเข้มมีขนาดของพื้นที่คำเตือนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของพื้นที่โฆษณา และขนาดของตัวอักษรไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของพื้นที่คำเตือนโดยให้สามารถอ่านได้ชัดเจน น
- ในการโฆษณาขายยาตำรับยาที่มีแอสไพรีนเป็นส่วนประกอบทั้งตำรับยาเดี่ยวและยาผสมให้แสดงชื่อสามัญทางยา (Generic Name) อย่างชัดเจน หากเป็นสื่อที่มีทั้งภาพและเสียงให้แสดงชัดเจนทั้งภาพและเสียง