

## ยาลดกรด

### อะลูมินา-แมกนีเซียม

#### ชนิดเม็ดและชนิดน้ำแขวนตะกอน

### 1. ยานี้คืออะไร

#### 1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้ชื่อว่า อะลูมิเนียม ไฮดรอกไซด์ (aluminium hydroxide) และ แมกนีเซียม ไฮดรอกไซด์ (magnesium hydroxide)

#### 1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้เพื่อบรรเทาอาการจุกเสียด ท้องอืด ท้องเฟ้อ และปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารหรือแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้

### 2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

#### 2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือแพ้ส่วนประกอบของยานี้
- เป็นโรคหัวใจหรือโรคไต
- รู้สึกอ่อนล้าอ่อนเพลียมาก ไม่มีแรง
- มีอาการปวดท้องอย่างรุนแรง
- มีภาวะลำไส้ตีบตัน หรืออุดตัน

#### 2.2 ข้อควรระวัง เพื่อความปลอดภัย ให้บอกแพทย์หรือเภสัชกรหากท่านมีภาวะต่อไปนี้

- ใช้ยา สมุนไพร อาหารเสริมอื่นอยู่
- หญิงมีครรภ์ หรืออยู่ระหว่างให้นมลูก

### 3. วิธีใช้ยา

#### 3.1 ขนาดและวิธีใช้

- กินภายใน 20 นาที ถึง 1 ชั่วโมงหลังอาหาร และก่อนนอน หรือเมื่อมีอาการ
- ยาเม็ด: เคี้ยวให้ละเอียดก่อนกลืน
  - ผู้ใหญ่: กินครั้งละ 1-4 เม็ด
  - เด็ก 6-12 ปี: กินครั้งละ 1-2 เม็ด
- ยาน้ำ: เขย่าขวดก่อนใช้ยา
  - ผู้ใหญ่: กินครั้งละ 1-4 ช้อนชา
  - เด็ก 6-12 ปี: กินครั้งละ 1-2 ช้อนชา
  - เด็ก 3-6 ปี: กินครั้งละ 0.5-1 ช้อนชา

#### 3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- หากยังมีอาการของโรคอยู่ ให้กินยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าใกล้เวลาของมื้อต่อไป ให้รอกินยาของมื้อต่อไป ห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

#### 3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปโรงพยาบาลพร้อมนำยานี้หรือบรรจุภัณฑ์ยาติดตัวไปด้วย

### 4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยานี้

- ไม่นำยานี้ให้ผู้อื่นกิน แม้ว่าจะเป็นโรคหรือมีอาการเดียวกัน เพื่อความปลอดภัยในการใช้ยา
- ไม่ควรใช้ยานี้มากกว่า 2 สัปดาห์ หากอาการไม่ดีขึ้น ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
- ห้ามกินยาพร้อมกับยาอื่น ควรกินยานี้ห่างจากยาอื่น 2 ชั่วโมง เพราะยานี้อาจจะติดกันกับยาอื่น

### 5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

#### 5.1 อาการที่ต้องรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผื่นหนังหลุดลอก

#### 5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องรีบไปพบแพทย์ ยกเว้นกรณีมีอาการรุนแรง

- ท้องผูกหรือท้องเสีย

### 6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

### 7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

**ลักษณะยาเม็ด:** ยาเม็ดกลมสีขาว หรือสีขาวหม่น  
ตัวยาสําคัญ:

- อะลูมิเนียม ไฮดรอกไซด์
- แมกนีเซียม ไฮดรอกไซด์

ขนาดบรรจุ:

- ยาเม็ด แผงพลาสติกหรืออะลูมิเนียมละ 4 หรือ 10เม็ด

**ลักษณะยาน้ำ:** ยาน้ำแขวนตะกอนมีสีขาวขุ่น  
ตัวยาสําคัญ:

- อะลูมิเนียม ไฮดรอกไซด์
- แมกนีเซียม ไฮดรอกไซด์

ขนาดบรรจุ:

- ยาน้ำ ขวดละ 240 หรือ 450 มิลลิลิตร

เอกสารฉบับนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด 19 กุมภาพันธ์ 2564

ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th>

**ข้อมูลยานี้เป็นข้อมูลโดยย่อ  
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**



