

ยาลดกรด

อะลูมินา-แมกนีเซียม-ไซเมธิโคน
ชนิดเม็ดและชนิดน้ำแขวนตะกอน

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้ชื่อว่า อะลูมิเนียม ไฮดรอกไซด์ (aluminium hydroxide) และ แมกนีเซียม ไฮดรอกไซด์ (magnesium hydroxide) และ ไซเมธิโคน (simethicone)

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้เพื่อบรรเทาอาการจุกเสียด ท้องอืด ท้องเฟ้อ และปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารหรือแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ และช่วยขับลม

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือแพ้ส่วนประกอบของยานี้
- เป็นโรคหัวใจหรือโรคไต
- รู้สึกอ่อนล้าอ่อนเพลียมาก ไม่มีแรง
- มีภาวะฟอสเฟตในเลือดต่ำ

2.2 ข้อควรระวัง เพื่อความปลอดภัย ให้บอกแพทย์หรือเภสัชกรหากท่านมีภาวะต่อไปนี้

- ใช้ยา สมุนไพร อาหารเสริมอื่นอยู่
- หญิงมีครรภ์ หรืออยู่ระหว่างให้นมลูก

ข้อมูลยานี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- กินภายใน 20 นาที ถึง 1 ชั่วโมงหลังอาหาร และก่อนนอน หรือเมื่อมีอาการ
- ยาเม็ด: เคี้ยวให้ละเอียดก่อนกลืน
 - ผู้ใหญ่: กินครั้งละ 1-4 เม็ด
 - เด็ก 6-12 ปี: กินครั้งละ 1-2 เม็ด
- ยาน้ำ: เขย่าขวดก่อนใช้ยา
 - ผู้ใหญ่: กินครั้งละ 1-4 ช้อนชา
 - เด็ก 6-12 ปี: กินครั้งละ 1-2 ช้อนชา
 - เด็ก 3-6 ปี: กินครั้งละ 0.5-1 ช้อนชา

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- หากยังมีอาการของโรคอยู่ ให้กินยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าใกล้เวลาของมื้อต่อไปให้รอกินยาของมื้อต่อไป ห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติ ให้รีบไปโรงพยาบาลพร้อมนำยานี้หรือบรรจุภัณฑ์ยาติดตัวไปด้วย

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยานี้

- ไม่นำยานี้ให้ผู้อื่นกิน แม้ว่าจะเป็นโรคหรือมีอาการเดียวกัน เพื่อความปลอดภัยในการใช้ยา
- ไม่ควรใช้ยานี้นานกว่า 2 สัปดาห์ หากอาการไม่ดีขึ้น ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
- ห้ามกินยาพร้อมกับยาอื่น ควรกินยานี้ห่างจากยาอื่น 2 ชั่วโมง เพราะยานี้อาจจะติดกันกับยาอื่น

เอกสารฉบับนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด 29 มกราคม 2564

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องรีบไปพบแพทย์

ยกเว้นกรณีที่อาการรุนแรง

- ท้องผูกหรือท้องเสีย

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- ลักษณะยา: ยาเม็ด หรือ ยาน้ำมีสีขาวขุ่น
 - ตัวยาสาคัญ:
 - อะลูมิเนียม ไฮดรอกไซด์
 - แมกนีเซียม ไฮดรอกไซด์
 - ไซเมธิโคน
 - ขนาดบรรจุ:
 - ยาเม็ด แผงพลาสติกหรืออะลูมิเนียมละ 4,10เม็ด
 - ยาน้ำ ขวดละ 240 และ 450 มิลลิลิตร
- ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.**
- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
 - <http://ndi.fda.moph.go.th>

