

ยาผงฟูชนิดทริกแอซิด-โซเดียมไบคาร์บอเนต-โซเดียมคาร์บอเนต ชนิดผงฟูละลายน้ำ

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้ชื่อว่า ซิตริกแอซิด (citric acid anhydrous) ผสม โซเดียมไบคาร์บอเนต (sodium bicarbonate) และ โซเดียมคาร์บอเนต (sodium carbonate)

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้เพื่อลดกรด บรรเทาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ เนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหาร

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือแพ้ส่วนประกอบของยานี้
- เป็นโรคหัวใจ
- เป็นโรคไต หรือ โรคตับ
- เป็นโรคความดันเลือดสูง
- อายุต่ำกว่า 12 ปี (ยกเว้นแพทย์สั่ง)

2.2 ข้อควรระวัง เพื่อความปลอดภัย ให้บอกแพทย์หรือเภสัชกรหากท่านมีภาวะต่อไปนี้

- ใช้ยา สมุนไพร อาหารเสริมอื่นอยู่
- หญิงมีครรภ์ หรือ อยู่ระหว่างให้นมลูก

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ผสมน้ำก่อนแก้วรับประทาน หลังหมดฟองฟู
- ผู้ใหญ่และเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป:
 - กินครั้งละ 1 ชง
- กินซ้ำได้อีกภายใน 2-3 ชั่วโมง ถ้าต้องการ

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- หากไม่มีอาการแล้ว สามารถหยุดยาได้

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติ ให้รีบไปโรงพยาบาลพร้อมนำยานี้หรือบรรจุภัณฑ์ยาติดตัวไปด้วย

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยานี้

- ไม่นำยานี้ให้ผู้อื่นกิน แม้ว่าจะเป็นโรคหรือมีอาการเดียวกัน เพื่อความปลอดภัยในการใช้ยา
- หากใช้ยาแล้วยังคงมีอาการหรืออาการไม่ดีขึ้น ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
- ไม่ควรใช้ยานี้มากกว่า 2 สัปดาห์

ข้อมูลยานี้เป็นข้อมูลโดยย่อ หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th>

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เบื้องตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก
- บวมน้ำ หายใจลำบาก

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องรีบไปพบแพทย์

- ยกเว้นกรณีที่อาการรุนแรง
- ปวดท้อง ท้องอืด ท้องเฟ้อ

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- ลักษณะยา: ผงมีสีอ่อน ๆ หรือสีขาว
- ด้วยาสาคัญ:
 - ซิตริกแอซิด ไม่เกิน 1.85 กรัม
 - โซเดียมไบคาร์บอเนต ไม่เกิน 1.96 กรัม
 - โซเดียมคาร์บอเนต ไม่เกิน 0.43 กรัม
- ขนาดบรรจุ: ซองอลูมิเนียม ไม่เกิน 4.3 กรัม

เอกสารฉบับนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด 22 กุมภาพันธ์ 2564

