

ยาแก้ไอน้ำดำ

ชนิดน้ำ

ประกอบด้วย

สารสกัดชะเอมเทศ

0.6 มิลลิลิตร ต่อ 5 มิลลิลิตร

แอนติโมนีโพแทสเซียมทาร์เตรต

1.2 ถึง 2 มิลลิกรัม ต่อ 5 มิลลิลิตร

ทิงเจอร์ฝิ่นการบูร

0.6 มิลลิลิตร ต่อ 5 มิลลิลิตร

1. ยานี้คืออะไร

1.1. ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้ชื่อว่า ยาแก้ไอน้ำดำ
- เป็นยาในกลุ่ม ยาแก้ไอขับเสมหะ

1.2. ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้บรรเทาอาการไอ ขับเสมหะ

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1. ห้ามใช้ยานี้เมื่อไหร่

- เคยแพ้ยานี้ หรือ ส่วนประกอบของยานี้
- ผู้ที่มีอาการท้องร่วงเนื่องจากอาหารเป็นพิษ
- ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ และเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี

2.2. ข้อควรระวัง เพื่อความปลอดภัย ให้บอกแพทย์

หากท่านมีภาวะต่อไปนี้

- มีประวัติแพ้ยากลุ่มโอปิออยด์
- ดับหรือไตทำงานบกพร่อง
- มีการทำงานของต่อมไทรอยด์ ต่อมหมวกไต หรือต่อมอดิพิต
- มีโรคหืด ต่อมลูกหมากโต ลมชัก อ้วน หรือโรคหัวใจ
- เคยได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงที่ศีรษะ
- มีประวัติติดสารเสพติด
- วางแผนจะตั้งครรภ์ หรืออยู่ระหว่างให้นมบุตร
- ใช้ยา สมุนไพร หรืออาหารเสริมอื่นอยู่

“สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
ถ้าไม่แน่ใจว่ามีภาวะดังกล่าวหรือไม่”

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- เด็ก 6-12 ปี กินครั้งละ ครั้ง ถึง 1 ช้อนชา (2.5-5 มิลลิลิตร)
- ผู้ใหญ่ กินครั้งละ 1-2 ช้อนชา (5-10 มิลลิลิตร)
- กินยานี้วันละ 3-4 ครั้ง เมื่อมีอาการไอ

3.2 ถ้าลืมกินยาควรทำอย่างไร

- หากยังมีอาการอยู่ สามารถกินยาได้ในมื้อถัดไป
- ไม่แนะนำให้เพิ่มขนาดยาเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยาเกินขนาดที่แนะนำควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด และรีบไปโรงพยาบาล พร้อมยานี้หรือบรรจุภัณฑ์ทันทีหากมีอาการผิดปกติ

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ห้ามกินยานี้ติดต่อกันเกิน 3 วัน เนื่องจากทำให้เกิดอาการดื้อยา และติดยาได้
- ยานี้มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่ ควรใช้ด้วยความระมัดระวัง
- หลีกเลี่ยงการขับรถหรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร หลังจากใช้ยานี้ เนื่องจากยานี้ทำให้ง่วงซึมได้

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผิวหนังลอก ผื่นแดง ตุ่มพอง
- ชัก
- การมองเห็นเปลี่ยนแปลงไป เห็นภาพไม่ชัด
- มึนงง สับสน อารมณ์แปรปรวน เห็นภาพหลอน
- ปวดท้องหรือปวดหลังอย่างรุนแรง ซึ่งอาจเป็นอาการของโรคเกี่ยวกับต่อมอดิพิต

“ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์”

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรง ให้ไปพบแพทย์

- ปวดหัว เวียนหัว
- ง่วงซึม
- นอนไม่หลับ
- ปากแห้ง คอแห้ง
- คลื่นไส้ อาเจียน ท้องผูก เมื่ออาหาร
- บัสสาวะออกน้อย หรือบัสสาวะลำบาก

“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา
แต่ถ้ามีอาการรุนแรง ให้ไปพบแพทย์”

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บยาในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อบอุ่นแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส หรือในที่ชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ หรือห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- **ยามีลักษณะ** เป็นน้ำ บรรจุในขวดปริมาตร 60 มิลลิลิตร
- **ตัวยาสำคัญ** คือ
 - สารสกัดชะเอมเทศ (Glycyrrhiza fluidextract) 0.6 มิลลิลิตร ต่อ 5 มิลลิลิตร
 - แอนติโมนีโพแทสเซียมทาร์เตรต (Antimony potassium tartrate) 1.2 ถึง 2 มิลลิกรัม ต่อ 5 มิลลิลิตร
 - ทิงเจอร์ฝิ่นการบูร (Camphorated opium tincture) 0.6 มิลลิลิตร ต่อ 5 มิลลิลิตร

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด 24 มกราคม 2565

ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.
<http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
<http://ndi.fda.moph.go.th>

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัย
ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร