

ยาเม็ดแก้แพ้ ลดน้ำมูก คลอร์เฟนิรามีน  
ความแรง 2 มิลลิกรัม  
ชนิดเม็ด

## 1. ยานี้คืออะไร

### 1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้ชื่อว่า คลอร์เฟนิรามีน (chlorpheniramine)

### 1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้เพื่อบรรเทาอาการต่าง ๆ จากการแพ้ เช่น น้ำมูกไหล ตาแดง คันดา คันจมูก ในโรคเยื่อจมูกอักเสบหรือไข้ละอองฟาง หรือ เพื่อบรรเทาอาการแพ้บริเวณผิวหนัง เช่น ลมพิษ

## 2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

### 2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือแพ้ส่วนประกอบของยานี้
- ใช้ยาต้านซึมเศร้าประเภท " ยับยั้ง โมโนเอไมน์ ออกซิเดส" ในช่วง 14 วันที่ผ่านมา

### 2.2 ข้อควรระวัง เพื่อความปลอดภัย ให้บอกแพทย์หรือเภสัชกรหากท่านมีภาวะต่อไปนี้

- ใช้ยา สมุนไพร อาหารเสริมอื่นอยู่
- เป็นโรคความดันเลือดสูง หรือ โรคหัวใจ
- ไต หรือ ตับ ทำงานผิดปกติ
- ผู้ป่วยโรคลมชัก
- ผู้ป่วยโรคหอบหืด
- ต่อมลูกหมากโต มีภาวะปัสสาวะขัด
- หญิงตั้งครรภ์ หรืออยู่ระหว่างให้นมบุตร
- เป็นต่อหิน ความดันในลูกตาสุง

## 3. วิธีใช้ยา

### 3.1 กินยานี้อย่างไร

- ผู้ใหญ่: กินครั้งละ 1-2 เม็ด ไม่เกิน 12 เม็ด/วัน
- เด็ก 6-12 ปี: กินครั้งละ 1 เม็ด ไม่เกิน 6 เม็ด/วัน
- กินทุก 4-6 ชั่วโมง เมื่อมีอาการ

### 3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- หากยังมีอาการของโรคอยู่ ให้กินยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าใกล้เวลาของมื้อต่อไปให้รอกินยาของมื้อต่อไป ห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า
- หากไม่มีอาการของโรคแล้วสามารถหยุดยาได้

### 3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด และรีบไปโรงพยาบาลพร้อมยานี้หรือบรรจุภัณฑ์ทันทีหากมีอาการผิดปกติ

## 4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยานี้

- ไม่มียานี้ให้ผู้อื่นกิน แม้ว่าจะเป็นโรคหรือมีอาการเดียวกัน
- ยานี้อาจทำให้เกิดอาการง่วงซึมได้ ควรหลีกเลี่ยงการขับขีรถหรือทำงานกับเครื่องจักร
- ไม่ควรกินร่วมกับสุราหรือสิ่งที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ
- ไม่ควรใช้ยานี้นานกว่า 1 สัปดาห์ หากอาการไม่ดีขึ้น ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

ข้อมูลยานี้เป็นข้อมูลโดยย่อ  
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ [อย.](http://www.fda.moph.go.th)

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th>

## 5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

### 5.1 อาการที่ต้องรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตาริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีไข้
- ตัวเหลือง ตาเหลือง ดีซ่าน ซึ่งอาจเกิดจากความผิดปกติที่ตับ
- ปัสสาวะขัด ปัสสาวะออกน้อยลง

### 5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องรีบไปพบแพทย์ ยกเว้นกรณีที่อาการรุนแรง

- ปากแห้ง คอแห้ง จมูกแห้ง
- ง่วงซึม เหนื่อย เพลีย ไม่มีแรง
- คลื่นไส้ ท้องเสีย ไม่สบายท้อง

## 6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

## 7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- ลักษณะยา: ยาเม็ด
  - ตัวยาสาคัญ: คลอร์เฟนิรามีน 2 มิลลิกรัม
  - ขนาดบรรจุ: แผงพลาสติกหรืออะลูมิเนียม 4 และ 10 เม็ด
- เอกสารฉบับนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด 3 กุมภาพันธ์ 2565

