

ยาทาแก้ผดผื่นคัน กาลาไมน์ ชนิดโลชั่น

ยาใช้ภายนอก ห้ามรับประทาน

1. ยานี้คืออะไร

1.1. ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้เป็นยาสูตรผสม มีตัวยาคือ กาลาไมน์ (Calamine) และ ซิงค์ออกไซด์ (Zinc oxide)

1.2. ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ยานี้ใช้เพื่อบรรเทาอาการคันเนื่องจากผดผื่นคัน ลมพิษ

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1. ห้ามใช้ยานี้เมื่อไหร่

- เคยแพ้ยานี้ หรือ ส่วนประกอบของยานี้

2.2. ข้อควรระวัง

เพื่อความปลอดภัย ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
หากท่านมีอาการต่อไปนี้

- ตั้งท้อง วางแผนจะตั้งท้อง หรืออยู่ระหว่างให้นมบุตร
- ใช้ยา สมุนไพร หรืออาหารเสริมอื่นอยู่

**“สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
ถ้าไม่แน่ใจว่ามีภาวะดังกล่าวหรือไม่”**

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ทายาบริเวณที่มีอาการ วันละ 3-4 ครั้ง
- เชย่าขวดก่อนใช้ยา
- ยานี้สำหรับใช้ภายนอกเท่านั้น
- ห้ามกินยานี้เด็ดขาด

3.2 ถ้าใช้ยาเกินขนาดที่แนะนำควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนและหลังใช้ยา
- ในกรณีที่มีการกินยานี้ให้รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลทันที
- หากใช้ยานี้แล้วอาการแย่ลงหรือไม่ดีขึ้น ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผิวหนังลอก ผื่นแดง ตุ่มพอง มีจ้ำตามผิวหนัง
“ให้รีบไปพบแพทย์ทันที”

5.2 อาการที่ถ้ามีอาการรุนแรง ให้ไปพบแพทย์

- ผื่น แดง คัน บริเวณที่ทายา

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บยาในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- **ยามีลักษณะ** เป็นยาน้ำ
- **ตัวยาสําคัญ** คือ กาลาไมน์ (calamine) และ ซิงค์ออกไซด์ (zinc oxide)
- **ขนาดบรรจุ** ไม่เกิน 180 มิลลิลิตร

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด 6 เมษายน 2566

ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.
<http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
<http://ndi.fda.moph.go.th>

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**