

ยารักษาโรคผิวหนังเรื้อรัง
โคลทาร์
ความแรง 1%
ชนิดโลชั่น

ยาใช้ภายนอก ห้ามรับประทาน

1. ยานี้คืออะไร

1.1. ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า โคลทาร์ (Coal tar) ความแรง 1% โดยน้ำหนัก (w/w)

1.2. ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ยานี้ใช้เพื่อรักษาโรคผิวหนังเรื้อรัง เช่น เรื้อน กลาก ผื่นคัน

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1. ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือ ส่วนประกอบของยานี้
- มีภาวะภูมิแพ้รุนแรง
- มีภาวะผิวหนังแพ้แสง
- มีโรคแพ้ภูมิตัวเอง

2.2. ข้อควรระวัง

เพื่อความปลอดภัย ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร หากท่านมีภาวะต่อไปนี้

- ตั้งท้อง วางแผนจะตั้งท้อง หรืออยู่ระหว่างให้นมบุตร
- ใช้ยา สมุนไพร หรืออาหารเสริมอื่นอยู่

**“สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
ถ้าไม่แน่ใจว่ามีภาวะดังกล่าวหรือไม่”**

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ยานี้สำหรับใช้ภายนอกเท่านั้น
- เชย่อาขวดก่อนใช้ยา
- ทำความสะอาดผิวหนังบริเวณที่จะทายา ก่อนทายานี้
- ทาบนผิวหนังบริเวณที่มีอาการ วันละ 2-3 ครั้ง
- ในเด็กหรือผู้สูงอายุ ให้ผสมยานี้กับน้ำเล็กน้อย ก่อนทาบนผิวหนัง
- ห้ามกินยานี้เด็ดขาด
- หลีกเลี่ยงการทายาใกล้เคียงผิวหนังบริเวณที่บอบบาง เช่น ริมฝีปาก หรือดวงตา หรือผิวหนังบริเวณที่มีบาดแผล

3.2 ถ้าลืมทายานี้ควรทำอย่างไร

- ทายานี้ทันทีที่นึกขึ้นได้ แต่ถ้าใกล้กับครั้งถัดไปให้ข้ามไปทายาในครั้งถัดไป
- ห้ามเพิ่มขนาดยาเพื่อชดเชยยาที่ลืม

3.3 ถ้าทายานี้เกินขนาดที่แนะนำควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนและหลังใช้ยา
- ในกรณีที่มีการกินยานี้ ให้รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลทันที
- หากใช้ยานี้แล้วอาการแฉงหรือไม่ดีขึ้น ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
- หลีกเลี่ยงการโดนแสงอาทิตย์หลังจากทายานี้ เนื่องจากยาอาจจะทำให้เกิดอาการผิวหนังแพ้แสงได้
- ห้ามนำบริเวณที่ทายาเข้าใกล้เปลวไฟ เนื่องจากยาอาจติดไฟได้

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผิวหนังลอก ผื่นแดง ตุ่มพอง มีจ้ำตามผิวหนัง
“ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรง ให้ไปพบแพทย์

- ระคายเคือง บริเวณที่ทายา
- ผิวหนังแพ้แสง
- มีตุ่มคล้ายสิ่วขึ้นบริเวณที่ทายา

**“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา
แต่ถ้ามีอาการรุนแรง ให้ไปพบแพทย์”**

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บยาในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อบอุ่นโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 40 องศาเซลเซียส ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- ยามีลักษณะ เป็นยาน้ำ
- **ตัวยาสำคัญ** คือ โคลทาร์ (coal tar)
- **ขนาดบรรจุ** ไม่เกิน 15 กรัม

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด 6 เมษายน 2566
ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.
<http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
<http://ndi.fda.moph.go.th>

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**