

น้ำยาฆ่าเชื้อโรค คลอโรไซลีนอล ชนิดน้ำ

เป็นยาใช้ภายนอก ห้ามรับประทาน

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้ชื่อว่า น้ำยาฆ่าเชื้อโรคคลอโรไซลีนอล ประกอบด้วย คลอโรไซลีนอล (chloroxylonol) และ ไอโซโพรพิล แอลกอฮอล์ (isopropyl alcohol)

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้ทำความสะอาดแผล

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- ห้ามใช้บริเวณที่มีผื่นผิวหนังอักเสบ

3. วิธีใช้ยา

3.1 ยานี้ใช้อย่างไร

- เจือจางน้ำยา 1 ส่วนกับน้ำ 19 ส่วน ก่อนใช้
- ใช้น้ำยาเช็ดทำความสะอาดรอบบาดแผล
- ห้ามใช้ยานี้กับบาดแผลโดยตรง

3.2 ถ้าใช้ยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด และรีบไปโรงพยาบาล พร้อมยานี้หรือบรรจุภัณฑ์ทันทีหากมีอาการผิดปกติ

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยานี้

- ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนใช้และหลังใช้ยา
- ควรใช้ด้วยความระมัดระวังไม่ให้ยาเข้าปากหรือดวงตา เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดจากยา
- หากใช้ยานี้แล้วแผลแห้งลงหรือไม่ดีขึ้น ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวนิ่งหลุดลอก หรือมีจ้ำตาม ผิวนิ่ง
- ระคายเคืองที่ผิวหนังรุนแรง

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- ไม่มีข้อมูลอันตรายจากยาอื่น ๆ ที่ชัดเจน แต่หากมีอาการผิดปกติใด ๆ ภายหลังการใช้ยานี้ให้รีบไปพบแพทย์หรือเภสัชกร

ข้อมูลยานี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง ปล่อยให้โดนแสงโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- ลักษณะยา: สารละลายใส สีน้ำตาล
- ตัวยาสำคัญ:
 - คลอโรไซลีนอล
 - ไอโซโพรพิล แอลกอฮอล์
- ขนาดบรรจุ: ขวดละไม่เกิน 450 มิลลิลิตร

เอกสารฉบับนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด 12 กุมภาพันธ์ 2566

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ ออย.

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th>

