

อะทีโนลอล
ความแรง 50 และ 100 มิลลิกรัม
ชนิดเม็ด

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้ชื่อว่า อะทีโนลอล (atenolol)

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- รักษาภาวะความดันโลหิตสูง
- รักษาอาการเจ็บเค้นหน้าอก
- รักษาภาวะหัวใจเต้นผิดปกติ
- ป้องกันความผิดปกติของหัวใจหลังภาวะหัวใจวาย

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- โรคหลอดเลือดและหัวใจ เช่น โรคหัวใจวายที่ยังไม่ได้รับการรักษา หัวใจเต้นช้า ความดันโลหิตต่ำ
- มีภาวะสัญญาณไฟฟ้าหัวใจผิดปกติ
- มีภาวะข้อคจากโรคหัวใจ หรือมีภาวะหัวใจวาย
- มีภาวะเลือดเป็นกรดเมแทบอลิก
- โรคเนื้องอกของต่อมหมวกไตส่วนใน

2.2 ข้อควรระวัง เพื่อความปลอดภัย ให้ออกแพทย์หรือเภสัชกรหากท่านมีภาวะต่อไปนี้

- ใช้ยา สมุนไพร อาหารเสริมอื่นอยู่
- เป็นโรคหอบหืด
- โรคหัวใจล้มเหลว หรือหัวใจทำงานผิดปกติ
- ระบบไหลเวียนเลือดในร่างกายผิดปกติ
- โรคเบาหวาน
- โรคสะกิดเงิน
- ดับ หรือ ไต ทำงานผิดปกติ
- ต่อมน้ำไทรอยด์ทำงานผิดปกติ

- หญิงตั้งครรภ์ควรระมัดระวังการใช้ยานี้ตลอดช่วงการตั้งครรภ์
- หญิงให้นมลูกควรหลีกเลี่ยงการใช้ยานี้ตลอดช่วงการให้นมลูก แต่แพทย์อาจพิจารณาสั่งใช้ยานี้ หากมีเหตุผลทางการแพทย์

3. วิธีใช้ยา

3.1 กินยานี้อย่างไร

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- กินยาก่อนหรือหลังอาหารก็ได้

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- กินยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าใกล้เวลาของมื้อต่อไปให้รอกินยาของมื้อต่อไป ห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้นำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยานี้

- ห้ามหยุดยาเอง และให้กินยานี้อย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร
- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา
- ควบคุมอาหารและออกกำลังกายระหว่างการใช้นี้
- แจ้งแพทย์หรือทันตแพทย์ว่ากำลังใช้ยานี้หากต้องการผ่าตัดหรือทำฟัน

ข้อมูลยานี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th>

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก หรือมีจ้ำตาม ผิวหนัง
- ดับทำงานผิดปกติ เช่น ตัวเหลือง ตาเหลือง บัสสาวะสีเข้มผิดปกติ
- มีจุดจ้ำเลือดร่วมกับเลือดออกที่จมูกหรือเหงือก
- โรคหัวใจกำเริบหรือแย่ลง เช่น แน่นหน้าอก หายใจหอบเหนื่อยผิดปกติ ขาบวม

“ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- รู้สึกเจ็บ เย็น หรือ ชาที่ปลายมือปลายเท้า
- คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้องท้อง
- ท้องเสีย ท้องผูก
- เหนื่อยล้า ไม่มีแรง
- หัวใจเต้นช้า

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อบอุ่นโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- ลักษณะยา: เม็ด
- ตัวยาสำคัญ: อะทีโนลอล

เอกสารฉบับนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด 9 สิงหาคม 2566