

ซัลฟาซาลาซีน
ความแรง 500 มิลลิกรัม
ชนิดเม็ดเคลือบเอนเทอริก

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้ชื่อว่า ซัลฟาซาลาซีน (sulfasalazine)

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้รักษาโรคที่มีการอักเสบของทางเดินอาหาร ได้แก่
 - โรคลำไส้ใหญ่อักเสบ
 - โรคโครห์น

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- เคยแพ้ยาบางชนิด เช่น แอสไพริน หรือ ซัลฟา
- เป็นโรคพอร์ไฟเรีย
- ห้ามใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี

2.2 ข้อควรระวัง เพื่อความปลอดภัย ให้ออก แพทย์หรือเภสัชกรหากท่านมีภาวะต่อไปนี้

- ใช้ยา สมุนไพร อาหารเสริมอื่นอยู่
- ตับ หรือ ไต ทำงานผิดปกติ
- พร่องเอนไซม์จีซิกพีดี(G6PD) หรือโรคแพ้ถั่วปากอ้า
- โรคหอบหืด
- เด็กที่มีภาวะข้ออักเสบ
- หญิงที่ตั้งครรภ์หรือวางแผนที่จะตั้งครรภ์ ควรแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบก่อนใช้ยา
- หญิงให้นมลูกควรหลีกเลี่ยงการใช้ยานี้ตลอดช่วงการให้นมลูก เพราะอาจทำให้เกิดอันตรายต่อทารก แต่แพทย์อาจพิจารณาสั่งใช้ยานี้ หากมีเหตุผลทางการแพทย์

3. วิธีใช้ยา

3.1 กินยานี้อย่างไร

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- กินยาก่อนหรือหลังอาหารก็ได้
- ห้ามบดหรือเคี้ยวหมดยาก่อนกลืน

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- กินยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าใกล้เวลาของมื้อต่อไปให้รอกินยาของมื้อต่อไป ห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้นำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยานี้

- ไม่นำยานี้ให้ผู้อื่นกิน แม้ว่าจะเป็นโรคหรือมีอาการเดียวกัน เพื่อความปลอดภัยในการใช้ยา
- ห้ามหยุดยาเอง และให้กินยานี้อย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร
- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา
- ควรดื่มน้ำต่อวันให้เพียงพอในปริมาณที่ร่างกายต้องการ เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากยาต่อไต
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสแสงแดดเป็นเวลานาน หรือโดนแสงแดดร้อนจัด เพราะอาจกระตุ้นให้เกิดผื่นจากยา

ข้อมูลยานี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th>

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
 - หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
 - ผื่นแดง ตุ่มพอง ผื่นหนังหลุดลอกหรือมี้ำตามผิวหนัง
 - มีไข้ ปวดตามข้อ ผื่นลมพิษ ต่อม้ำเหลืองโต
 - กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ เจ็บเค้นหน้าอก หายใจหอบเหนื่อย หัวใจเต้นผิดจังหวะ
 - ตับทำงานผิดปกติมีอาการ เช่น ตัวเหลือง ตาเหลือง ปัสสาวะสีเข้มผิดปกติ
 - ตับอ่อนอักเสบ ปวดท้องรุนแรง ปวดร้าวไปที่หลัง
 - ภาวะติดเชื้อ มีไข้สูง เจ็บคอรุนแรง มีแผลในปาก
- “ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามี อาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- อาหารไม่ย่อย แสบร้อนกลางอก คลื่นไส้
- เวียนหัว ปวดหัว นอนไม่หลับ
- ท้องเสีย อาเจียน

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง ปล่อยให้โดนแสงโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- ลักษณะยา: เม็ด
- ตัวยาสาคัญ: ซัลฟาซาลาซีน

เอกสารฉบับนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด 9 สิงหาคม 2566