

เมทิม่าโซล (ไทอะมาโซล)
ความแรง 5 มิลลิกรัม
ชนิดเม็ด

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้ชื่อว่า เมทิม่าโซล (methimazole) หรือ ไทอะมาโซล (thiamazole)

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้รักษาภาวะไทรอยด์เป็นพิษ (ฮอร์โมนไทรอยด์สูง)
- ใช้รักษาโรคคอพอกจากภาวะไทรอยด์เป็นพิษ

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้

2.2 ข้อควรระวัง เพื่อความปลอดภัย ให้บอกแพทย์หรือเภสัชกร หากท่านมีภาวะต่อไปนี้

- ใช้ยา สมุนไพร อาหารเสริมอื่นอยู่
- หญิงที่ตั้งครรภ์หรือสงสัยการตั้งครรภ์ในสามเดือนแรก เพราะอาจทำให้เกิดอันตรายต่อทารก แต่แพทย์อาจพิจารณาสั่งใช้ยานี้ หากมีเหตุผลทางการแพทย์
- หญิงให้นมลูกควรระมัดระวังการใช้ยานี้ เพราะไม่มีข้อมูลยืนยันความปลอดภัย

ข้อมูลยานี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

3. วิธีใช้ยา

3.1 กินยานี้ได้อย่างไร

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค

- กินยาก่อนหรือหลังอาหารก็ได้

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- กินยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าใกล้เวลาของมื้อต่อไปให้รอกินยาของมื้อต่อไป ห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง เช่น คลื่นไส้ ร่วมกับ ปวดท้อง ปวดหัว ไข้สูง ปวดข้อกระดูก แขนขาบวม น้ำ ให้รีบไปส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยานี้

- ไม่นำยานี้ให้ผู้อื่นกิน แม้ว่าจะเป็นโรคหรือมีอาการเดียวกัน เพื่อความปลอดภัยในการใช้ยา
- ห้ามหยุดยาเอง และให้กินยานี้อย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร
- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Page/s/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th>

เอกสารฉบับนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด 4 สิงหาคม 2566

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก หรือมีจ้ำตามผิวหนัง
- หลอดเลือดอักเสบ เช่น มีไข้สูง ปวดบวมตามข้อกระดูกหรือกล้ามเนื้อ เส้นเลือดที่ผิวหนังอักเสบแดงเป็นผื่น ปัสสาวะลดลง หายใจหอบเหนื่อย
- ตับทำงานผิดปกติ เช่น ตัวเหลือง ตาเหลือง ปัสสาวะสีเข้มผิดปกติ
- ตับอ่อนอักเสบ ปวดท้องรุนแรง ปวดร้าวไปที่หลัง

“ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- คลื่นไส้ อาเจียน
- การรับรสผิดปกติ ปวดท้อง ไม่สบายท้อง
- ปวดหัว ปวดกล้ามเนื้อ
- ผมร่วง

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- ลักษณะยา: เม็ด
- ตัวยาสําคัญ: เมทิม่าโซล (ไทอะมาโซล)