

ลิโวไทร็อกซีน

ความแรง 50 และ 100 ไมโครกรัม
ชนิดเม็ด

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้ชื่อว่า ลิโวไทร็อกซีนโซเดียม (levothyroxine sodium)

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้รักษาภาวะขาดฮอร์โมนไทรอยด์ (ฮอร์โมนไทรอยด์ต่ำ)

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- มีภาวะไทรอยด์เป็นพิษ ต่อมไทรอยด์สร้างฮอร์โมนไทรอยด์มากผิดปกติ (ฮอร์โมนไทรอยด์สูง)
- ต่อมหมวกไตทำงานผิดปกติ

2.2 ข้อควรระวัง เพื่อความปลอดภัย ให้บอกแพทย์หรือเภสัชกร หากท่านมีภาวะต่อไปนี้

- ใช้ยา สมุนไพร อาหารเสริมอื่นอยู่
- ต่อมไทรอยด์ทำงานต่ำผิดปกติมาเป็นเวลานาน
- หัวใจทำงานผิดปกติ เช่น เจ็บแน่นหน้าอก โรคหลอดเลือดหัวใจ หรือ ความดันโลหิตสูง
- โรคลมชัก
- โรคเบาหวาน
- อายุมากกว่า 50 ปี
- ขาดฮอร์โมนจากการทำงานผิดปกติของต่อมใต้สมอง

3. วิธีใช้ยา

3.1 กินยาได้อย่างไร

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- กินยาก่อนอาหารเช้าหรือก่อนอาหารมื้อแรกของวัน

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- กินยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าใกล้เวลาของมื้อต่อไปให้รอกินยาของมื้อต่อไป ห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง เช่น มีไข้ ร่วมกับเจ็บแน่นหน้าอก หัวใจเต้นผิดปกติ เป็นตะคริว ให้นำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยานี้

- ไม่นำยานี้ให้ผู้อื่นกิน แม้ว่าจะเป็นโรคหรือมีอาการเดียวกัน เพื่อความปลอดภัยในการใช้ยา
- ห้ามหยุดยาเอง และให้กินยาอย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร
- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา

ข้อมูลยานี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th>

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก หรือมีจ้ำตามผิวหนัง
- ต่อมไทรอยด์เป็นพิษวิกฤติ เช่น อุณหภูมิร่างกายสูงผิดปกติ ไข้สูง หัวใจเต้นเร็ว หัวใจล้มเหลว ดีซ่าน ลมชัก หหมดสติ

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- ปวดหัว
- ร้อนวูบวาบ อุณหภูมิร่างกายสูง เหงื่อออกมาก
- น้ำหนักลด
- ท้องเสีย อาเจียน

6. ควรเก็บยาได้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- ลักษณะยา: เม็ด
- ตัวยาสาคัญ: ลิโวไทร็อกซีนโซเดียม

เอกสารฉบับนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด 4 สิงหาคม 2566