

ไฮออสซีน-เอ็น-บิวทิลโบรไมด์ ความแรง 5 มิลลิกรัมต่อ 5 มิลลิลิตร ชนิดน้ำเชื่อม

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้ชื่อว่า ไฮออสซีน-เอ็น-บิวทิลโบรไมด์ (hyoscine-n-butylbromide)

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้รักษาอาการปวดเกร็งของกระเพาะอาหารและลำไส้
- ใช้รักษาอาการปวดเกร็งของทางเดินปัสสาวะ
- ใช้รักษากลุ่มอาการโรคลำไส้แปรปรวน

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- เป็นโรคต่อหิน
- เป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง
- มีภาวะลำไส้อุดตันหรือทางเดินอาหารตีบตัน
- มีภาวะลำไส้พองโตผิดปกติ
- กำลังตั้งท้อง หรือวางแผนจะตั้งท้อง เพราะทำให้เกิดอันตรายต่อทารกตลอดช่วงการตั้งท้อง
- หญิงให้นมลูกห้ามใช้ยานี้ เพราะทำให้เกิดอันตรายต่อทารก

2.2 ข้อควรระวัง เพื่อความปลอดภัย ให้ออก แพทย์หรือเภสัชกรหากท่านมีภาวะต่อไปนี้

- ใช้ยา สมุนไพร อาหารเสริมอื่นอยู่
- หัวใจทำงานผิดปกติ หัวใจเต้นเร็ว ใจสั่น
- ต่อมไทรอยด์ทำงานผิดปกติ
- ต่อมลูกหมากโต หรือปัสสาวะลำบาก
- ท้องผูก

3. วิธีใช้ยา

3.1 กินยานี้อย่างไร

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- กินยาก่อนหรือหลังอาหารก็ได้

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- กินยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าใกล้เวลาของมื้อต่อไปให้รอกินยาของมื้อต่อไป ห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้นำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยานี้

- ไม่นำยานี้ให้ผู้อื่นกิน แม้ว่าจะเป็นโรคหรือมีอาการเดียวกัน เพื่อความปลอดภัยในการใช้ยา
- ห้ามหยุดยาเอง และให้กินยานี้อย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร
- หากใช้ยานี้แล้วอาการไม่ดีขึ้นหรืออาการแย่ลง ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th>

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนัง หลุดลอก หรือมีจ้ำตามผิวหนัง
- ปวดตา ตาแดง การมองเห็นผิดปกติ สูญเสียการมองเห็น

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามี อาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- ปากแห้ง
- เหงื่อออกมากหรือออกน้อยผิดปกติ
- หัวใจเต้นเร็ว ใจสั่น
- ปัสสาวะลำบาก

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อยาให้โดนแสงโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- ลักษณะยา: ยาน้ำเชื่อม
- ตัวยาสาคัญ: ไฮออสซีน-เอ็น-บิวทิลโบรไมด์

เอกสารฉบับนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด 5 เมษายน 2566

ข้อมูลยานี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร