

ฟูโรซีไมด์

ความแรง 40 และ 500 มิลลิกรัม
ชนิดเม็ด

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้ชื่อว่า ฟูโรซีไมด์ (furosemide) เป็นยาในกลุ่มขับปัสสาวะ

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้รักษาโรคความดันโลหิตสูง
- ใช้รักษาภาวะบวมในรูปร่างกาย

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- มีภาวะปัสสาวะออกน้อยหรือปัสสาวะไม่ออก
- ไตทำงานบกพร่อง หรือไตวายจากการได้รับสารที่เป็นพิษต่อไต
- ไตเสียหายรุนแรงทำให้ไม่สามารถผลิตปัสสาวะได้
- มีภาวะขาดน้ำ
- เป็นโรคตับวาย หรือโรคตับรุนแรง เช่น โรคตับแข็ง
- เป็นโรคแอดดีสัน ต่อมหมวกไตทำงานผิดปกติ
- หญิงให้นมลูกห้ามใช้ยานี้ เพราะทำให้เกิดอันตรายต่อทารก

2.2 ข้อควรระวัง เพื่อความปลอดภัย ให้บอกแพทย์หรือเภสัชกร หากท่านมีภาวะต่อไปนี้

- ใช้ยา สมุนไพร อาหารเสริมอื่นอยู่
- มีปริมาณเลือดหรือโปรตีนในรูปร่างกายต่ำ
- สมดลเกลือแร่ในเลือดผิดปกติ
- ตับ หรือ ไต ทำงานผิดปกติ
- โรคเบาหวาน
- ต่อมลูกหมากโต

3. วิธีใช้ยา

3.1 กินยานี้อย่างไร

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค

- กินยาก่อนหรือหลังอาหารก็ได้

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- กินยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าใกล้เวลาของมื้อต่อไปให้รอกินยาของมื้อต่อไป ห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง เช่น กระจายน้ำรุนแรง ร่วมกับปัสสาวะออกน้อยมีสีเข้ม อ่อนเพลีย หมดสติ ให้นำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยานี้

- ไม่นำยานี้ให้ผู้อื่นกิน แม้ว่าจะเป็นโรคหรือมีอาการเดียวกัน เพื่อความปลอดภัยในการใช้ยา
- ห้ามหยุดยาเอง และให้กินยานี้อย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร
- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Page/s/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th>

ข้อมูลยานี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก หรือมีจ้ำตามผิวหนัง
- หลอดเลือดอักเสบ เช่น มีไข้สูง ปวดบวมตามข้อกระดูกหรือกล้ามเนื้อรุนแรง
- ไตวายเฉียบพลัน มีอาการ เช่น ปัสสาวะออกน้อยลง ปัสสาวะไม่ออก มีอาการบวมตามแขนและขา
- ภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือด เช่น ปวดขารุนแรง ขาบวมผิดปกติ

“ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- ปากแห้ง กระจายน้ำ อ่อนเพลีย ตะคริว กระจกตาขุ่น ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ปัสสาวะลำบาก

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- ลักษณะยา: เม็ด
- ตัวยาสาคัญ: ฟูโรซีไมด์

เอกสารฉบับนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด 4 สิงหาคม 2566